হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্য-সুধা।

অর্থাৎ

প্রধান প্রধান ঔষধের বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ লক্ষণ।

৺ হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনূদিত।

ALLEN'S KEYNOTES

IN BENGALI

PUBLISHED AND REVISED BY
PIYUSH KIRAN CHAKRAVARTTI, B. A.
Homoeopathy Prachar Karyyalaya
Patuatuli, Dacca

1921.

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভূমিকা।

ভৈষজ্য-সুধা ভৈষজ্য-তত্ত্বের প্রথম-শিক্ষা। ভৈষজ্য-সাগর মথিত প্রধান প্রধান ঔষধের বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ লক্ষণ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট। প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণের মধ্যেই কতকগুলি এমন লক্ষণ দৃষ্ট হয় যে, সেই সকল লক্ষণ অন্য ঔষধে একেবারেই দেখা যায়না। এই লক্ষণ গুলিকেই সেই সেই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ বলে। এই বিশেষ লক্ষণ দ্বারাই ঔষধের বিশেষত্ব স্থির হয়, এবং অন্যান্য ঔষধ হইতে উহার স্বতন্ত্রতা নিরূপণ করিতে পারা যায়।

মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি ন্যাট্রমিউরিয়াম, মধ্যাহ্নে শ্বাস রসটক্সের, প্রচণ্ড প্রলাপ বেলেডোনার এবং উদরাময় ফসফরিক এসিডের এইরূপ এক একটী সর্ব্বপ্রধান বিশেষলক্ষণ।

এই পরিচালক লক্ষণ গুলি ভিত্তিভূমি করিয়াই মনে মনে সেই সেই ঔষধের লক্ষণগুলির তুলনা করিতে হয়। তুলনা ব্যতিরেকে প্রভেদ নিরূপণ করিতে পারা যায়না, প্রভেদ নির্ণীত না হইলে বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান জন্মেনা। এজন্য ঔষধে ঔষধে তুলনা করিয়া ঔষধের প্রভেদ নিরূপণ করিতে হয়, এবং উহার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ঔষধের প্রকৃত জ্ঞান না থাকিলে ঠিক সদৃশ ঔষধ নির্বাচন করিতে পারা যায়না। ফলতঃ তুলনাকরণ ও প্রভেদ নিরূপণ হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থীর জীবন-ব্রত। ঔষধেরলক্ষণে-ঔষধেরলক্ষণে এবং রোগীরলক্ষণে-ঔষধেরলক্ষণে তাহাকে প্রতিনিয়তই কেবল তুলনা করিতে হয়। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্বের বিশাল লক্ষণ রাশি দেখিলে প্রথম শিক্ষার্থীকে ভীত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়। বাস্তবিক ও উহা প্রথম উদ্যমে আয়ত্ত করা বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। অতএব প্রথমে ঔষধের বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ লক্ষণ গুলি অভ্যাস করিয়া প্রত্যেক ঔষধের বিশেষ বা স্বতন্ত্র প্রতিকৃতি উপলব্ধি করা উচিত। উহা অপেক্ষাকৃত অনায়াস-সাধ্য এবং শিক্ষার প্রারম্ভে বড়ই উপযোগী। তাই এই পুস্তক অভ্যাস করিয়া বৃহৎ ভৈষজ্য-তত্ত্ব অভ্যাস করা সুবিধাজনক হইবে বলিয়া ভৈষজ্য-তত্ত্বের এই প্রথম-শিক্ষা 'ভৈষজ্য-সুধা' নামে প্রকাশিত হইল। ইহাদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইলেই হইল। এই পুস্তকখানি

এলেনের "কি-নোটস্" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের বাঙ্গলা অনুবাদ। গ্রন্থকার সিকাগো হেরিং মেডিকাল কালেজের ভৈষজ্য-তত্ত্বের অধ্যাপক। তিনি অধ্যাপন ও অধ্যাপনায় এই পুস্তকের বিলক্ষণ উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন। ভরসা করি ছাত্রগণও এই অনুবাদের দ্বারা ফলবত্তা উপলব্ধি করিবেন। অনুবাদ যথাযথ মূলানুরূপ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি জানিনা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

এই পুস্তকে প্যাথোজেনেসিস্ চিহ্নের অন্তর্গত সমস্ত প্রধান বিষয়ের উল্লেখ আছে। অধ্যয়নকালে সেইগুলি একস্থলে সংগ্রহ করিয়া অনুশীলনী স্বরূপ আলোচনা ও অভ্যাস করিলে একটী ঔষধ শিক্ষা করিলেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কতকগুলি ঔষধেরও কতকটা জ্ঞানলাভ হইবে। এবং ঔষধে ঔষধে কোথায় কোথায় সৌসাদৃশ্য ও কোথায় বা পার্থক্য অসাদৃশ্য তাহা স্থির করিয়া লওয়া যাইবে। লক্ষণগুলির প্রাধান্যের তারতম্যানুসারে অক্ষরেরও তারতম্য করা গিয়াছে।

চৈত্র। ১৩১৯ — অনুবাদক।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ভৈষজ্য-সুধার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে পুস্তকের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। মুদ্রাঙ্কনব্যয় পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এ সংস্করণের পুস্তকের মূল্য বর্দ্ধিত না করিয়া পূর্ব্ববৎ দেড় টাকাই রাখা হইল। মুদ্রাঙ্কন দোষ দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, তথাপি স্থানে স্থানে ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা। গ্রন্থকার জীবিত থাকিতে সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়গণ ইহাকে যেরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, ভরসা করি ইহা এখনও তাঁহাদের নিকট সেই-ভাবে আদৃত হইবে।

হোমিওপ্যাথিপ্রচার কার্য্যালয়।
নবাবপুর, ঢাকা।
আষাঢ়, ১৩২৫।

বিনীত—
ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র ?

দুরূহ পারিভাষিক শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ।

অধঃক্ষেপ Sediment.
অনামাস্থি Innominatum.
অনুকল্প Vicarious.
অনুপূরক সম্বন্ধ Complementary relation.
অনুভূতি Sensitiveness.
অপচামান Papular
অবদরণ Excoriation
অবসাদ-বায়ু Hypochondriasis.
অবিদাহী Bland
অমোঘ ঔষধ Genus Epidemicus.
অর্কাঘাত Sun-stroke.
অস্থিবেষ্ট Periosteum
আততি Tension.
আর্দ্রকাল Damp weather
আধিভৌতিক Mechanical.
আধেয় Contents.
আবিল Turbid.
আবেশ Paroxysm.
আভিঘাতিক Traumatic
আম Mucus.
আমবাত Rheumatism.
আমাশয় Stomach.
উদ্ভেদ Eruption.
উপক্ষত Aphthae.
উপঘাত Injury.
উপচয় Aggravation.
উপত্বক Epithelium
উপদাহ Irritation.
কচ্ছু-দোষ Psora.
কণ্ডরা Tendon.
কনীনিকা Cornea.
কম Prolapsus Uteri.
করোটি Cranium.
কৃত্রিম মৈথুন Onanism.
কৈশিকা Capillary.
কোকিল-চঞ্চু-অস্থি Coccyx.
গতিজনন স্নায়ু Motor Nerves.
গল-কোষ Pharynx.
গুটিকা দোষ Tuberculosis.
গুল্ম-বায়ু Hysteria
গুল্মন Bunion.
গ্রন্থি বাত Gout
ঘৃষ্ট-ব্রণ Bruise
চিপিটিকা Crusts
ছত্রাক Fungus
ছিন্নব্রণ Incised wound.
জিহ্বা-কণ্টক Papillae.
টঙ্কার Convulsions.
ডিম্বাশয় Ovary
তন্তু Fibrin.
তাপাবেশ Flushes of heat
তালু-মূল Tonsil
ত্রিক, ত্রিকাস্থি Sacrum.
দন্ত-শর্করা Sordes
দীর্ঘাস্থি Tibia.
দেশ Region.
ধাতু-বিকৃতি Cachexia.
নাড়ী-ব্রণ Fistula.
নিগীরণ Deglutition.
নিমগ্নতা Sinking.
নিষ্ঠীবন Expectoration.
নৌ-গহ্বর Navicular fossa
পচ্যমান Pustular.
পর্শুকা-মধ্য Intercostal.

পাণ্ডুর Pale
পামা Eczema.
পীড়কা Eruptions.
পৃষ্ঠবংশ Spine.
প্রতিক্রিয়া Reaction.
প্রতিশ্যায় Catarrh
প্রধাবন Rush.
প্রবণতা Tendency.
ফুসফুস-পাকাশয়িক-স্নায়ু Pneumo gastric nerve.
বস্তিগ-স্নায়ু Sciatic. Nerve.
বস্তি-কোটর Pelvis.
বহুপাদ Polypus
বাতকণ্টক Sprain.
বিদাহী Acrid.
বিদ্ধব্রণ Punctured wound.
বিধান তন্তু Tissue
বিবমিষা Nausea
বিষয়-নিষ্ঠ ol jec'ive.
বিসমাসিত Decomposed.
বিসর্প Erysipelas.
বৃক্ক Kidney.
ব্রণশোথ Abscess.
ভৌতিক Physical.
ভগাস্থি Pubis
মণিবন্ধ Wrist
মদাত্যয় Delirium Tremens.
মধ্যান্ত্র Mesentery.
মস্তু Serum.
মশক-দোষ Sycosis
মুখ-রাগ Flush
মূত্রাশয়গ্রন্থি Prostate.
মূত্র-নাশ Suppression of urine
মূত্র-মার্গ Urethra.
মূত্রাশয় Bladder
মূলাধার Perineum.
রক্তাল্পতা Anaemia.
যান্ত্রিক Organic
রক্তাতিসার Dysentery
লসিকা Lymph
শঙ্খ Temple.
শল্য Foreign body.
শল্ক Scales
শিখর Apex.
শীতপিত্ত Urticaria.
শীতাদ Scurvy
শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী Mucous Membrane.
সন্ন্যাস Apoplexy.
সংবৃতি Stricture.
সদ্যোব্রণ Wound.
সমনিয়োগতা Co-ordination
সরলান্ত্র Rectum.
সবিরাম জ্বর Eruptive Fever.
সহানুভূতি Sympathy.
সাণ্ডলাল Albuminous
সাচ্ছিদ্র Porous
সুকুমার Delicate.
স্থূলান্ত্র Colon.
সূচী বেধ Stitching pain.
স্নায়ু Nerve.
স্বপ্ন-সঞ্চরণ Somnambulism.
স্বয়ম্ভূত Idiopathic.
স্বরনাশ Aphonia.
হনু Jaw.
হনুস্তম্ভ Lock-jaw.
হরিৎপাণ্ডু Chlorosis.
হুল-বেদন Stinging pain.

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্য-সুধা।

অরম মেটেলিকম্।

(Aurum metallioum)

কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু ও কৃষ্ণবর্ণ চুল বিশিষ্ট রক্ত প্রধান ব্যক্তি; ও সজীবতা, অস্থিরতা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা (anxiety) বিশিষ্ট ব্যক্তি

ক্ষীণ-দৃষ্টি ; স্থূলকায় ; জীবনে বিতৃষ্ণ, বৃদ্ধ।

পারদ ও উপদংশের কুফলে ভগ্ন-দেহ ব্যক্তি।

নিস্তেজ, নির্জীব, ক্ষীণ-মেধ. (of weak momory), বালক-সুলভ ক্রীড়া-কৌতুকে বিরত; অবিকসিত-অণ্ড ; ক্রমশঃ শীর্ণতাপ্রাপ্ত, বালক।

অবিরত আত্মহত্যার চিন্তা (ন্যাজা—কিন্তু মরিতে ভয়, নক্স)।

গভীর বিষাদ।—ঘৃণা ও বিবাদ-প্রবৃত্তির উদ্রেক ; আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা ; জীবন সর্বদা গলগ্রহ অনুভব ; পারদ অপব্যবহারের পর ; প্রায় সকল রোগেই বিষাদের বিদ্যমানতা।

অস্বচ্ছন্দতা, ব্যস্তসমস্ততা, মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের অতিশয় ইচ্ছা ; কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ করিতে অসমর্থতা (আর্জ-না)।

শোক, ও প্রেম-ভঙ্গজনিত অসুখ তৎসহ মৃত্যু ও আত্মহত্যার কামনা।

ভয়, ক্রোধ, প্রতিবাদ, দুঃখ, বৈরক্তি, আতঙ্ক, অথবা সংগোপিত অসন্তোষ ফলতঃ (ষ্ট্যাফ) অসুখ

অতিরিক্ত অনুভূতি ; যৎসামান্য প্রতিবাদে ক্রোধের উদ্রেক (কেমো) ; যাতনায় ; গন্ধে, স্বাদে, শ্রবণে, ও স্পর্শে (এনা) তীব্রতানুভব।

কপিশবর্ণ মলিন-বদন ; দুঃখিত, বিমর্ষ, মৌনী ; কোষ্ঠ-রোধ-প্রবণ ; ব্যক্তিদিগের যৎসামান্য মানসিক পরিশ্রমে উত্তিক্ত ; শিরঃপীড়া।

কেশ-পতন, বিশেষতঃ উপদংশ ও পারদজনিত রোগে

অর্দ্ধ-দৃষ্টি ; কেবল নিম্নার্দ্ধ দৃষ্ট হয় (কেবল বামদিক দেখা যায়, ডান-দিক নাই)।

উপদংশ ও পারদজনিত অস্থি-রোগ

অস্থি-ক্ষত — নাসিকা ও তালুর অস্থির এবং মাষ্টয়েড-প্রদেশের অস্থি সদৃশ অস্থির ক্ষয় (Caries) পূতিনস্য (Ozaena) ও কর্ণস্রাব, অতি দুর্গন্ধ স্রাব ; রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি ; বেদনা বশতঃ হতাশ হইয়া পড়ে ; পারদ অথবা উপদংশ হইতে উহার উৎপত্তি (ওরা ,

উচ্চ স্থান হইতে কিছু পাড়িতে অথবা স্বাভাবিক শক্তি অপেক্ষা অতিরিক্ত চেষ্টা করাতে ; (পড, রস) ও বিবৃদ্ধি বশতঃ (কোনা) জরায়ু বাহির হইয়া পড়া, ও উহার কাঠিন্যতা প্রাপ্তি

অত্যন্ত বিমর্ষতা সংযুক্ত জরায়ুর শোথ ও শক্তাবস্থার (Induration) রোগ ; ঋতু-কালে উহার বৃদ্ধি।

বয়ঃসন্ধির প্রারম্ভে বালিকাদিগের মুখে দুর্গন্ধ।

হৃৎপিণ্ড যেন স্থির হইয়া পড়িয়াছে এরূপ অনুভব ; যেন উহার স্পন্দন স্থগিত হইয়াছিল এপ্রকার অনুভব, তৎপরে হঠাৎ একটী কঠিন আঘাত প্রদান (সিপি)।

প্রবল হৃৎকম্প —উৎসহ পরিশ্রমের পরে মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে রক্তোচ্ছ্বাস, দ্রুত, ক্ষীণ, ক্লান্ত ও অনিয়মিত নাড়ী ; গলার ও বক্ষঃপ্রদেশের ধমনীর (Carotid) দৃশ্যমান স্পন্দন (বেল রস)।

হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষ (ফ্যাটিডিজেনারেশন) (ফস)।

উপচয়।—শীতল বায়ুতে ; শীতল হইবার সময় ; শয়ন-কালে ; ও মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি। কেবল শীতকালে অনেক লক্ষণের উপস্থিতি।

উপশম।—উষ্ণ বায়ুতে উষ্ণ হইবার সময় ; প্রাতে ও গ্রীষ্মকালে হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) অরমের পরে সিফিলিনাম ও সিফিলাইনামের পরে অরম ভাল খাটে (২) অস্থি-রোগে ও জরায়ু রোগে এসা ক্যাল্ক, হাট, সিপি, টার, থেরে, অরমের সমগুণ

আইওডাম।

(Iodum)

কৃষ্ণবর্ণ কেশ ও চক্ষুবিশিষ্ট গণ্ডমালা-ধাতু-দুষ্ট ব্যক্তি, প্রগাঢ় দুর্বলতা ও অতিশয় শীর্ণতা (এব্রোট) সংযুক্ত ধাতু-দুষ্ট অবস্থা।

উপরের তলায় উঠিবার সময় (ক্যাল্ক); ঋতুকালে (এলম, কার্ব্বো-এন, কক) অতিশয় দুর্বলতা ও শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা।

অতিক্ষুধা, বেশ আহার করা হয়, অথচ পেশীর শীর্ণতা জন্মে (এব্রো, ন্যাট-মিউ, স্যানি, টিউব)।

অন্ত্রকোণ হইতে নাভি পর্য্যন্ত শূন্যোদর, যেন ভুক্ত দ্রব্যের প্রত্যেক কণা পরিবর্ত্তিত হইয়া বায়ুতে পরিণত হইয়াছে (কালি-কা)।

ক্ষুধা হইলে কষ্ট হয়, অনবরত পরে পরে আহার করা আবশ্যক হয়, না খাইলে উৎকণ্ঠা ও বিরক্তি জন্মে (সিনা, সলফ); আহারকালে ও আহারান্তে, আমাশয় পূর্ণ থাকিলে, ভাল বোধ হয়।

কণ্ঠনালী — বুকাস্থির পশ্চাদ্ভাগে ফুসফুসের প্রদেশে কণ্ডুয়ন জন্মিয়া কাসের উদ্রেক; বায়ুনালীর অভ্যন্তর দিয়া নাসা-রন্ধ্র পর্য্যন্ত সেই কণ্ডুয়নের সম্প্রসারণ (কক্‌, কোনা, ফস)

গল-গ্রন্থি (thyroid), স্তন, ডিম্বাধার (ovary) অণ্ডকোষ, জরায়ু, মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থি (prostatic gland), ও লসিকা গ্রন্থির বৃদ্ধি ও দৃঢ়তা প্রাপ্তি — স্তনের শীর্ণতা ও কোমলতাও জন্মিতে পারে।

মলিনবর্ণ কেশবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শক্ত গলগণ্ড (পাতলা চুল বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে, ব্রোম); আহারান্তে ভাল বোধ হয়

হৃৎকম্প, যৎসামান্য পরিশ্রমে উহার আতিশয্য (ডিজি, তুলনা করুন — যৎসামান্য মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি, কালি-আর্স)

হৃৎপিণ্ড যেন সংপিষ্ট হইতেছে এরূপ অনুভব; যেন লৌহ নির্ম্মিত হস্তে ধৃত হইয়াছে এ প্রকার অনুভব (ক্যাক্টি, সলফ)।

ক্রুপ — ক্ষীণস্বরবিশিষ্ট ক্রুপ, স্বরভঙ্গযুক্ত শুষ্ক কাস, উহা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি; তৎসহ হাঁসফাঁস ও করাতচালনার ন্যায় শব্দ (স্পঞ্জ)

বালক হাতদিয়া অণ্ডকোষ ধরে (সেপা); বাল্যকেন্দ্র, বিশেষতঃ গ্রন্থিল বালক দের প্রথমত্বক পাণ্ডুবর্ণ ও শীতল হয়।

শ্বেতপ্রদর। বিদাহী প্রদর, স্রাবে বস্ত্রে দাগলাগে ও বস্ত্র খাইয়া যায়; ঋতুকালে প্রদরের সমধিক প্রাচুর্য্য জন্মে।

জরায়ুগ্রীবার (cervix) ক্যানসারজনিত অপকৃষ্টতা (degeneration); উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও প্রত্যেক বার মলত্যাগ কালে রক্তস্রাব।

বিফল মল-প্রবৃত্তি সহ কোষ্ঠ-রোধ, শীতল দুগ্ধপানে উহার উপশম।

উপচয়।— উষ্ণতায়; ও মস্তকে কাপড় জড়াইলে বৃদ্ধি (হিপার ও সোরিণমের বিপরীত)।

সম্বন্ধ। — (১) ল্যকোপোডিয়মের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট ক্রুপরোগে ও ক্রুপসংক্রান্ত পীড়ায়; বিশেষতঃ গণ্ডমালা-ধাতু গ্রস্ত অতিবর্দ্ধিত বালকদিগের রোগে, এসে-এসি, ব্রোম, কালী বাই, স্পোন্জি, ও হিপারের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (৩) হিপার ও মার্কেরি পরে আইওড ভাল খাটে; ক্রুপরোগে আইওডের পর, কালী-বাই ভাল খাটে (৪) লিপি বলেন যে পূর্ণিমার পরে, অথবা চন্দ্রের ক্ষয়প্রাপ্তির সময় প্রয়োগকরিলে আইওডিনের সর্ব্বোত্তম ক্রিয়া দর্শে। (৫) হেরিং বলেন যে প্রসূতাবস্থায় উচ্চক্রমে ভিন্ন এই ঔষধ ব্যবহার করা বিহিত নহে।

আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম্।

(Argentum Nitricum)

অসাধারণ অথবা দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক পরিশ্রমজনিত তরুণ বা পুরাতন রোগ।

শুষ্ক, শীর্ণ, বৃদ্ধবৎদৃষ্ট রোগী।

প্রতিদিবসের বিবর্দ্ধিত শীর্ণতা; নিম্নশাখ দ্বয়ে উহার অত্যন্ত স্পষ্টতা (এব-মি); ক্ষয়-রোগ (Marasmus)।

ভজনালয়ে অথবা নাট্যশালায় যাইবার সময় আশঙ্কার উৎপত্তি ও অতিসারের উপস্থিতি (জেল)।

সময় ধীরে ধীরে যায় (ক্যান-ইণ্ড); তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ করিবার ইচ্ছা; শীঘ্র শীঘ্র হাটন; সর্ব্বদাই সংনতা ব্যাকুলতা, কোপনতা, ও স্নায়বীয়তা (অর, লিল)।

শিরঃপীড়া।—মস্তকের পূর্ণতা ও গুরুতা সহ রক্ত-স্রোত জনিত; প্রসারণ অনুভব সহ সাহিত্যসেবীদিগের অত্যন্ত আমাশয়িক; নর্ত্তন জনিত; কপালের সম্মুখাংশের উন্নতস্থলে অথবা শঙ্খস্থানে (temple) আকুঞ্চন ও প্রচাপনবৎ এক পার্শ্বিক, পিত্ত বমনে পরিসমাপ্ত; অবসাদজনক মানসিক পরিশ্রমে বিবর্দ্ধিত; এবং প্রচাপনে বা দৃঢ়বন্ধনে উপশমিত (এপিস, পলস); শিরঃপীড়া।

চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের তরুণ দানাময় প্রদাহ; কাঁচা গো-মাংসের ন্যায় লোহিত বর্ণ, পুযাক্ত শ্লেষ্মাময় প্রভূতস্রাব।

নবজাত শিশুদিগের চক্ষু প্রদাহ।—পূযময় প্রভূত স্রাব নিঃসরণ; কনীনিকার (cornea) অস্বচ্ছতা ও ক্ষত; অক্ষি-পুটের ক্ষত, স্থূলত্ব ও শক্ততা; আত্তে সংযোজনা (এপিস, মার্ক-সল, রসটক্স)।

সূচী-কার্য্যজনিত চক্ষুর অস্বচ্ছতা, উষ্ণগৃহে উহার উপশম, ও অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি (ক্যাট-সি, রুটা)।

চিনি আহারের আকাঙ্ক্ষা, বালক চিনি খাইতে ভালবাসে, কিন্তু খাইলে অতিসার জন্মে (লবণ বা ধুম-শুষ্ক মাংস (smoked meat) আহারে স্পৃহা ক্যাল্ক-ফস)

আমাশয়ের অধিকাংশ রোগেই উদ্গারের বিদ্যমানতা।

আধ্মান সংযুক্ত (flatulent) আমাশয় প্রত্যেকবার আহারের পরে উদ্গার; বায়ুতে আমাশয় যেন ফাটিয়া যাইবে এরূপ অনুভব; উদ্গার অনায়াসে উঠেনা অবশেষে অতিশয় প্রবলবেগে বায়ু নিঃসৃত হয়।

গিলিবার সময় গলায় যেন চোঁচ ফুটিয়া রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব (ডলি, হিপ্, নাই-এসি, সিলি)। হাঁটিবার সময় অথবা অশ্বারোহনে জরায়ুতে বা ডিম্বকটেও চোঁচ ফুটার ন্যায় অনুভব।

অতিসার। - কাটা শাকের ন্যায় ছিবড়া ছিবড়া সবুজশ্যাম; শয্যা বস্ত্রে থাকিলে পরে সবুজবর্ণে পরিবর্ত্তিত; জলপানান্তে অতি-

সার; মিছরি অথবা চিনি খাওয়ার পর অম্লোদগার; অন্ননালি মস্তকেতে অথবা পিত্তে পিত্তে রাশি রাশি রোমাঞ্চিত পীড়কা ([illegible] mucolymph) পতন (প্রমার) তৎসহ সর্বদা অধিক বায়ু নিঃসরণ (বেলা)

জলপান করিবামাত্র অতিসার (আর্স, পোডো, [illegible])

দিবারাত্রি অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ (কষ্টি)

মলত্যাগ — এবং চেষ্টায় উপস্থের অনুভান (এলাম, কালি ফ, চেলিড)

রতি-ক্রিয়া। —স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই রতিক্রিয়ায় অনিচ্ছা; প্রসবান্তে যোনি হইতে রক্তপাত (নাই-এসি)

জরায়ুতে রক্তস্রাব —যুবতী বিধবাদিগের; বন্ধ্যাদিগের; স্নায়বীয় ক্রিয়ার বিকৃত বিবৃদ্ধি সহকারে নিবৃত্ত-রজস্ক দিগের (ল্যাকে); জরায়ু হইতে রক্তস্রাব

বিমল বায়ু সেবনের অতিশয় স্পৃহা (এপিস, পলস, সলফ)

গায়কদিগের স্বরভঙ্গ স্বরযন্ত্র প্রদাহ, উচ্চস্বরে কাস (এলাম, আর্জেন্ট মে, এরম)

'স্নায়ু'র অতিশয় দুর্বলতা, ও কম্পন, ... হাঁটিতে পারা যায় না।

দৃঢ়রূপে হাঁটিতে বা দাঁড়াইতে পারা যায় না, বিশেষতঃ যখন অন্য কেহ দেখে না মনে করা যায়

উদ্গারের (ঢেকুর) পূর্ব্বে অতিশয় অস্থিরতা

গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলে শীতানুভব, অথচ বস্ত্রাবৃত হইলে শ্বাস-রোধানুভব; বিমল বায়ু সেবনের স্পৃহা।

এই ঔষধে শিশুতে অধিক দন্তাঙ্কুরের উৎপত্তি নিবারণ করে।

উপচয়। —শীতল খাদ্য বা শীতল বায়ু; চিনি আহার, বরফের কুল্পী ভোজন; অসাধারণ মানসিক পরিশ্রমে; বৃদ্ধি।

উপশম। —অনাবৃত বায়ুতে; মুখমণ্ডলে বাতাস লাগিলে ও শীতল জলে স্নানে; হ্রাস।

সম্বন্ধ —(১) নাইট্রেটঅভ্ সিলভার দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়ার মন্দফলে ন্যাট্রম মিউর ফলপ্রদ (২) কাফি সেবনে এই ঔষধের স্নায়বীয় শিরোবেদনা বৃদ্ধি পায়। (৩) তামাক খাওয়ার পর বালকদিগের অসুখে এই ঔষধ

উপযোগী হয় (অম্ল, তিক্ত)। (৪) ছোট মিউ, মাইওসিস, জ্যাক ওয়াম, ও বুশের সহিত ইহার সমগুণ আছে (৫) ভিরেট্রমের পরে আর্জেন্টম নাইট্রিকম ভাল খাটে [illegible] আর্জেন্টম নাইট্রিকমের [illegible]

আনন্দ মাহাদেব [illegible] ছারা শিশুদিগের চক্ষু প্রদাহে [illegible] জলীয় অংশের স্থানিক প্রয়োগে উপকার দর্শে।

আর্জেন্টম মেট্যালিকম।

(Argentum Metallicum)

দীর্ঘ, ক্ষীণ কোমল-স্বভাব ব্যক্তিদের রোগ

পারদ অপব্যবহার জনিত রোগ

কৃত্রিম মৈথুনের সমকালীন দোষ

তরুণাস্থি (cartilage), অস্থি-সূচের উপাস্থি, কর্ণ, কর্ণ-নল, নাসিকা ও সন্ধিস্থলের বিধানাদির পীড়া

শুক্র দোষ — কৃত্রিম মৈথুনের পরে, শয্যায় শুইতে না দিতে; উপস্থের উত্থান ব্যতীত; ও উপস্থের শিথিলতা সহ নিদ্রাবস্থায় শুক্রপাত।

অণ্ডকোষের চূর্ণবৎ বেদনা

বাম ডিম্বাশয়ে (Ovary) ও পৃষ্ঠে বেদনা, এবং সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে উহার সম্প্রসারণ সহকারে জরায়ুর (জরায়ুর স্থান বিচ্যুতি prolapsus) (বাম ডিম্বাশয়ে বেদনা, প্যালে); বিধবা রমণীদিগের রজঃস্রাব।

[illegible], ও হৃৎসংযুক্ত [illegible]

ব্যবসায়ী গায়ক ও বক্তাদিগের স্বরভঙ্গ (এলম, এরম)।

ব্যবসায়ী গায়কদিগের সম্পূর্ণ স্বর-নাশ

কিছু গিলিলে, অথবা কাশিলে গলা ও স্বরযন্ত্রে অবদরণ (Sore) অনুভব।

হাস্যে কাশের উদ্রেক জন্মে (ড্রস, ষ্ট্যান, ষ্টান) ও স্বরযন্ত্রে প্রচুর শ্লেষ্মার উৎপত্তি হয়।

উচ্চৈঃস্বরে পড়িবার সময় খক খক করিয়া কাশিতে হয়; শিরীষের ছায় আঠা আঠা সিদ্ধ শ্বেতসারের (boiled starch) ন্যায় দুষ্ট, সহজে নির্গত নিষ্ঠীবন-বিশিষ্ট; কাশ।

বক্ষঃস্থলের অতিশয় দুর্বলতা (ষ্টেন); খাস প্রশ্বাসে উহার আধিক্য। গায়ক ও বক্তাদিগের স্বরের গুণের বৈলক্ষণ্য (ঐরূপ)।

শ্বাসযন্ত্রের দ্বিশাখা-স্থলের (bifurcation of the trachea) উপরে অনাবৃত ক্ষুদ্র স্থান; (raw spot) স্বরের ব্যবহারে, আলাপে বা গানে উহার আতিশয্য।

উপচয় — গাড়ীতে চড়িলে (কক); স্পৃষ্ট বা প্রচালিত হইলে; আলাপে গানে, ও উচ্চৈঃস্বরে পাঠে, বৃদ্ধি

সম্বন্ধ।—(১) এলুমেনের পরে আর্জেন্ট মেট ভাল খাটে (২) হ্যে কাশের উদ্রেকে ষ্ট্যানমের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

আর্ণিকা মণ্টেনা।

(Arnica Montana.)

স্নায়বীয়া নারী, রক্ত-প্রধান ব্যক্তি, এবং স্থূলাকৃতির সজীবতা ও অতিশয় আরক্ততা।

উপঘাতাদির মুখ্য বা গৌণফল। বিশেষতঃ সামান্য উপঘাতের দীর্ঘকাল স্থায়ী সংস্কার (হৃদ্রোগদল)।

সর্ব্বশরীরের অভ্যন্তর দিয়া আঘাতিতবৎ স্পর্শ-দ্বেষ, খঞ্জতা ক্লিষ্টতা অনুভব; পেশীর আভিঘাতিক পীড়া

আধিভৌতিক (মিক্যানিক্যাল) উপঘাত, বিশেষতঃ সংঘাত (কম্পশন) জনিত স্ফীতি (ষ্টুপর) সংযুক্ত, উপঘাত; অনিচ্ছায় মল মূত্র নিঃসরণ;

স্থূল-মুখ অস্ত্রজনিত উপঘাতের পর ব্যবহার্য্য (সিম্ফা)।

বিমিশ্র ভগ্ন (কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার) ও তজ্জনিত প্রচুর পূয়োৎপত্তি (ক্যালেণ্ড)

আঘাত বা উপঘাতের ফলে; কোমলস্থানের বিদারণ পরিশ্রম সংঘর্ষণে ও

নিস্পোষণে, এবং পুযোৎপত্তি ও পচন নিবারণার্থে ও আশোষণ-ক্রিয়া (absorption) প্রবর্দ্ধনার্থে ব্যবহার্য্য।

আঘাতীয়তা, বেদনা সহ্য হয়না ; সর্ব্বশরীরের অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য (ক্যাম, কফি ইত্যাদি)

<u>যে কোন বস্তুর উপর শয়ন করা যায় তাহাই অতিরিক্ত শক্ত বোধ হয়</u> ; রোগী অবিরত এই বিষয়ের অভিযোগ করে এবং একটু নরম স্থান পাইবার জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া সরিয়া যাইতে থাকে (শরীরের যে অংশে ভর দিয়া থাকা যায় তাহা ঘৃষ্ট বা খ্যাঁলিত বোধ হয়, ব্যাপ্ট, পাইরো ; বেদনার শান্তির জন্য অবিরত উহা নাড়াচাড়া আবশ্যক হয়, রসটক্স)।

শরীরের ঊর্দ্ধাংশের উত্তাপ ; নিম্নাংশের শীতলতা

মুখমণ্ডল অথবা কেবল মস্তক ও মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা ; নিম্নাংশের শীতলতা।

সংজ্ঞাশূন্যতা ; কিছু জিজ্ঞাসা করিলে পরিস্কাররূপে উত্তর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অচৈতন্য ও প্রলাপ তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত হয় (কোন বাক্যের মধ্যস্থানে ঘুমাইয়া পড়া, ব্যাপ্ট)।

রোগী বলে যে তাহার কিছু হয় নাই

উপঘাত বা অভিঘাত হইতে, পতন বা মস্তিষ্কের সংঘর্ষণজাত (concussion) মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহে, রক্ত-ক্ষরণের সংশোষ হইলে আশোষণের সাহায্যার্থ ব্যবহার্য্য।

হুপিংকফ রোগে ; বালকদিগের বাহুর সম্মুখাংশের মৃত্তবৎ শীতলতা (অ্যান্টিম টার্ট, বোরাম)।

সংন্যাস ; চৈতন্যশূন্যতা, অনিচ্ছায় মল-মূত্র নিঃসরণ ; তরুণ আক্রমণে এই ঔষধে রক্ত-ক্ষরণ প্রশমিত ও আশোষণ প্রবর্দ্ধিত হয় ; পুনঃপ্রয়োজিত হওয়া উচিত এবং রোগীর লক্ষণ দৃষ্টে অন্য ঔষধ ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় না হইলে কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ইহার ক্রিয়া হইতে দেওয়া বিহিত।

উপঘাত অথবা কাস বশতঃ চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে কিম্বা তারকামণ্ডলে (Iris) রক্ত ক্ষরিত হইয়া রক্তপাত (লিড, নাক্স)।

স্পৃষ্ট বা আহত হইবার অতিশয় আশঙ্কা সংযুক্ত, ১৬৮

ও অসমর্থতা।

বস্তি-গহ্বর (Pelvis) প্রদেশে এক প্রকার বেদনা বশতঃ খোঁড়া হইয়া হাঁটিতে অসমর্থতা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বেদনাবিশিষ্ট, একটার পর আর একটী অত্যন্ত বেদনা-বোধসংযুক্ত ফোটকোৎপত্তির পরম্পরা (একসঙ্গে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটকোৎপত্তি (সমষ্টি) ।

বামদিকের পক্ষাঘাত; সবল ও পূর্ণ নাড়ী; নাকের শব্দ সহ শ্বাস, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ; বিড় বিড় করিয়া বকা

উদ্গার, ঢেকুর; পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ

রক্তাতিসার; তৎসহ মূত্র-রোধ, বিফল মূত্র-বেগ, অনেকক্ষণ পরে পরে মলত্যাগ।

কোষ্ঠ-রোধ; সরলান্ত্রে মল সঞ্চিত থাকে, অথচ নির্গত হয় না; মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থির বৃদ্ধি অথবা গর্ভাশয়ের বিপর্যস্ততা (retroversion) বশতঃ ফিতার ন্যায় মল।

প্রসবের পর জননাঙ্গের স্পর্শ দ্বেষ; এই ঔষধে প্রসবের পরবর্তী রক্তস্রাব ও উপসর্গ নিবারিত করে

প্রসবের পর মূত্র-রোধ কিম্বা অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব (স্রাব) ।

উপচয়।—বিশ্রামে; শয়ন-কালে; ও সুরাপানে, বৃদ্ধি

উপশম।—স্পর্শে, ও সঞ্চালনে (নড়া, চড়া) হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) একন, হাইপার, ও রসটক্সের সহিত আর্ণিকার অনুপূরণ সম্বন্ধ। (২) স্পর্শ-দ্বেষে ব্যাপ্টি, চায়না, কফিয়া, হিপার, রসটক্স, ও ট্যাবেকমের সহিত আর্ণিকার তুলনা করা উচিৎ। (৩) একন, এপিস, হেমে ইপি, ভিরেট্রম পরে আর্ণিকা ভাল খাটে; আর্ণিকার পরে সল-ফর ভাল খাটে (৪) মদিরা পান কিম্বা অপরের ঘুমজনিত পীড়ায় অনেক সময় আর্ণিকা ব্যবস্থেয় হয় (৫) পৃষ্ঠবংশের সংঘাতে, হাইপারিকমের সহিত আর্ণিকা তুলনা হয়

আর্সেনিকম্ এলবম্।

(Arsenicum Album)

অতিশয় অবসন্নতা, জীবনী শক্তির শীঘ্র শীঘ্র অবসাদন; মূর্চ্ছা।

প্রকৃতিঃ— (ক) অবসাদ, বিষাদ, নিরাশ ভাব।

(খ) ব্যাকুলতা, ভয়পূর্ণতা অস্থিরতা, অস্বচ্ছন্দতা

(গ) কোপনতা, অনুভবাধিক্য, অল্পরাগিতা, সহজে বিরক্তির উৎপত্তি যাতনার যতই আতিশয্য অস্বচ্ছন্দতা, অস্থিরতা ও মৃত্যু ভয়ের ততই আধিক্য

মানসিক অস্থিরতা কিন্তু শরীরের এত দুর্ব্বলতা যে নড়িতে পারা যায় না; একস্থলে স্থির হইয়া থাকিতে পারা যায় না; অনবরত স্থান-পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়; রোগী এক শয্যা হইতে অন্য শয্যায় যাইতে চায়, এবং কখনও এখানে কখনও সেখানে শয়ন করিয়া থাকে।

ব্যাকুলতা সংযুক্ত মৃত্যু ভয়, রোগী মনে করে যে ঔষধ সেবনে কোন ফল দর্শিবে না, তাহার রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হইবে না; সে নিশ্চয়ই মরিতে যাইতেছে; একাকী থাকিলে, অথবা শয্যায় শয়ন করিতে গেলে মৃত্যু-ভয়।

রাত্রিতে উৎকণ্ঠার আক্রমণ, তজ্জন্য শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, মধ্যরাত্রির পরে উহা বর্দ্ধিত হয়

জ্বালাকর বেদনা, আক্রান্ত স্থান অগ্নি-দাহের ন্যায় জ্বালা করে, বোধ হয় যেন ঐ সকল স্থলে তপ্ত অঙ্গার লাগান হইয়াছে (এবং) উত্তাপ, উত্তপ্ত পানীয় দ্রব্য, এবং উত্তপ্ত বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা উহার হ্রাস জন্মে

অত্যধিক পিপাসা অথচ জলপান করিবার প্রবৃত্তিহীনতা; আমাশয়ে জল সহ্য হয় না, কেননা উহা শীতল জল জীর্ণ করিতে পারে না; আমাশয়ে শীতল জল প্রস্তরের ন্যায় অবস্থিত থাকে। রোগী জল চায় বটে কিন্তু পান করিতে পারে না বা সহ্য করে না।

খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ বা দর্শন সহ্য করিতে পারা যায় না (কলচি, সিপি)।

শীতল জল পানের অতিশয় পিপাসা; এক একবার অল্প অল্প করিয়া বারবার জলপান; কচিৎ কচিৎ আহার গ্রহণ কিন্তু পরিমাণে অধিক।

শীতল জল; বরফের কুল্পী, বরফের জল, অম্ল বিয়ার; বিশিষ্টরূপে প্রস্তুত মাংস (সসেজ); উগ্র মদিরা, উগ্র পনির; সেবন বশতঃ আমাশয়িক উপদ্রব।

দাঁত উঠিবার সময় শিশুদিগের পাকাশয়ের দুর্বলতা, বিরক্তচিত্ততা, ও কোলে চড়িয়া দ্রুত গতিতে বেড়াইবার প্রবৃত্তি।

আহার বা পানান্তে অতিসার; অম্ল, মলিন বর্ণ, দুর্গন্ধময় মল; মল ক্ষুদ্রই হউক বা বৃহৎই হউক, মলত্যাগের পর অতিশয় অবসন্নতা।

অর্শ:—হাঁটিলে বা বসিয়া থাকিলে, কিন্তু মলত্যাগ কালে নয়, সূচী বেধবৎ বেদনা; তদ্বারা উপবেশন ও নিদ্রার ব্যাঘাত; উত্তাপ প্রদানে জ্বালাকর বেদনার হ্রাস প্রাপ্তি; অর্শ বলির বিদারণ বশতঃ মলত্যাগে কষ্ট।

শ্বাস। শ্বাস-কাসের (Asthma) শ্বাস; উঠিয়া বসিতে অথবা সম্মুখভাগে অবনত হইয়া থাকিতে হয়; রাত্রিতে, বিশেষতঃ বারটার পরে, শয্যা হইতে নামিয়া পড়িতে হয়; শ্বাস-রোধের আশঙ্কায় শয়ন করিতে পারা যায়না; শীতপিত্ত (Urticaria) রোগের পরিবর্তে এই রোগের আক্রমণ।

সত্বর শীর্ণতাপ্রাপ্তি।—শীতল ঘর্ম ও অতিশয় দুর্বলতা সহকারে শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণতা (টিউব, ভিরে); রোগাক্রান্ত স্থানের শীর্ণতা ক্ষয় (Marasmus)।

শোথ, ত্বকের পাণ্ডু বর্ণ, মোমের বর্ণ, মৃত্তিকার বর্ণ (এসে-এসি)।

যৎসামান্য পরিশ্রমে অত্যন্ত অবসন্নতা।

স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে রোগীর অবসন্নতা অনুভূত হয়না; কিন্তু নড়িলে চড়িলে বড়ই অবসন্ন বোধ হয়।

অপরাহ্ন ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত, এবং রাত্রি ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত সময়ে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি।

ত্বক।—শুষ্ক ও কর্কশ, শীতল, নীলবর্ণ ও কুঞ্চিত; শীতল, আঠা আঠা ঘর্ম্মাক্ত, পার্চমেণ্ট সদৃশ, শুষ্ক ও মোমবৎ; কৃষ্ণবর্ণ ফোস্কা ও জ্বালাকর বেদনাবিশিষ্ট ত্বক।

আঘ্রাণ, আহার, অথবা অন্য কোন প্রকারে শরীরে পচা মাংস কিংবা পচা জান্তব পদার্থের সংপ্রবেশের লক্ষণ।

উপচয়।— মধ্যরাত্রির পরে (১টা হইতে ২টা রাত্রি পর্য্যন্ত); শীতলতা হইতে; শীতল আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্যে; আক্রান্ত পার্শ্বে অথবা মস্তক নীচু করিয়া শয়নে, বৃদ্ধি।

উপশম।— সাধারণতঃ উত্তাপে (সিকেলির বিপরীত), কিন্তু শিরঃপীড়ায় উত্তাপে নহে, শীতল জলে ধুইলে এই শিরঃপীড়ার অস্থায়ী হ্রাস (স্পিজি); জ্বালাকর বেদনা, উত্তাপে উহার হ্রাস প্রাপ্তি।

সম্বন্ধ।— (১) এলিয়ম সেপা, কার্ব্বো, ফস ও পাইরোজেনের সহিত আর্সেনিকের অনুপূরক (Complementary) সম্বন্ধ। (২) তামাক চর্ব্বণ; মদিরাপান; সমুদ্রজলে স্নান; মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ জনিত ক্ষত ও কার্ব্বঙ্কলের বিষ; বিষাক্ত জন্তুর হুল-ফোটাদি জনিত পীড়ায় আর্সেনিকের কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম।

(Eupatorium Perfoliatum)

বৃদ্ধদিগের রোগে; ভগ্নদেহ, বিশেষতঃ অপরিমিত সুরাপান বশতঃ ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিগণের রোগে; দীর্ঘকাল স্থায়ী অথবা পুনঃ পুনঃ পৈত্তিক জ্বর বা সবিরাম জ্বরের আক্রমণ জনিত ধাতু-বিকৃতিতে এই ঔষধ উপযোগী।

সর্ব্ব শরীরে ভগ্নবৎ ঘৃষ্টতা-অনুভব (আর্ণ, বেলিস, ইয়ো)।

পৃষ্ঠ, মস্তক, বক্ষঃস্থল, অস্থিতে [illegible] ([illegible]) [illegible]

অস্থি-বেদনা।

বেদনার সহিত [illegible] হয় (পাছ, মাজা, তুলনা করুন)

অক্ষি-কোটরকে বেদনা [illegible] ; [illegible], [illegible] অস্থিতে বেদনা ; [illegible] কাল।

শীঘ্র শীঘ্র বেদনার ভাবান্তর ও [illegible] ([illegible], [illegible], ইউপেটোর্)।

শিরোঘূর্ণন, যেন বামদিকে [illegible] পড়িয়া যাইবে [illegible] (পড়িবার আশঙ্কায় বামদিকে মাথা ফিরাইতে পারে না, বলে।)

কাশ।—পুরাতন কাশ, [illegible] ([illegible]) [illegible] তরল কাশ, বক্ষঃস্থলে [illegible], হাত দিয়া বুক চাপিয়া রাখিতে হয় ([illegible]); রাত্রিতে বৃদ্ধি, ঘামের পরে অথবা [illegible] পরে কাশ।

জ্বর — একদিন পূর্বাহ্নে ৭টা হইতে ৯ [illegible], পরদিন মধ্যাহ্নে [illegible], শীতের শেষে তিক্ত বমন; জল পানে [illegible] হয় শীতের পূর্বে ও শীতের ভোগকালে, অস্থি বেদনা।

শীত ও তাপাবস্থার পূর্বে ও ভোগকালে অত্যন্ত পিপাসা; রোগী যথেষ্ট জল পান করিতে পারেনা বলিয়া, শীত আসিতেছে জানিতে পায়।

সম্বন্ধ। (১) এই ঔষধের পরে [illegible] এবং [illegible] ভাল খাটে (২) পাণ্ডুরোগ অবস্থায় [illegible] চোখ [illegible], ও [illegible] হয় (৩) ব্রাইয়োনিয়া এই ঔষধের নিকট সম্বন্ধ। প্রভেদ এই যে ব্রাইয়োনিয়ায় বিমুক্ত ভাবে ঘর্ম নিঃসৃত হয় ও বেদনায় রোগী স্থির হইয়া থাকে; ইউপেটোরিয়মে অল্প ঘর্ম হয় এবং বেদনায় রোগীর অস্থিরতা থাকে।

ইউফ্রেসিয়া ।

(Euphrasia)

পতন, সংঘর্ষ অথবা বাহ্যিক অন্যবিধ আধিভৌতিক (মিক্যানিক্যাল) আঘাতের দরুণ (আর্ণি)

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, (mucous membranes) বিশেষতঃ চক্ষু ও নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায়জনিত পীড়া (catarrhal affections)।

প্রচুর বিদাহী অশ্রুস্রাব, তৎসহকারে প্রচুর, অবিদাহী প্রতিশ্যায় (এলিয়ম-সেপার বিপরীত)।

চক্ষু দিয়া সকল সময়েই জল পড়ে, এবং তাহাতে চক্ষু সংযোজিত হইয়া থাকে ; চক্ষুর পাতার প্রান্তদেশ আরক্ততা, স্ফীততা ও জ্বালা।

প্রাতঃকালে প্রবল কাস ও প্রচুর নিষ্ঠীবন সহকারে প্রচুর তরল প্রতিশ্যায়, দক্ষিণদিকের উষ্ণ বাতাসে উহার বৃদ্ধি

প্রাতঃকালে বিরক্তিকর শ্লেষ্মাখণ্ড তুলিতে চেষ্টা করিবে, যে পর্যন্ত অব্যাহত পূর্বে ভুক্ত দ্রব্যাদির বমন হইয়া না পড়ে সে পর্যন্ত গলায় ঠেকা ঠেকা অনুভূত হয় (বাই)

ইচ্ছাপূর্বক খক্ খক্ করিয়া কাসিলে প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলে উহার বৃদ্ধি।

হুপিং কাস কাসিবার সময় অতিশয় অশ্রুস্রাব ; কেবল দিবাভাগে কাস (ফেরম, ন্যাট-মিউ)।

চক্ষু এবং নাসিকার প্রতিশ্যায় সহকারে রজোলোপ, প্রচুর বিদাহী অশ্রুস্রাব।

ঋতু যন্ত্রণাপ্রদ, নিয়মিত, কেবল এক ঘণ্টাস্থায়ী স্রাব ; অথবা বিলম্বে প্রকাশিত ; স্বল্প, অল্পকালস্থায়ী, কেবল একদিন অবস্থিত, ঋতু (ব্যারা)।

উপচয়। সন্ধ্যাকালে, শয্যায়, গৃহের অভ্যন্তরে উষ্ণতায়, আর্দ্রতায়, দক্ষিণদিকের বাতাস লাগাইবার পর ; কেহ স্পর্শ করিলে (হিপা) ; বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—(১) চক্ষু-রোগে ক্যাল্কেরিয়ার সমতুল্য। (২) অপস্মারে সাইলিশিয়ার পরিবর্তে ... বিপরীত।

ইকুইসিটম হাইমেল।

(Equisetum Hyemale.)

মূত্রাশয়ে ও মূত্রনলীতে তীব্র বেদনা, মূত্রত্যাগে উহার উপশম হয় না।

ঘন ঘন ও সর্বদা মূত্রবেগ এবং মূত্রত্যাগের শেষে তীব্র বেদনা (বার্বা, সার্সা, থুজা)।

অনিয়ত মূত্র-প্রবৃত্তি, অধিক পরিমাণ, পরিষ্কার, জলবৎ মূত্র ত্যাগেও উহার আনবৃত্তি (ক্যান্থ, লিলিয়ম, ক্যাষ্ট)।

প্রস্রাব ত্যাগ করিলে মূত্রাশয়ে তীব্র আঘাতবৎ ও জ্বালাবৎ বেদনা।

বালকদিগের মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত

দিবসে ও রাত্রিতে অনিচ্ছায় মূত্রপাত; অথবা স্বপ্নে মূত্র, অভ্যাসই কেবল উহার বিশেষ কারণ।

সম্বন্ধ।—লাইকো, ক্যান্থ রিসিনাস, পালস ও ফেরামের সহিত এবং উহাদের তুলনা হয়।

ইগ্নেশিয়া।

(Ignatia).

স্নায়বীয় প্রকৃতি; অতিরিক্ত অনুভূতি ও সহজে উত্তেজনাশীলতাবিশিষ্ট স্ত্রীলোক; এবং মলিন বর্ণ কেশ ও ত্বক, কিন্তু মৃদু স্বভাব, দ্রুত অনুভব; সত্বর কার্য্য সম্পাদন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইগ্নেশিয়া বিশেষ উপযোগী। পালসেটিলার সুন্দর মুখাকৃতি, নম্রশীল প্রকৃতি, অশ্রুপ্রবণতা, ধীরতা ও চিত্তের অস্থৈর্য্যতার সহিত ইগ্নেশিয়ার বিপরীত সম্বন্ধ। রক্তপ্রধান ও পিত্ত-প্রধান পুরুষদিগের সহিত নক্সভমিকার যে সম্বন্ধ, স্ত্রী-লোকদিগের রোগে ইগ্নেশিয়ার সেই সম্বন্ধ।

ইগ্নেশিয়ার লক্ষণে অতিশয় অসঙ্গতি থাকে। — যথা—
গীত-বাদ্যে কর্ণের গর্জ্জন-ধ্বনির উপশম; হাঁটিবার সময় অর্শের যাতনার শান্তি; গিলিবার সময় গলা-বেদনার শান্তি; আহারে আমাশয়ের শূন্যতানুভবের অনুপশম; যতই কাশা যায় ততই কাশের বৃদ্ধি, হাঁটিবার সময় স্থির হইয়া দাঁড়াইলে কাশের উদ্রেক; শোকজন্য আক্ষেপিক হাস্য; মলভঙ্গ সহ রমণ-প্রবৃত্তি জ্বরের শীতাবস্থায় তৃষ্ণা, তাপাবস্থায় তৃষ্ণাহীনতা; বিশ্রামকালে বদনের বর্ণের পরিবর্ত্তন; আহারকালে দাঁত বেদনার উপশম।

অতি শীঘ্র শীঘ্র, অর্থাৎ অত্যল্প সময়ের মধ্যে মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ আহ্লাদ হইতে দুঃখে হাস্য হইতে ক্রন্দনে পরিণতি (কফি, ক্রোক, নক্স-ম); খামখেয়াল।

দীর্ঘকালস্থায়ী সংযত শোক বশতঃ মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতা।

অনিচ্ছায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ (ষ্ট্যাফ); তৎসহ আমাশয়-গহ্বরে দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা অনুভব, আহার গ্রহণে উহার অনুপশম

কোপ, শোক অথবা নিরাশ প্রেমের মন্দফল (হাইও, ফ্যাস্ক-ফস); কল্পিত উপদ্রব সম্বন্ধে বিরলে দুশ্চিন্তা।

একাকী থাকিতে ইচ্ছা।

তীব্র অনুভূতি; সুতীব্র বিবেক

চঞ্চলতা, অধীরতা আত্ম-পরিজ্ঞতা, কলহকারিতা।

শরীর স্বচ্ছন্দ থাকিলে প্রকৃতিও ভাল থাকে, কিন্তু অতি যৎসামান্য চিত্ত-বিকারে সহজে ব্যাকুলতার উৎপত্তি হয়; সহজে বিরক্তি জন্মে।

যৎসামান্য দোষ-দর্শনে বা প্রতিবাদে ক্রোধের উদ্রেক জন্মে, ও উহাতে নিজের প্রতি রাগ হয়।

বালকদিগকে তিরস্কার করিতে অথবা তাড়না করিয়া শুইতে পাঠাইয়া দিলে, তাহাদের পীড়া হয়, কিম্বা নিদ্রাবস্থায় টঙ্কার (খেঁচুনি) জন্মে।

অশুভ সংবাদ; সংযত অসন্তোষ সংযুক্ত বিরক্তি; গুপ্ত মানসিক অসুখ; এবং লজ্জা ও দুঃখের মন্দফল (ষ্ট্যাফ)।

মস্তকের পাশ দিয়া যেন একটা কোন বিদ্ধ হইতেছে এরূপ শিরঃপীড়া, তথায় ভর দিয়া শয়ন করিলে উহা উপশমিত হয় (কাফ, নাক্স, পুল্‌স)।

<u>তামাক সহ্য হয়না ;</u> তামাক খাইলে অথবা তামাকের ধূম লাগাইলে মাথা ধরে বা মাথা-ধরা বাড়ে

কথা বলিতে বা চর্ব্বণ করিতে গালের অভ্যন্তরভাগ দংশিত হয়।

কেবল আহার করিবার সময় মুখমণ্ডলের কোন এক ক্ষুদ্রস্থানে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

বেদনায় অতিরিক্ত অনুভূতি (ক্ষ্যাম, কাম)।

নিদ্রিত হইবার সময় কোন অঙ্গের অথবা সর্ব্ব শরীরের স্পন্দন, উৎক্ষেপন, বা আক্ষেপ।

সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা

প্রায়শঃ ঠিক একই ঘটিকায় রোগের প্রত্যাবৃত্তি।

কোষ্ঠ-রোধ গাড়ীতে আরোহণজনিত, ও পক্ষাঘাতমূলক কোষ্ঠ-রোধ; অত্যন্ত মল-বেগ, উদরের ঊর্দ্ধভাগে উহার আধিক্য অনুভব (ভিরে); মল-ত্যাগে অতিশয় যাতনা, পায়খানায় যাইতে ভয় হয়; কপী-পায়িনীদিগের কোষ্ঠ-কাঠিন্য।

মলত্যাগে অধিক বেগ দিলে, ঝুঁকিলে (Stooping) হইলে, অথবা কিছু উঠাইতে চেষ্টা করিলে গুহ্যভ্রংশ (হাড়িশ বাহির হইয়া পড়া) (নাই-এসি, পডো, রুটা); তরল মলত্যাগ-কালে উহার বৃদ্ধি

অর্শ। প্রতিবার মলত্যাগ কালে বলি নিঃসরণ, হাত দিয়া পুনরায় উহা ভিতরে দিতে হয়; সরলান্ত্রের উপরের দিকে তীব্র সূচী বেধের ন্যায় যাতনার সঞ্চারণ হয় (Shoot up) (নাই-এসি); মলত্যাগের পরে কয়েক ঘন্টা পর্য্যন্ত উহার আধিক্য থাকে (ম্যুট সল)

জর।—শীতাবস্থায় বদনের আরক্ততা (ফির); শীত, কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা, বাহ্য উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি; উত্তাপাবস্থায় পিপাসা-শূন্যতা; বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিলে উত্তাপের উপশম (আবরণে উত্তাপের বৃদ্ধি, নক্স)।

উপচয়।—তামাক কফি, ক্লান্তি, স্পর্শ, গতি, তীব্রগন্ধ, মনোভাব, ও শোক হইতে বৃদ্ধি।

উপশম।—উষ্ণতা, শক্তপ্রচাপন (সিদ্ধ); নিঃসরণ; ও বিচরণে উপশম।

সম্বন্ধ।—(১) কফি, নস্য, ট্যাবের সহিত ইগ্নেশিয়ার বিষম-গুণ সম্বন্ধ (২) ইগ্নেশিয়ার মন্দফল পলসেটিলা দ্বারা নিবারিত হয়।

ইথুসা সাইনেপিয়ম।

(Æthusa Cynapium)

উত্তপ্ত গ্রীষ্মকালে শিশুদিগের দন্তোদ্গমজনিত রোগে বিশেষ উপযোগী; যে সকল শিশুর দুগ্ধ সহ্য হয় না, তাহাদের পক্ষে ফলপ্রদ।

অতিশয় দুর্বলতা।—শিশু দাঁড়াইতে পারেনা; মাথা খাড়া করিতে পারেনা (এব্রোট); নিদ্রালুতাসহ অবসন্নতা।

শিশুদিগের জড়ত্ব —চিন্তা করিতে অসামর্থ্য; হতবুদ্ধিতা।

অতিশয় উৎকণ্ঠ ও যাতনাজ্ঞাপক মুখাকৃতি, তৎসহ নাসিকার আকৃষ্ট অবস্থা ও সুস্পষ্ট কুঞ্চন-রেখা।

যাতনা ও উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক মুখশ্রী।

নাসিকার প্রান্তভাগে দদ্রুজনিত উদ্ভেদ।

সম্পূর্ণ পিপাসাশূন্যতা (এপিস, পলস, আর্সের বিপরীত)।

দুগ্ধাসহ্যতা।—কোন আকারেই দুগ্ধ সহ্য হয় না; খাইবামাত্র বড় বড় সংযত খণ্ডে বমন হইয়া পড়ে; তৎপরে দুর্বলতাবশতঃ তন্দ্রালুতা জন্মে (ম্যাগ-কার সহিত তুলনা করুন)।

দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগের অগ্নিমান্দ্য; একপ্রকার ফেনিল, দুগ্ধবৎ শুভ্র পদার্থ, প্রবলবেগে সহসা বমন; অথবা পীতবর্ণ তরল পদার্থ বমন, তৎপরে সংযত দুগ্ধ ও পণিরবৎ পদার্থ উদ্গীরণ।

আহারের এক ঘটিকা পরে ভুক্তদ্রব্য উদ্গীরণ; হরিতাভ প্রভূত বমন।

আকুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠ, আরক্ত মুখমণ্ডল, নিম্নদিকে আঘূর্ণিত (Turned downward) চক্ষু; স্থির ও প্রসারিত চক্ষু তারা; মুখে ফেণা; দন্তবদ্ধ হয় (Jaws locked), মৃদু মৃদু স্পন্দনাড়ী; তৎসহকারে অপস্মারের আক্ষেপ (Epileptic spasms)।

বমন, মল-ত্যাগ, ও আক্ষেপের পরে নিদ্রালুতা সহকারে দুর্বলতা ও অবসন্নতা

উপচয়।—আহারে বা পানান্তে; বমনান্তে, মলত্যাগান্তে, ও আক্ষেপান্তে বৃদ্ধি

সম্বন্ধ।—এণ্ট-ক্রুড, আর্স, ক্যাল্ক ও সোনাবউলার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

ইপিকাকুয়ানহা।

Ipecacuanha

আমাশয়িক লক্ষণের প্রাধান্য (এণ্ট-ক্রুড, পল্স); জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা, অথবা অল্প লেপাচ্ছন্নতা।

অবিরত ও অনবরত বিবমিষা (Nausea) সংযুক্ত সকল রোগ।

বিবমিষ।— প্রচুর লালা নিঃসরণ; অপ, চিকণ (glairy), অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা বমন, অথচ উহাতে বিবমিষার অনুপশম; বমনের পর নিদ্রালুতা, মাথা ঘোরাইলে উহার আতিশয্য; তামাকের মুখ্য ফল (Primary effects); গন্ধের মুখ্য ফল।

আমাশয়।—আমাশয় যেন ঝুলিয়া পড়িয়াছে (ইগ্নে, ষ্ট্যাফ), এরূপ শিথিলতা অনুভব; যেন হাত দিয়া উহা মোচড়ান, আঁকড়ান ও নিঙড়ান যাইতেছে, এবং অন্ত্রের অভ্যন্তরে হাতের প্রত্যেকটি আঙ্গুল তীব্রভাবে চাপ দিতেছে এপ্রকার অনুভব; নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি।

নাভীর নিকটে আধ্মান (Flatulence) জনিত কর্ত্তনবৎ উদর-বেদনা।

IMPERIAL

মল।—ঘাসের ন্যায় সবুজ; সাদা আমসংযুক্ত (কলচি); রক্তাক্ত উৎসেচিত (Fermented), ফেনিল, শেওলা শেওলা; ফেণা ফেণা গুড়ের মাতের মত; মল।

উত্তপ্ত দিবস, শীতল রাত্রি বিশিষ্ট শরৎকালের রক্ত তিসার (কলচি, মার্ক)।

এসিয়িক ওলাউঠার প্রথম লক্ষণ, বিবমিষা ও বমনের প্রাধান্য (কলচি)।

রক্ত-স্রাব—প্রবল বা অপ্রবল; শরীরের সকল দ্বার হইতে উজ্জ্বল লোহিত (ইরি, মিলি); জরায়ু হইতে প্রচুর, সংযত; রক্তপাত

রক্ত-স্রাব কালে শ্বাসের কষ্ট; নাভী হইতে গর্ভাশয়ে সূচী-বেধন

উদরের আড়াআড়ি বাম হইতে দক্ষিণ দিকে কর্তনবৎ বেদনা (ল্যাক)।

শুষ্ক, আক্ষেপিক, আকুঞ্চিত, শ্বাস-কাসজনিত, কাস

অল্পমাত্র পরিশ্রমে শ্বাস-কষ্ট; হাঁসফাঁস শব্দ ও আমাশয়ের সমীপে উৎকণ্ঠা সহকারে প্রবল শ্বাস-কৃচ্ছ্র

শ্বাস-লোপ, পাণ্ডুবর্ণধারণ, আড়ষ্টতা ও নীলবর্ণপ্রাপ্তি; মুখ-রোধ ও শ্লেষ্মা-বমন সংযুক্ত শ্বাস কৃচ্ছ্র ও নাসিকা অথবা মুখ হইতে রক্ত-পাত (ইপিকাক); এই সকল লক্ষণাপন্ন হুপিংকফ কাস।

নিশ্বাস-গ্রহণকালে বায়ু-নলী ভুজে শ্লেষ্মায় ঘড় ঘড় শব্দ সহকারে কাস· শ্লেষ্মা হইতে শ্বাস-রোধের আশঙ্কা

অস্থিগুলি সকলই যেন ছিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইতেছে এরূপ বেদনা (যেন ভগ্ন হইতেছে, ইউপ)।

সবিরাম জ্বর—অনিয়মিত বা বিশৃঙ্খল সবিরাম জ্বরের চিকিৎসায় প্রারম্ভে; বিবমিষা সংযুক্ত, অথবা আমাশয়িক উপদ্রবজনিত; কুইনাইন, অপসেবিত, অথবা কুইনাইন দ্বারা অবরুদ্ধ; সবিরাম জ্বর।

একদিন পর একদিন একই ঘণ্টায় উপস্থিত সবিরাম অগ্নিমান্দ্য, ও দুর্নিবার বিবমিষা সহকারে জ্বর।

উত্তাপ ও শীতলতায় অতিরিক্ত অনুভূতি

উপচয়।—শীতকালে ও পরিশুষ্ককালে; উষ্ণ, আর্দ্র দক্ষিণ দিকের বাতাসে (ইউপে); যৎসামান্য সঞ্চালনে, বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—(১) কুপ্রামের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) আমাশয়িক উপদ্রবে পলস্ ও এণ্ট-ক্রুডের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (৩) ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দ্দি, ক্রুপ, দুর্ব্বলতা ও শিশু বিসূচিকা রোগে ইপিকাকের পর আর্সেনিক ভাল খাটে; শ্বাসযন্ত্রে বৈদেশিক (Foreign bodies) থাকিলে ইপিকাকের পর এণ্ট-টার্ট উপযোগী হয়।

ইস্কিউলাস হিপোক্যাষ্টেনম।

(Æsculus Hippocastanum)

যে সকল ব্যক্তির অর্শ-প্রবণতা থাকে, এবং যাহারা আমাশয়িক, পৈত্তিক অথবা প্রাতিশ্যায়িক উপদ্রবে (Catarrhal troubles) উপদ্রুত হয় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

রক্তাধিক্য জনিত পূর্ণতার ন্যায় হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, আমাশয়, মস্তিষ্ক, বস্তি-গহ্বর (Pelvis) ও ত্বকাদি বিবিধ স্থানের পূর্ণতা।

যকৃতের শিরা ও অর্শ-শিরার শৈরিক রক্ত-সঞ্চয়।

নিরাশা, বিষণ্ণতা; অতিশয় কোপনতা; সহজে ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং ধীরে ধীরে উহার শান্তি জন্মে; অতিশয় স্মরণশক্তিহীনতা (ক্ষয়)।

মুখ-বিবর, গল-গহ্বর, ও সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্ফীততা, জ্বালা, শুষ্কতা ও অবদরণ অনুভব।

নাসিকার প্রতিশ্যায়; পাতলা জলবৎ জ্বালাকর স্রাব; নাসিকায় অবদরণ এবং নিশ্বসিত, শীতল বায়ুতে অতিরিক্ত অনুভূতি।

ফলিকিউলার ফ্যারিঞ্জাইটিস; প্রবল জ্বালা, গলার মধ্যে অবদরণ অনুভব; গল-মধ্যের নীরসতা ও খরস্পর্শতা।

ফসিসে (Fauces) জ্বালা, কণ্টকবেধন, সূচ-বেধন, নীরসতা ও আকুঞ্চন অনুভব সহ বারংবার গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি।

সরলান্ত্র (rectum)।—সরলান্ত্রের শুষ্কতা ও উত্তাপ; সরলান্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডে পূর্ণ রহিয়াছে এরূপ অনুভব; সরলান্ত্রের

উৰ্দ্ধদিকে ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় বেদনার সঞ্চলণ (ইগে, সল') ; অস্রাবী, ব্যথিত, জ্বালাকর ঈষৎ বেগুণি বর্ণের অর্শ ; কচিৎ রক্তস্রাব।

পূর্ণতা, জ্বালা ও কণ্ডূয়ন (সলফ) সহ সরলান্ত্রের টাটানি।

কোষ্ঠ-রোধ — শক্ত, শুষ্ক, আয়াসে নিঃসারিত মল · তৎসহকারে সরলান্ত্রের শুষ্কতা ও উত্তাপ ; কটি ও ত্রিকস্থানীয় (Lumbo-sacral) তীব্র পৃষ্ঠ-বেদনা।

মল-ত্যাগের পরে কতিপয় ঘটিকাপর্য্যন্ত সরলান্ত্রের পূর্ণতা ও মল-দ্বারের সুতীব্র বেদনা (এলো, ইগে, মিউ-এসি, সলফ)।

কম্প ; ও বিদাহী, মলিন প্রদর, তৎসহ কটি-বেদনা এবং হাঁটিলে অতিশয় শ্রান্তি।

কটি ও ত্রিকস্থানের সংযোগ-স্থলে তীব্র পৃষ্ঠ বেদনা ; বেদনার অল্পাধিক নিরন্তর বিদ্যমানতা ; ত্রিক (Sacrum) ও বস্তিকোণের (Hips) আক্রান্ততা

পিঠ ভাঙ্গিয়া আইসে ; গর্ভাবস্থায় হাঁটিলে বা মাথা নোয়াইলে কম্প, ও প্রদর জন্মে ; বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে হয়।

পৃষ্ঠে গুরুত্ব ও খঞ্জত্ব অনুভব

বাহু, জঙ্ঘা ও পৃষ্ঠবংশে পক্ষাঘাতবৎ অনুভব।

উপচয়।— নড়িলে চড়িলে ; শীতল বায়ু নিঃশ্বসনে ; এবং পৃষ্ঠ-বেদনা ও স্পর্শদ্বেষ বিচরণে ও অজীর্ণ হইলে ; বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—(১) অর্শে ; এলো, কোলিন, ইগে, মিউ-এসি, নক্স, সলফের সমগুণ। (২) কোলিন ব্যবহারে অর্শের কতকটা উপশম পড়িলে ইস্কিউ দ্বারা প্রায়ই আরোগ্য জন্মে (৩) নক্স ও সলফ ব্যবহারে অর্শে উপকার দর্শিলে, কিন্তু আরোগ্য না জন্মিলে ইস্কিউ ফলপ্রদ।

একোনাইটম নেপেলস।

(Aconitum Npaollus)

যুবক-যুবতীদিগের, বিশেষতঃ রক্ত-প্রধানা অব্যায়ামশীলা, কুমারীদিগের তরুণ বা নূতন রোগে; বাতাসের পরিবর্তনে সহজে অসুখের উৎপত্তিতে; মলিনবর্ণ চুল ও চক্ষু এবং শক্ত পেশী-তন্তু (rigid muscular fibre) বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে; সাধারণতঃ একোনাইট উপযোগী।

শুষ্ক শীতল বায়ু, উত্তরদিকের কিম্বা পশ্চিমদিকের শুষ্ক বাতাস, ও ঘর্মাবস্থায় শীতল বায়ু-প্রবাহ লাগিয়া রোগোৎপত্তি; ধস-রোগের সমফল।

অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা সহকারে অতিশয় ভয় ও চিত্তের উৎকণ্ঠা (anxiety) বাহিরে যাইতে, উত্তেজনা ও অধিক লোকবিশিষ্ট জনতায় যাইতে; রাস্তা পার হইতে; ভয়।

ভীততা সূচক মুখাকৃতি; ভয়বশতঃ জীবনের শোচনীয়তা, রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে বলিয়া নিশ্চিত ধারণা; মৃত্যুর দিন পূর্বেই বলা; গর্ভকালে মৃত্যু-ভয়।

অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদনে অতিশয় ব্যস্তসমস্ততা; সদাসর্বদা অবস্থান পরিবর্তনের আবশ্যকতা; সকল বস্তুতেই চকিততা।

বেদনা।—বেদনায় অসহিষ্ণুতা, বেদনা বশতঃ ক্ষিপ্ততা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠা; রাত্রিতে আধিক্য।

হানিম্যান বলেন যে "হোমিওপ্যাথি মতে একোনাইট নির্বাচিত করিতে হইলে সর্বোপরি উহার মানসিক লক্ষণ গুলির অর্থাৎ শরীর ও মনের যাতনা, অস্থিরতা, ও অসহ্য অশান্তির সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক"।

অত্যন্ত সামান্য অসুখেও উৎকণ্ঠা, যাতনা, ও ভয়ের বিদ্যমানতা।

রোগিণীর গীত-বাদ্য সহ হয় না, উহাতে তাহাকে বিমর্ষ করে (তুল — ঋতুকালে, ন্যাট-কা)।

হেলান দেওয়া অবস্থা হইতে উত্থান করিলে আরক্ত মুখমণ্ডল মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়, অথবা ভ্রান্তি ও শিরোঘূর্ণন জন্মে এবং রোগী পতিত হয়, পুনরায় উঠিতে ভয় পায়; উহার সহিত সচরাচর চক্ষে ঘাঁধার দেওয়া ও অচৈতন্য থাকে।

রক্ত-প্রধানা যুবতীদিগের রজোলোপ, ভয়প্রাপ্তির পর, রজোরোধ প্রভৃতিবেদনার্থে।

প্রদাহের রক্ত-সঞ্চয়ের অবস্থায়, প্রদাহের স্থান-নিবদ্ধতার (localization) পূর্বে ব্যাবহার্য্য জ্বর। শুষ্ক ও উত্তপ্ত গাত্র-ত্বক; বদন আরক্ত অথব একবার আরক্ত একবার পাণ্ডুবর্ণ অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করিবার জন্য জ্বালাকর পিপাসা; অত্যন্ত স্নায়বীয় অস্থিরতা, যাতনায় অবলুণ্ঠন (tossing about), সন্ধ্যার প্রাক্কালে ও নিদ্রা যাইবার সময় রোগীর অধীরতার উৎপত্তি।

টঙ্কার (কনভল্‌শন) —দন্তোদ্ভেদকালে; ভিন্ন ভিন্ন পেশীর উত্তাপ, উৎক্ষেপ (jerking) ও স্পন্দন (Stwitching); শিশুর অঙ্গুলীর পর্ব্ব (fist) চর্ব্বণ বিরক্তি প্রকাশ ও চিৎকার করে; গাত্রের উত্তপ্ততা ও শুষ্কতা; তীব্র জ্বর।

কাস, ক্রুপ।—শুষ্ক, স্বরভঙ্গসংযুক্ত শ্বাস-রোধকর কাস; উচ্চ, কর্কশ, ভেকের ডাকের ন্যায় কাস; কঠিন, ঝনঝন শব্দবিশিষ্ট, শীসের শব্দ সংযুক্ত কাস; প্রশ্বাসে উত্তাপ শব্দ (কষ্টকর নিশ্বাস স্পন্দ); শুষ্ক শীতল বাতাস অথবা বায়ু-প্রবাহে রোগের উৎপত্তি।

কেবল জ্বর দমন করিবার জন্য একোনাইট ব্যবহার করা কখনও উচিত নহে, এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য ঔষধের সহিত হঠাৎ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করাও বিধেয় নহে। যদি একোনাইট জ্ঞাপক রোগী হয় তবে অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই; একোনাইটেই রোগী আরোগ্য প্রাপ্ত হইবে।

একোনাইটসূচক উত্তেজক কারণ বিদ্যমান না থাকিলে টাইফয়েড জ্বরের প্রথমাবস্থায় এতদ্বারা সর্ব্বদাই অপকার দর্শে।

উপচয়।—সায়াহ্নে ও রাত্রিতে বেদনা অসহ্য হইয়া উঠে; উষ্ণ গৃহে; শয্যা হইতে উঠিবার সময়; রোগাক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, (হিপ, নক্স-ম); একোনাইটের লক্ষণ বৃদ্ধি পায়।

উপশম।—অনাবৃত বায়ুতে উপশম (এলম, ম্যাগ-কা, পলস, স্যাব)।

সম্বন্ধ।—(১) জ্বরে, শিরঃপীড়ায়, বেদনার অসহ্যতায় ক্যামর সহিত; অভিঘাতের ফলে আর্ণিকার সহিত; সকল রোগীর পক্ষেই সল্ফারের সহিত; অনুপূরক সম্বন্ধ (Complementary)। যে সকল স্থলে সল্ফার নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাতে কদাচিৎ একোনাইট উপযোগী হয়। (২) তরুণ অবস্থায় একোনাইট অস্থায়ী অবস্থায় সল্ফার উপযোগী, এবং তরুণ দৈহিক অবস্থায় একোনাইটের পূর্ব্বে ও পরে ব্যবহার্য্য। (৩) একোনাইটের অপব্যবহারে সল্ফার প্রতিষেধক

এক্টিয়া রেসিমোসা।

(Actæa Racemosa)

ধৃতিকোন্মাদ; রোগিণী মনে করে যেন সে উন্মাদগ্রস্ত হইতেছে (সিমি); আপনাকে আপনি উন্মত্ত করিতে চেষ্টা করে

স্নায়ু-শূল বিলোপের পর উন্মাদ।

যেন একটা ভারী, কাল মেঘ রোগিণীর সর্ব্ব শরীরের উপর স্থাপিত রহিয়াছে, এবং এরূপভাবে তাহার মস্তক আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে যে সকলি তাহার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল অনুভূত হয়।

আসনের তল হইতে যেন ইন্দুর দৌড়িয়া যাইতেছে এরূপ ভ্রান্তি (ক্যাল্কে-এসি, ইথু)।

অক্ষি-পুটের স্নায়ুশূল —অক্ষি-গোলকে (eye ball) অবিরাম বেদনা অথবা তীব্র, চিড়িকমারা; সঞ্চরমান বেদনা, শঙ্খদেশ (temple), মস্তক-শিখর, মস্তক পৃষ্ঠ, অক্ষি-গহ্বর পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ এবং সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে বৃদ্ধি ও শয়নে উপশম।

গর্ভাশয়ের অথবা ডিম্বাশয়ের প্রতিক্ষিপ্ত লক্ষণ (reflex symptoms) জনিত হৃৎপিণ্ডের উপদ্রব। সহসা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিরতি; শ্বাস-রোধের সম্ভাবনা; যৎসামান্য সঞ্চলনে হৃৎকম্প (ডিজি)।

ঋতু।—অনিয়মিত; অবসাদজনক (এলম, কক); চিত্ত-বিকারে, স্নায়ু-

লতায়, অথবা জ্বরঅগ্ন বিলম্বিত কিম্বা বিলুপ্ত ; এবং কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া অথবা উন্মাদ সংযুক্ত, ঋতু। ঋতুকালে মানসিক লক্ষণের বৃদ্ধি।

আক্ষেপ।—হিষ্টিরিয়া বা অপস্মার জনিত ; জরায়ুরোগের প্রতিক্ষিপ্ততা হইতে উৎপন্ন ; ও ঋতুকালে বিবর্দ্ধিত ; আক্ষেপ বামপার্শ্বে কোরিয়ার আতিশয্য।

বামদিকের স্তনের নিচে তীব্র বেদনা (অষ্ট)।

শরীরের নানাস্থানে ডিম্বাশয় অথবা গর্ভাশয়ের উপদাহের সহানুভূতিজনিত তীব্র কর্ত্তনবৎ, তড়িতের ন্যায় বেদনা ; জরায়ু প্রদেশে একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে তীরমারার ন্যায় বেদনা।

গর্ভ। বিবমিষা ; নিদ্রাহীনতা ; কৃত্রিম প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা। উদরের আড়াআড়ি তীব্র বেদনা তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব (স্রাব)

প্রসব-কাল।—প্রসবের প্রথমাবস্থায় কম্পন ; স্নায়বীয় উত্তেজনা জনিত উন্মাদ ; জরায়ুর-মুখের দৃঢ়তা ; উগ্র, আক্ষেপিক, আয়াসিত প্রসব-বেদনা, যৎ-সামান্য গোলমালে উহার বৃদ্ধি

কুচকীতে আতিশয্য বিশিষ্ট প্রসবান্তিক বেদনা।

লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে গর্ভের শেষ মাসে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে প্রসব-বেদনার স্বল্পতা জন্মে।

নর্ত্তন (dancing) ক্রীড়ন (Skating), অথবা অন্য প্রকারে পেশীর প্রবল সঞ্চালনে উহার অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ।

ঘাড়ের ও পিঠের পেশীতে বাতের বেদনা ; পেশী শক্ত থাকা ও আকুঞ্চিত অনুভূত হয় ; সেলাই করা, লেখা, অথবা পিয়ানো বাজানে বাহুর চালনা জন্য মেরুদণ্ডের অনুভবাধিক্য (এগারি, র‍্যাণ-বব)।

উদরের পেশীর বাত ; সূচী-বেধ, ও খালধরার মত বেদনা।

আমবাতিক রক্ত-শূল।

উপচয়। ঋতুকালে ; যতই অধিক পরিমাণে রক্তঃ নিঃসৃত হয়, ততই অধিক যাতনা বাড়ে।

সম্বন্ধ।— জরায়ু ও বাতের ব্যারামে কলো, ও পলসের সমগুণ ;— এগারি লিলি, সিপির সহিতও সমগুণ সম্বন্ধ।

এগেরিকাস মাস্কেরিয়াস।

(Agaricus Muscarius.)

লম্বা কেশ ; এবং ত্বক্ ও পেশীর শিথিলতা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

ক্ষীণ, মন্থর রক্ত-সঞ্চালন বিশিষ্ট বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী।

মদ্যপায়ীদিগের শিরঃপীড়া ; মদ্যপানের মন্দফল (শোথ, দদ্রু, ব্রণ).

প্রলাপ।—সুরাপান জ্বরে অবিরত অসংলগ্নোক্তি , শয্যা ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা।

শিরঃপীড়া। জ্বরে বা বেদনায় সহজে যাহাদের প্রলাপ জন্মে (বেল) ; যাহাদের কোরিয়া, স্পন্দন, বা মুখ-বিকৃতি আছে ; তাহাদের শিরঃপীড়া। পৃষ্ঠবংশের পীড়াজনিত শিরঃপীড়া।

অতিশয় কণ্ডূয়ন ও অসহ্যজ্বালাবিশিষ্ট শীত স্ফোট (চিলব্লেন); নীহার স্ফোট (Frostbite) ও শীত-ভোগের অন্যান্য ফল, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে।

জাগ্রৎ অবস্থায়, অনিচ্ছায় অঙ্গ সঞ্চালন ; নিদ্রাবস্থায় উহার বিরতি ; একএকটী পেশীর সামান্য সঞ্চালন ও উৎক্ষেপণ হইতে সমগ্র শরীরে নর্ত্তন লক্ষণাপন্ন কোরিয়া ; সমস্ত শরীরের স্পন্দন , মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন, মাইগেল)।

ত্বকে যেন বরফ স্পৃষ্ট অথবা বরফবৎ শীতল সূচী বিদ্ধ হইতেছে এরূপ অনুভব ; উত্তপ্ত সূচী-বিদ্ধবৎ অনুভব।

কর্ণ, নাসিকা, বদন, হস্ত পদ প্রভৃতি নানাস্থানের জ্বালা ও কণ্ডূয়নবিশিষ্ট আরক্ততা ; নানাস্থানের আরক্ততা, স্ফীততা, ও উত্তপ্ততা।

হাঁটিতে অনিশ্চিততা, পথে প্রতিপদে হোঁচটলাগে , দাঁড়াইলে পায়ের গুড়মুড়ায় আঘাতিত হওয়ার ন্যায় বেদনা করে।

পৃষ্ঠ-বংশে স্পর্শে অনুভবাধিক্য (থেরি) ; প্রাতে উহার আধিক্য।

বেদনা।—দিবাভাগে পরিশ্রমকালে ; উপবেশনকালে , কটিদেশে ও ত্রিকাস্থিপ্রদেশে (Sacral region) বেদনা।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা বশতঃ পৃষ্ঠবংশের উপদাহ।

অমিতাচার ইন্দ্রিয় সেবাজনিত স্নায়বীয় অবসাদন

উদ্ভেদ বিলোপজনিত অপস্মার (epilepsy) রোগ (সোরি, সম্ব)।

শরীরের প্রতি সঞ্চালনে, ও প্রতি আবর্ত্তনে (turn) পৃষ্ঠবংশে বেদনার উৎপত্তি। একএকটী কশেরুকায় (vertebra) স্পর্শ দ্বেষ।

শিশুগুরজন্মাদিগের স্কন্ধ, অসহ্যপ্রায় কুঞ্চনবৎ যন্ত্রণা (লিলিয়ম, মিউরেক্স, সিপিয়া)।

শীতল বায়ুতে অত্যন্ত অনুভবাধিক্য (ব্যাপ, কালীকা, সোরি)।

উপরের বামদিকে ও নীচের দক্ষিণদিকে, কোণাকোণি রোগের প্রকাশ, (এগ্না, ব্রোম, মেড, ফস, সল-এসি)।

উপচয়। — আহারান্তে ; রমণান্তে, শীতল বায়ুতে, মানসিক অভিনিবেশে ; ঝড়-বজ্রের পূর্ব্বে (ফস, সোরি) বৃদ্ধি

সম্বন্ধ। — মদাত্যয়ের প্রলাপে, একিয়া, ক্যাল, ক্যাল-ইও, হাইও, ল্যাক, নক্স, ওপি, ষ্ট্রামোর সহিত ; কোরিয়ায় সাই, টারেণ, জিঙ্কের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

এগ্নাস ক্যাষ্টাস।

(Agnus Castus)

লসিকা-প্রধান (লিম্ফেটিক) ধাতুর পক্ষে উপযোগী।

অন্য-মনস্কতা, অন্তর্দৃষ্টি শক্তির অভাব ; স্মরণ রাখিতে পারা যায় না, একটী বাক্য দুইবার না পড়িলে বুঝা যায় না (লাইকো, ফস-এসি, সিপি)।

ধ্বজ-ভঙ্গ ও নানা মেহ বিশিষ্ট পুরাতন রোগী ; অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা।

<u>অকাল বার্দ্ধক্য</u>।—বিষণ্ণতা, উদাসীনতা, চিত্তের অস্থিরতা, আপনাকে হেয় জ্ঞান ; যুবক-যুবতীদিগের ইন্দ্রিয়-শক্তির অপব্যবহার হইতে উহার উৎপত্তি ; শুক্রাশয় হইতে উদ্ভব।

সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, কোমলতা (flaccidity) ও শীতলতা। ইন্দ্রিয়-শক্তি বা ইন্দ্রিয়-লিপ্সার বিরতি (ক্যালাডি, সেলেন)।

পুনঃ পুনঃ রমণেচ্ছার অত্যাচারের পর ধ্বজভঙ্গ।

রমণেচ্ছার স্রাব-বিলোপের সহকারে

মস্তিষ্কের উত্তেজনা অথবা উপস্থের উত্থিতের অনুপস্থিতি সহকারে লালা মেহ।

মেহপ্রদর — স্বপ্নদোষ কিন্তু তাহা না হইয়া সংক্ষিপ্তকালে, অতিশয় শিথিলিত জননাঙ্গ হইতে অজ্ঞাতসারে উহা নিঃসৃত হয়।

স্তন্যদায়িনীদিগের দুগ্ধ-স্রাবের লাঘব বা বিলোপ (এগ্নাস, ল্যাক-ক্যান, ল্যাক-ডি); তৎসহকারে অনেক সময় অতিশয় বিমর্ষতা; রোগিণী বলে যে সে মরিয়া যাইবে।

হেরিং মৎস্য অথবা মৃগনাভির গন্ধের ন্যায় নাসিকার সম্মুখে কল্পিত গন্ধ।

এই ঔষধে বিচরণ জনিত অবদরণ (Excoriation) নিবারিত হয়।

সম্বন্ধ।—জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতায় অথবা ধ্বজভঙ্গে এগ্নাসের পরে ক্যালাডি ও সেলেন ভাল খাটে।

এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম্।

(Antimonium Crudum.)

বালক, যুবা ও স্থূলত্ব-প্রবণ অল্পবয়স্ক ব্যক্তি (ক্যাল্ক)

প্রাতঃকালীন অতিসারগ্রস্ত বৃদ্ধ, সহসা কোষ্ঠরোধের উৎপত্তি অথবা পর্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠরোধ; নাড়ীর দ্রুততা ও ক্ষুদ্রতা।

শীতলতায় অসুস্থতাবৃদ্ধি, সর্দ্দি লাগিবার পরে উহার আধিক্য।

শিশুর খুঁতখুঁতে ও খিটখিটে প্রকৃতি, অন্যের স্পর্শ বা দৃষ্টি সহ্য হয় না; কথা বলিতে বা শুনিতে বিরক্তি (এণ্ট-টা, আইওড, সিলি); একটু আদর করিলেই ক্রোধের উদ্রেক

ক্রন্দন সংযুক্ত অতিশয় বিষণ্ণভাব।

জীবনের বিরাগ।

আকৃতিতে অশ্রুস্রাবশীলভাব, সামান্য বিষয়ে রোদিলী স্বভাবিক হয় (পল্স); নীচ নিরাশা, অধমস্থ হইয়া আত্ম-হত্যা।

পদ্যে কথা বলিতে অথবা কবিতা-আবৃত্তি করিতে দুর্নিবার প্রবৃত্তি।

চন্দ্রালোকে আনন্দের ও উন্নত প্রেমের ভাব; হতাশ প্রেমের মন্দ ফল (ক্যাণ্থ ফস)।

নাসারন্ধ্র ও মুখের কোণ বিদারিত ও চিপিটিকাযুক্ত (crusty)।

শিরঃপীড়া।—নদীতে স্নান বশতঃ, সর্দ্দিলাগিয়া; মদিরাপানজন্য; অম্লদ্রব্য, বসাদ্রব্য, ও ফল আহার জন্য আমাশয়ের বিশৃঙ্খলা জন্মিয়া; এবং উদ্ভেদ-বিলোপ বশতঃ শিরঃপীড়া।

অতিরিক্ত আহার বশতঃ, আমাশয়ের রোগ; আমাশয়ের দুর্ব্বলতা, সহজে পরিপাক-ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি জিহ্বায়, গাঢ়, দুগ্ধবৎ শুভ্র-লেপ; মুখে পচা স্বাদ প্রবণতা (ক্যাল্কে-কার্ব্ব) অম্ল ও আচার খাইবার স্পৃহা।

আমাশয়াস্ত্রের রোগ —ফাট, লুচি প্রভৃতি আহারে; অম্ল বিশেষতঃ সির্কা; ও অম্ল বা মন্দ মদ্য সেবন জন্য; শীতল জলে স্নানাদ্রে; অতিরিক্ত উত্তাপ গ্রহণে; এবং উত্তপ্ত ঋতু বশতঃ; আমাশয়ের ও অন্ত্রের পীড়া।

ঊর্দ্ধ দিকে ও অধো দিকে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নিয়ত বায়ু-নিঃসরণ; ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধবিশিষ্ট উদ্গার।

কাসিতে কাসিতে, নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধ্র হইতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিঃসরণ; মলদ্বার হইতে রসানি ক্ষরণ, উহাতে কাপড়ে হরিদ্রা বর্ণের দাগ লাগে। আমস্রাবী অর্শ।

চর্ম্মে অস্বাভাবিক বির্দ্ধনাদির উৎপত্তির প্রবণতা; হাতের আঙ্গুলের নখ শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় না; দুইনখ আঁচিলের ন্যায় ফাটা ফাটা আকারে ও শৃঙ্গবৎ স্তূপে স্তূপে স্থান সহকারে পুনরুৎপন্ন হয়।

পদতলে কাঁটা বা শাল-ঘড়া; হাঁটিবার, বিশেষতঃ পাথরের উপর হাঁটিবার, সময় উহাতে অতিশয় যাতনা জন্মে।

অতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়াতে স্বর-লোপ।

সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য হয় না; রৌদ্রে পরিশ্রম করিলে অসুখ করে (ল্যাক, অ্যান্টিমিডি); অন্য রোগে অতিরিক্ত উত্তাপ হওয়াতে গ্রীষ্ম প্রাপ্তি; উষ্ণকালে অবসাদ; প্রাতঃকালে পদতলে পীড়া।

স্বপ্নদোষ।—সূর্য্যোত্তাপে অথবা উষ্ণ জলে নিবারিত; শীতল জলে প্রক্ষালন করিলে উপশম হয়।

শীতলজলে স্নানে অপ্রবৃত্তি; শীতল জলে প্রক্ষালনে অথবা স্নানে শিশুর ক্রন্দন, শীতলজলে স্নানে বা জলে শিরোবেদনার উৎপত্তি, ঋতুর বিলুপ্তি; গণ্ডস্থলে ও হস্তে পদতলে গাঁট (ব্রাউন)।

উপচয়।— আহারান্তে, শীতলজলে স্নানে; অম্লদ্রব্য বা অম্ল মদিরা সেবনে; সূর্য্যের বা অগ্নির উত্তাপ ভোগান্তে; এবং অতিশয় উত্তাপ বা শীতলতা লাগিয়া; বৃদ্ধি।

উপশম।— অনাবৃত বায়ুতে; বিশ্রামকালে; উষ্ণজলে স্নানান্তে; উপশম।

সম্বন্ধ। (১) স্কুইলার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) আমাশয়িক রোগে আর্স, ইপি, পাল্স, পডোর সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (৩) পালস, মার্ক, সলফের পরে এন্ট-ক্রুড ভাল খাটে।

এন্টিমোনিয়ম টার্টারিকম।

(Antimonium Tartaricum)

বিশেষতঃ, শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতুর ব্যক্তি, ও রস-প্রধান ধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

সেঁতসেঁতে স্থানে থাকার দরুণ উৎপন্ন রোগ। (আর্স, আরান, টেরে)।

এই ঔষধে নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া শ্বাসক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালন-ক্রিয়ার অবসাদ জন্মে এবং তাহাতেই ইহার প্রয়োগের প্রধান পরিচালক লক্ষণের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ যখন রোগী কাসে, তখন বায়ু-নলীতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা-সঞ্চয় বুঝা যায়, বোধ হয় যেন কাসিলে অধিক শ্লেষ্মা উঠিবে, কিন্তু কিছুই উঠে না।

যাহারা নিকটে থাকে শিশু তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরে; কোলে চড়িয়া বেড়াইতে চায়; কেহ ছুঁইলে কাঁদে, নাড়ী দেখিতে দেয় না (এণ্টি-ক্রুড, স্যানি)।

মুখমণ্ডলের শীতলতা, নীলাক্তভা, পাণ্ডুরতা, ও শীতল ঘর্ম্মাচ্ছন্নতা (ট্যাবে)।

গাঢ়, শুভ্র, লেইবৎ (pasty) পদার্থে জিহ্বার আচ্ছন্নতা, জিহ্বা-কণ্টক ও জিহ্বাপ্রান্তের আরক্ততা; লাল লাল রেখা; জিহ্বা বড় লাল, মধ্যভাগে শুভ্র; এপেল ফল খাওয়ার অসাধারণ আকাঙ্ক্ষা (এলো—অম্ল ও আচার খাওয়ার স্পৃহা, এণ্টি-ক্রুড)

বমন।—যেভাবে থাকা যায় সেই ভাবেই বমন হয়, কেবল দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে বমন হয় না; বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি; বমনের পরে তন্দ্রালুতা ও অবসন্নতা; শীতল ঘর্ম্ম ও অতিসার সহকারে ওলাউঠার বমন, প্রত্যেকবার বমনের পরে এক এক মাত্রা সেব্য (ভিরে)

শ্বাসরোধ (এসফিক্সিয়া)—জলমজ্জন; বায়ু-নলীতে (bronchi) শ্লেষ্মার সঞ্চয়; ফুসফুসের পক্ষাঘাত-সম্ভাবনা, জলমগ্ন অথবা কণ্ঠনালিতে বৈদেশিকবস্তু (foreign bodies); আধিভৌতিক (impending) কারণে তন্দ্রালুতা ও অচৈতন্য সহকারে, মৃত্যুমান মৃত্যু (এপোপ্লেক্টিক ডেথ)

সকল রোগের সহিতই অতিশয় নিদ্রালুতা অথবা নিদ্রা যাইবার দুর্নিবার প্রবৃত্তি (নাক্স-ম, ওপি)

জন্মিবামাত্র শিশুর পাণ্ডুরতা, শ্বাস-শূন্যতা, খাবি-খাওয়া; শিশুর শ্বাস-রুদ্ধ (এসফিক্সিয়া)। এই ঔষধে মৃত্যু-সময়ের 'গলা ঘড়ঘড়ি' উপশান্তি হয় (টারাণ)।

ফুসফুস প্রদাহ, বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুসফুসের প্রদাহ সংশ্লিষ্ট পাণ্ডু-রোগ (Jaundice)।

উপচয়।—আর্দ্র, শীতল সময়ে রাত্রিতে শয়নে; গৃহের উষ্ণতায়; বসন্তকালে ঋতু-পরিবর্তনে, বৃদ্ধি।

উপশম।—শীতল অনাবৃত বায়ুতে; সোজা হইয়া বসিলে, কাশ-নিষ্ঠীবনে; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে; উপশম।

সম্বন্ধ।—(১) এণ্টি টার্ট লাইকোপোডিয়মের সহিত সমগুণ; কিন্তু লাইকোপোডিয়মের নাসা-পার্শ্বের তান্দোলিক সঞ্চালনের পরিবর্ত্তে এণ্টি টার্টে নাসারন্ধ্রের প্রসারণ লক্ষিত হয়; ভিরেট্রমেরও সমগুণ, উভয় ঔষধেই অতিসার, উদর বেদনা, বমন, শরীরের শীতলতা ও অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ আছে; ইপিকাকেরও সমগুণ, কিন্তু এণ্টি-টার্টে শ্বাসক্রিয়ার ত্রুটী বশতঃ অধিকতর নিদ্রালুতা; এবং বমনান্তে বিবমিষার উপশম জন্মে (২) যখন ফুসফুসের, ক্রিয়ালোপ হইয়া আসিতেছে বোধ হয়, রোগী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, কাসের হ্রাস বা নিবৃত্তি জন্মে; তখন ইপিকাকের স্থলে এণ্টি-টার্ট ব্যবহৃত হয়। (৩) গো-বীজে টীকাদানের মন্দফলে থুজা বিফল হইলে এবং সিপিয়া ব্যবহৃত না হইলে, এণ্টি-টার্ট প্রযোজিত হয়। (৪) শ্বাসযন্ত্রে বা কণ্ঠনালীতে বৈদেশিক (foreign bodies) অবস্থিতি বশতঃ শ্বাস-কৃচ্ছ্রে (dyspnœa) সিলিশিয়ার পূর্ব্বে; প্রমেহের স্রাব-লোপে পলসেটিলার পূর্ব্বে; সেঁতসেঁতে ভিত্তির দোষে রোগ জন্মিলে টেরেবিন্থের পূর্ব্বে; এণ্টি-টার্ট ব্যবহৃত হয় (৫) বালকদিগের কাসে এণ্টি-টার্ট উপযোগী বোধ হইলেও তদ্দ্বারা সংশোধন ফল না দর্শিলে, হিপার আবশ্যক হয়। (৬) বসন্ত ও শরৎকালে আর্দ্র সময়ের আরম্ভে শিশুদিগের কাস বৃদ্ধি পাইলে এণ্টি-টার্ট প্রযোজিত হয়।

এনাকার্ডিয়ম ওরিয়েণ্টেল।

(Anacardium Orientale)

<u>সহসা স্মৃতি-বিলোপ</u>; সকলই স্বপ্নদৃষ্টবৎ বোধ হয়; রোগী স্বকীয় বিস্মৃতি বশতঃ অতিশয় বিরক্ত হয়; সে অপ্রতিভ হইয়া পড়ে কার্য্য-কর্ম্মের উপযুক্ততা থাকে না।

অসূয়াপরবশতা (malicious), দুষ্কর্ম্মে আসক্তিশীলতা।

অভিসম্পাত ও শপথ করিবার দুর্নিবার প্রবৃত্তি। (ন্যাক্স ক্যাম, লিলি, নাই-এসি)। অবিরত প্রার্থনা করিবার প্রবৃত্তি, (ষ্ট্রাম)।

আপনার ও অন্যের প্রতি নির্ভরের অভাব।

রোগীর বোধ হয় যেন তাহার দুই ইচ্ছাশক্তি আছে এক ইচ্ছা যাহা করিতে আদেশ করে অন্য ইচ্ছা তাহাই করিতে নিষেধ করে

হাঁটিবার সময় পাছে পাছে যেন কেহ আসিতেছে এরূপ উৎকণ্ঠা; চারি-দিকের প্রত্যেক বস্তুতেই সন্দেহ জন্মে

সকল ইন্দ্রিয়েরই দুর্ব্বলতা।

অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধতা সহকারে অবসাদ-বহুল ভাব

অদ্ভুত স্বভাব, গুরুতর বিষয়ে হাস্য-পরিহাস করা ও হাস্যোদ্দীপক বিষয়ে গাম্ভীর্য্য ধারণ

শরীরের কোন অংশের চারিদিকে যেন লোহার পত্র (hoop.) অথবা ফিতা বাঁধা রহিয়াছে (ক্যাক্টি কার্ব্ব এস, সল্ফ); অথবা কোন ভোঁতা অস্ত্র চাপিত হইতেছে; কিংবা অভ্যন্তরাংশে গোঁজ বিদ্ধ হইতেছে; এপ্রকার অনুভব।

আহার করিবার সময় সম্যকরূপে উপশমিত (সাব্রি). রাত্রিতে শয্যায় শয়নে, ও ঘুম পাইবার সময় হ্রাস প্রাপ্ত; এবং নড়িলে চড়িলে ও কার্য্যকালে বিবর্দ্ধিত; শিরঃপীড়া।

অব্যায়ামীদিগের আমাশয়িক ও স্নায়বিক শিরঃপীড়া (আর্জ্জ-না, ব্রাই, নক্স)

আহার ও পান করিবার সময় গলায় বাঁধন (ক্যান-সা, কাণ্ডা-কাভা, নাই-এসি)।

আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ; আহার-কালে রোগের লক্ষণ অন্তর্হিত হয় (কালী-ফ, সোরি)।

আমাশয়। আমাশয় শূন্য থাকিলেই কেবল 'পেটে কিন কিছু নাই' এরূপ উপবাসবৎ অনুভব এবং আহারে উহার উপশম; (চেলি, আইওড); পরিপাক-ক্রিয়ার সময় উপশম (ব্রাই, ও নক্সের বিপরীত)

হাতের তালুতে আঁচিল

মল-ত্যাগের অতিশয় ইচ্ছা, কিন্তু মল-ত্যাগের চেষ্টা করিলে মল পরিত্যক্ত হয়না ও সে ইচ্ছা আর থাকেনা; সরলান্ত্র শক্তিশূন্য, পক্ষাঘাতিত, ও ছিপিবদ্ধবৎ অনুভূত হয় (সরলান্ত্রের অতি ক্রিয়া বা অনিয়মিত যন্ত্রক্রিয়া (peristaltic notion) (নক্স)

সম্বন্ধ। (১) রস-রেড, রসটক্স, ও রস-ভেনের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) দক্ষিণ হইতে বামদিকে লক্ষণের গতি-প্রবণতা (ল্যাক)। (৩) আর্নিকা ও পালসের পরে এনাকার্ডি ভাল খাটে (৪) এনাকার্ডিয়মের পরে ও পূর্বে ল্যাকেসিস ভাল খাটে।

এন্থ্রাসাইনম্।

(Authracinum)

কার্বাঙ্কল, দূষিত ঘা এবং ক্ষত, পচনশীল ও অসহ্য জ্বালাসংযুক্ত রোগ।

যখন আর্সেনিক বা অন্য কোন সুনির্বাচিত ঔষধে কার্বাঙ্কল কিংবা দূষিত ক্ষতের জ্বালাকর বেদনার নিবারণ হয় না, তখন ব্যবহার্য।

রক্ত-স্রাব; মুখ বিবর, নাসিকা, মলদ্বার বা মূত্র-দ্বার হইতে রক্ত-ক্ষরণ; কাল, গাঢ়, আলকাতরার মত, শীঘ্র শীঘ্র বিশ্লিষ্ট (decomposing) (ক্রোট) রক্ত।

সেপ্টিক জ্বর, খুব শীঘ্র শীঘ্র নাড়ীর নিস্তেজতা, প্রলাপ ও মূর্চ্ছা (পাইরো)।

গ্যাংগ্রীন সংযুক্ত ক্ষত; দূষিত প্রকৃতির আঙ্গুল-হাড়া (Felon), কার্বাঙ্কল, ইরিসিপেলাস

দূষিত আঙ্গুল-হাড়া; পচনশীল ও ভয়ানক জ্বালাকর বেদনা (আর্স, কার্বো-ভেজি, ল্যাক)।

সাংঘাতিক দূষিত ঘা; কৃষ্ণ বা নীল বর্ণ ফোস্কা, চব্বিশ বা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু

কার্বাঙ্কল; ভয়ঙ্কর জ্বালাকর বেদনা; রসানির্গম আর দূষিত (offensive) পূঁয নিঃসরণ।

শবচ্ছেদ-ব্যবচ্ছেদ জনিত ক্ষত, বিশেষতঃ উহার গ্যাংগ্রীণ জন্মিবার অভিমুখতা; দূষিত পূঁয [illegible] (সেপ্টিক জ্বর), সুস্পষ্ট অবসন্নতা (আর্স, পাইরো)।

সন্নিদ্ধ কীটের দংশনে ক্ষতস্থানের বর্ণের পরিবর্তন, এবং আঘাত-স্থল হইতে লসিকাবাহী নাড়ীর (lymphatics) গতি-পথে লাল লাল রেখার উৎপত্তি (ল্যাক. পাইরো)

পূয বা অন্য কোন দূষিত পদার্থ রক্তে শোষিত হইয়া জ্বালাযুক্ত বেদনা ও অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন প্রদাহ (আর্স, পাইরো)।

গো, মেষ, ও অশ্বের বহুব্যাপক প্লীহা রোগ

পচাজ্বরের বা মৃত-দেহ-ব্যবচ্ছেদগৃহের দুর্গন্ধ আঘ্রাণের সংস্পর্শ, দুর্গন্ধ নিশ্বাসনে বিষাক্ততা (পাইরো)

হেরিং বলেন কার্বাঙ্কলকে শস্ত্র-চিকিৎসার রোগ বলা ঠিক নহে। উহা কাটিয়া দেওয়ায় প্রায়ই অপকার হয় কার্বাঙ্কল কেবল আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগেই আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, প্রকৃত চিকিৎসায় একটী রোগীও নষ্ট হয় না।

সম্বন্ধ।—(১) পূয-দূষিত অবস্থায় আর্স, কার্ব-এসি, ল্যাক, সিকেলি, পাইরোজ সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) ক্যান্সার, কার্বাঙ্কল অথবা এরিসিপেলাসের ভয়ানক বেদনায় যখন আর্স বা এন্থ্রা দ্বারা উপশম জন্মে না তখন ইউফরবিয়মের সহিত এই ঔষধ তুলনা করিয়া দেখা যায়।

এপিস মেলিফিকা।

(Apis Mellifica)

গণ্ডমালা-ধাতু ; বিবর্দ্ধিত, দৃঢ়ীভূত গ্রন্থি ; কঠিন ক্যানসার অথবা বিযুক্ত ক্যানসারে এপিস উপযোগী

নারী, বিশেষতঃ বিধবা নারী ; এবং যে সকল বালক-বালিকারা সাধারণতঃ সাবধান থাকিলেও হাত হইতে দ্রব্যাদি ফেলিয়া দেয় (বোভ) তাহাদের পক্ষে এপিস উপযোগী।

অসম্পূর্ণরূপে বিকশিত অথবা বিলুপ্ত তরুণ উদ্ভেদের মন্দ ফল (জিঙ্ক) ; রোমান্তিকা (হাম), আরক্তিকা (স্কার্লেটিনা), শীতপিত্ত (আর্টিকেরিয়া)।

বিদ্বেষ, ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি, ও অশুভ সংবাদের মন্দ ফল ।

কোপনতা; স্নায়বীয়তা (nervous); অস্থিরতা; সহজে সন্তুষ্ট না হওয়া।

অশ্রুপাত-প্রবণতা; না কাঁদিয়া থাকিতে পারা যায় না; সাহসহীনতা আশাশূন্যতা (পলস)।

জাগ্রত বা নিদ্রিত কালে শিশুদিগের আকস্মিক, তীব্র চীৎকার (হেলি)।

শোথ।—চক্ষুর নিম্নভাগে, থলীর ন্যায় স্ফীততা (ঊর্দ্ধভাগে, কালী-কা); হাত-পায়ের জলপূর্ণ স্ফীততা; পিপাসাশূন্য শোথ (পিপাসাসংযুক্ত শোথ, এসে-এসি, এপোসা)।

স্পর্শে অত্যন্ত অনুভূতি (বেল ল্যাক)।

বেদনা—জ্বালাকর, হুল-বেঁধাবৎ, টাটানি বেদনা; সহসা বেদনার একস্থান হইতে স্থানান্তরে গতি (কালী-বাই ল্যাক-ক্যান পলস)

পিপাসাহীনতা,—শোথে, ও জ্বরীতে পিপাসাশূন্যতা (বদনের অধিকতর মোমাকৃতি ও অতিশয় পিপাসা, এসে-এসি)।

জননাঙ্গের অতিশয় উপদাহ সহকারে অবারিত মূত্র; এক মুহূর্ত্তও মূত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় না এবং ত্যাগ করিলে মূত্র পথে দারুণ জ্বালা করে; পুনঃপুনঃ, যন্ত্রণাযুক্ত, স্বল্প, রক্তাক্ত মূত্র নিঃসরণ।

কোষ্ঠরোধ।—কোষ্ঠ রোধে মল-ত্যাগের অধিক চেষ্টা করিলে যেন আঁটা কিছু ছিঁড়িয়া যাইবে এরূপ অনুভব।

অতিসার।—মদ্যপায়ীদিগের অতিসার; উদ্ভেদ-বিশিষ্ট রোগে, বিশেষতঃ উদ্ভেদ বসিয়া গেলে, অতিসার; নড়িলে চড়িলে অনিচ্ছায় মল নিঃসরণ, বোধহয় যেন মল-দ্বার বিস্তৃতরূপে উন্মুক্ত রহিয়াছে (ফস)।

দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়; দক্ষিণদিকের ডিম্বাশয়ের বিবর্দ্ধন বা শোথ; দক্ষিণ অণ্ডকোষের শোথ।

সবিরাম জ্বর; সর্ব্বদা অপরাহ্ণে তিনটার সময়, পিপাসাসহ, শীত (ইথে); উষ্ণগৃহে ও বাহ্যোত্তাপে শীতের বৃদ্ধি (পূর্ব্বাহ্ণে ৩টা অপরাহ্ণে ৩টার সময় শীত, থুজা)।

উপচয়।—নিদ্রা পরে (ল্যাক); উষ্ণ ও উত্তপ্ত গৃহে; ভিজিলে (রসটক্স), বৃদ্ধি; কিন্তু আক্রান্ত স্থান শীতল জলে ধুইলে বা শীতল জলে স্নানে; কাশিলে,

হাঁটিলে অথবা অবস্থান-পরিবর্ত্তনে (বেদনার), ও সোজা হইয়া বসিলে ; উপশম।

সম্বন্ধ। — (১) ন্যাট-মিউর সহিত এপিসের অনুপূরক সম্বন্ধ (২) রস-টক্সের পূর্ব্বে বা পরে এপিস ব্যবহৃত হয়না। (৩) এপিসের পরে আর্স ■ পলস ভাল খাটে। (৪) স্কার্লেটিনার এলবুমিনুরিয়ায়, ক্যান্থ, ডিজি, হেলি অকৃতকার্য্য হইবার পরে এপিসে আরোগ্য জন্মে।

এপোসাইনম ক্যানেবিনম।

(Apocynum Cannabinum)

নিঃস্রব, বিশেষতঃ মূত্র ও ঘর্ম্মের হ্রাস প্রাপ্তি।

মস্তস্রাব' ঝিল্লীর (Serous membranes) তরুণ, প্রদাহিক শোথ।

শোথ। — পিপাসাসহ শোথ (এসে-এসি), জল সহ্য হয়না অথবা বমন হইয়া পড়ে (আর্স); বিধান-বিকার জনিত রোগের সহিত অসংসৃষ্ট অধিকাংশ শোথ; টাইফস, টাইফয়েড, ও স্কার্লেটিনা জ্বরের পরবর্ত্তী, এবং সিরোসিস রোগের পরবর্ত্তী শোথ; কুইনাইন অপব্যবহারের পরবর্ত্তী শোথ।

সেবনী-সন্ধির (Sutures) বিযুক্ততা সংযুক্ত তরুণ হাইড্রোকেফেলাস রোগ। স্থূপ্তি, এক চক্ষুর দৃষ্টিশূন্যতা; একবাহু ও এক অঙ্গের অবিরত ঐচ্ছিক সঞ্চালন (বাম বাহু ■ বাম অঙ্গ ব্রাই); কপালের বহিরাগতি।

উদর ও হস্ত-পদের শোথ জনিত স্ফীততা সহকারে স্ত্রীলোকদিগের ঋতুহীনতা।

রক্তসাধিক্য। — ক্রমাগত বা থাকিয়া থাকিয়া রক্ত-প্রবাহ; তরল বা সংযত রক্ত; বিবমিষা, বমন, হৃৎকম্প; নড়িলে চড়িলে নাড়ীর ক্রতত্তা, ও ক্ষীণতা; জীবনী-শক্তির অবসন্নতা, বালিশ হইতে মাথা তুলিলে মূর্চ্ছা।

গর্ভাবস্থায় হ্রস্ব ও শুষ্ক, অথবা গভীর ও তরল কাস (কোনা)।

সম্বন্ধ — শোথে, এসে-এসি, এপিস, আর্স, সিক, ডিজির সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

এব্রোটেনম্।

(Abrotanum)

পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও অতিসার ; অজীর্ণদ্রব্যপূর্ণ অতিসার।

অতিশয় শীর্ণতা, বিশেষতঃ অঙ্গাধারের শীর্ণতা (আইয়োড, স্যানি, টিউব) সহকারে বালকদিগের ক্ষয়-রোগ (ম্যারাসমাস) ; চর্ম্মের লোলিতত্ত্ব, শিথিলভাবে বলীতে বলীতে ঝুলিয়া থাকা।

ক্ষয়-রোগে মস্তকের দুর্ব্বলতা, উহা সোজা করিয়া রাখিতে পারা যায়না

কেবল নিম্ন শাখাদ্বয়ের ক্ষয় প্রাপ্তি।

অতিশয় ক্ষুধা ; অথচ পর্য্যাপ্ত আহারেও শরীরের শীর্ণতা প্রাপ্তি, (আইও, ন্যাট-মিউ, স্যানি, টিউব)।

খল্লী (Cramps) বা তৎপরবর্ত্তী উদর বেদনা হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেদনা-বিশিষ্ট আকুঞ্চন (Contractions)।

বাত।—স্ফীততার আরম্ভের পূর্ব্বে অত্যন্ত বেদনা ও অঙ্গ বাধকের , অতিসার অথবা অস্বাভাবিক নিঃস্রাবের সহসা অবরোধজনিত ; এবং অর্শের সহিত, ও রক্তাতিসারের সহিত পর্য্যায় ক্রমে উপস্থিত ; বাত।

গাউট।—সন্ধি-স্থলের স্ফীততা, স্তব্ধতা (Stiffness), তৎসহ কণ্টক-বেধবৎ যন্ত্রণানুভব ; মণিবন্ধ (wrist) ও গুল্ফ সন্ধির (ankle joints) বেদনা ও প্রদাহ।

সর্ব্বশরীরের অতিশয় পঙ্গুতা (lameness) ও স্পর্শ-দ্বেষ।

কণ্ডূয়নশীল নীহার-স্ফোট (chilblains) (এগার)

শিশুদিগের অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা এবং একপ্রকার হেক্টিক জ্বর ; দাঁড়াইতে অসমর্থতা।

শিশুর মন্দ-প্রকৃতি, কোপনতা, বিষণ্ণ-চিত্ততা ও নিরাশতা ; প্রচণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা ও নির্দ্দয় কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি।

পাণ্ডুর, কুঞ্চিত, বৃদ্ধবৎ মুখমণ্ডল (ওপি)।

সম্বন্ধ। স্ফোটকে হিপারের পরে ; প্লুরিসি রোগে একোনাইট ও ব্রাইওনিয়ার পরে, আক্রান্ত পার্শ্বে শ্বাসের প্রতিবন্ধকতাজনক প্রচাপনবৎ অনুভবের বিদ্যমানতায় ; উপযোগী

এমিলিনঃম নাইট্রোসঃম।

(Amylenum Nitrosum.)

স্বাভাবিক রজোনিবৃত্তিকালে বা তৎপরে স্নায়বীয়, রক্তপ্রধান স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী

এতদ্বারা ধমনিসকল প্রসারিত ও উহাদের গতি বিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু পরে নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও মন্দগতি জন্মে।

মুখমণ্ডলে ও মস্তকে রক্তের তীব্র গতি (বেল, গ্লন)।

অত্যন্ত শীতল সময়েও অনাবৃত বায়ু সেবনের আকাঙ্ক্ষা ; গাত্র বস্ত্র-বিমোচন ও জানালা খুলিয়া দেওয়া (আর্জ্জ-না, ল্যাক, গল)।

যে সকল রোগ আরোগ্য হয়না তাহাতে অনেক সময় এমিল দ্বারা উপশম জন্মে ; মৃত্যু-যন্ত্রণা নিবারণে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ।

মুখ-রাগ (ফ্লাশিং)। মুখমণ্ডল, আমাশয়, ও শরীরের নানাস্থান হইতে উহার আরম্ভ তৎপরে ঘর্ম্মের উৎপত্তি, অনেক সময় ঘর্ম্মের উষ্ণতা ও প্রচুরতা ; সহসা উহার সীমাবদ্ধতা (abruptly limited) নিমাংশের তুষারবৎ শীতলতা, তৎপরে অতিশয় অবসন্নতা।

যৎসামান্য মনোভাবে মুখ-রাগের উৎপত্তি (কোকা, ফস)

ব্লাশিং (লজ্জাদি কারণে গালের আরক্ততা)।—পুরাতন বা তরুণ সামুদ্রিক বিবমিষা।

অর্দ্ধ-শিরোবেদনা, বিশেষতঃ আক্রান্ত পার্শ্বের পাণ্ডুবর্ণ থাকিলে।

গলা-বন্ধ অতিরিক্ত কষা বোধ হয় ঢিলা করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়।

হৃদ্‌শূল, হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ার গণ্ডগোল ; হৃদ্‌পিণ্ড ও গ্রীবার বৃহৎ ধমনীদ্বয়ের (carotids) তীব্র দপদপ (গ্লন)।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাতিনিয়ত অঙ্গ-প্রসারণ, এ ইচ্ছার পরিতৃপ্তি জন্মেনা ; খাট ধরিয়া ও অন্যের সহায়তা লইয়া অঙ্গ-প্রসারণ (আড়ামোড়াভাঙ্গা)

পুনঃপুনঃ গভীর জৃম্ভণ (হাইতোলা) (কালী-কা)

প্রসবের অব্যবহিত পরেই সূতিকাক্ষেপ (puerperal convulsions)।

উপচয়।—মানসিক বা শারীরিক শ্রমে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—(১) বেল ব্যতীত কোকা, চিন, গন প্রভৃতির সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) আমাদের দেশে যাহারা এদেশে, স্পর্শ-জ্ঞান-বিলোপকারী পদার্থের ক্রিয়ায় মৃতবৎ ব্যক্তিদিগের পুনর্জীবনের সহায় হয়। (৩) গাত্রে ঔষধ প্রধানতঃ সাময়িক; রোগ স্থায়ে অল্প ক্রিয়া করে। পুনঃ প্রয়োগ আবশ্যক। উত্তরোত্তর উচ্চতর ক্রমে ইহা আরোগ্যকর। (৪) রোগের শক্তির উপরেই অধিকাংশ সময় আরোগ্য নির্ভর করে।

এমোনিয়ম কার্ব্বনিকম্।

(Ammonium Carbonicum.)

শারীরিক প্রকৃতির রক্তস্রাব-প্রবণতা, রক্তের তরলতা ও লোহিত-কণার অপকৃষ্টতা (Degeneration); রক্তের গ্যাংগ্রীণে পরিণত হইবার সম্ভাবনা।

শারীরিক পরিশ্রমের অভাব বশতঃ স্থূলকায়দিগের নানাপ্রকার অসুখে; সর্ব্বদা "স্মেলিং বোতল" (এমোনিয়ার শিশি) কাছে রাখিতে হয় এরূপ সুকুমারীদিগের পক্ষে; এবং যাহাদের শীতকালে সহজে সর্দ্দি লাগে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

শিশুরা মুখ ধৌত করা, ভালবাসে না।

নিদ্রাকালে হইবার সময় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আইসে, শ্বাস প্রাপ্তির জন্য জাগিতে হয় (ডিজি, ল্যাক)।

আর্দ্র-কালে, ঋতু স্রাবের সময় বদ-মেজাজ।

শিরঃপীড়া; পূর্ণতানুভব, বোধ হয় যেন কপাল ফাটিয়া যাইবে (বেল, গ্লন)।

নাসিকার রক্তপাত।—প্রাতে হাত ও মুখমণ্ডল প্রক্ষালনের সময় (আর্ণ, ম্যাগ-কা), বাম নাসা-রন্ধ্র হইতে রক্তপাত; আহারান্তে রক্তপাত।

ওজিনা, বারম্বার নাসিকা হইতে রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, অবশীর্ষ (উপুড়, অবনত মস্তক) হইলে নাসাতে রক্তের প্রধাবন।

প্রায়শঃ রাত্রিতে নাসাবরোধ ; মুখদিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিতে হয় ; দীর্ঘকালস্থায়ী সর্দ্দি ; শিশুদিগের নাসারোধক সর্দ্দি (হিপ, নক্স, স্যাম্বু, ষ্টিক্ট)।

পচা গল ক্ষত ; তালুমূলের পচা ক্ষত জন্মিবার উপক্রম ; অস্থির রক্তপূর্ণতা।

ডিপথিরিয়া বা স্কার্লেটিনায় নাসিকার অবরুদ্ধতা ; শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আইসে বলিয়া শিশু ঘুমাইতে পারেনা।

ঋতুর আরম্ভে ওলাউঠার ন্যায় লক্ষণ (বোভি, ভিরেট্র)।

ঋতু।—অতি শীঘ্র শীঘ্র, প্রভূত রজঃস্রাব, রজঃনিঃসরণের পূর্ব্বে উদরবেদনা ; বিদাহী রজ-রক্ত, উহা লাগিয়া উরুতে ক্ষত জন্মে, রাত্রিতে ও বসিয়া থাকিলে অধিক পরিমাণে রজস্রাব (জিঙ্ক) ; ঋতু কালে দন্ত বেদনা, পেট বেদনা ও বিষণ্ণতা ; শ্রান্তি, বিশেষতঃ উরুদ্বয়ের শ্রান্তি জৃম্ভণ (হাইতোলা) ও শীত।

প্রদর —জরায়ু হইতে জলবৎ জ্বালাকর স্রাব, যোনি হইতে বিদাহী প্রভূত স্রাব, ভগের অবদরণ (oxcori ition)

হৃৎকম্প সহকারে শ্বাস-কৃচ্ছ্র, শারীরিক পরিশ্রমে অথবা কতিপয় সিঁড়ি বাহিয়া উঠিলে উহার আতিশয্য উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি

এম্ফিসিমার (কোষময় বিধানে বায়ু প্রবেশ, বায়ু কর্ত্তৃক স্ফীততা) অন্যতম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রত্যহ প্রাতে পূর্ব্বাহ্ণে ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত (কালি-কা,) ধূলিজনিত কণ্ডূয়নের ন্যায় গলা কণ্ডূয়িত হইয়া শুষ্ক কাস

নখ-মূলের প্রদাহ ; অস্থি-বেষ্টের গভীর-মূল বেদনা (ডাইওস, সিলি)।

স্কার্লেটিনার ন্যায় শরীরের আরক্ততা (এইলান্থের সহিত তুলনা করুন)।

গভীর নিদ্রা সংযুক্ত সাংঘাতিক স্কার্লেটিনা ; সশব্দ শ্বাস ; জীবনীশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ উদ্ভেদ গুলির অল্প অল্প প্রকাশ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত সম্ভাবনা (টিউব, জিঙ্ক)।

উপচয়।—শীতল, আর্দ্রকালে ; আর্দ্র পোল্টিশে, প্রক্ষালনে (washing) ও ঋতুকালে ; বৃদ্ধি।

উপশম।—উদরের উপর ভরদিয়া উপুড় হইয়া শয়নে (এসে-এসি) ; ব্যথিত পার্শ্বে ভর দিয়া শয়নে (পালস) ; ও শুষ্ককালে ; উপশম

সম্বন্ধ।—(১) মশকের বিষ-ক্রিয়া এবং কীটের হুল-বেধ-যাতনা এই ঔষধে নিবারিত হয়। (২) দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রমিত হয়। (৩) ক্যাকেসিসের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ।

এমোনিয়ম মিউরিয়েটীকম।

(Ammonium Muriaticum)

স্থূলকায় অলস অথবা শরীর স্থূল, জঙ্ঘা ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বিশেষ উপযোগী।

জলবৎ বিদাহী-প্রতিশ্যায় (acrid coryza), স্রাবসংস্পর্শে ওষ্ঠের ক্ষত (এলি-সেপা)।

ঋতুকালে—বিরেচন ও বমন; অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব (ফস); পদদ্বয়ে স্নায়ুশূল জনিত বেদনা রাত্রিতে রক্ত-প্রবাহের অধিকতর আধিক্য (বোভি—শয়নে আতিশয্য, ক্রিয়ো)।

অতিশয় বায়ু-নিঃসরণ বিশিষ্ট কুদমা কোষ্ঠ-রোধ

কঠিন, বিখণ্ডিত মল, নিঃসারণে অতিশয় চেষ্টার আবশ্যকতা; মলদ্বারের প্রান্ত হইতে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পতন (ম্যাগ-মি); মলের বর্ণের পরিবর্ত্তন, দুইবারের মল একরূপ হয় না (পলস)।

অর্শ। বলি টাটায় ও বেদনা করে; মলত্যাগের পর কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সরলান্ত্রে জ্বালা ও হুল-বেধনের ন্যায় যাতনা হয় (ইগ্নি, ল্যাক); বিশেষতঃ প্রদর-স্রাব বিলোপের পর।

শ্বেত প্রদর; অণ্ডের শুভ্রাংশের ন্যায় স্রাব, স্রাব-নিঃসরণের পূর্ব্বে নাভীর নিকটে জ্বালাকর মোচড়ান বেদনা, প্রত্যেকবার মূত্র-ত্যাগের পরে, কপিশবর্ণ, আঠাআঠা, বেদনাশূন্য প্রদর-স্রাব।

পৃষ্ঠে, স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের ব্যবধান-স্থানে শীতলতা অনুভব (ল্যাকনান)।

হাঁটিবার সময় জঙ্ঘার শিরা হ্রস্ব ও ব্যথিত বোধ হয়; পেশীর হ্রস্বতা হইতে

উৎপন্ন অশিথিলতার ন্যায় সন্ধিস্থলে অশিথিলতা (কষ্ট, সাইমেক্স)।

পদদ্বয়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম (এলম, গ্রাফ, সোরি, সেনিকিউ, সিপি)।

সম্বন্ধ—এই ঔষধের পরে এণ্ট কুড, ফস, পলস, সোনাকউ, ভাল খাটে।

এম্ব্রাগ্রিসিয়া।

(Ambragrisea)

বালক-বালিকাদিগের, বিশেষতঃ উত্তেজন-প্রবণা, স্নায়বীয়া ও দুর্ব্বলা যুবতীদিগের পক্ষে; এবং বৃদ্ধদিগের স্নায়বীয় রোগে, স্নায়ুর "জীর্ণশীর্ণতায়", এম্ব্রা উপযোগী।

শীর্ণ, শুষ্ক, ব্যক্তিগণ, যাহাদের সহজে শর্দ্দি লাগে।

অতিশয় বিষণ্ণতা, কয়েক দিন পর্য্যন্ত বসিয়া ক্রন্দন।

বৈষয়িক উৎপাতের পর নিদ্রা যাইতে অপারগতা, উঠিয়া বসিতে হয় (এ্যা ষ্টথা, সিপিয়া)।

দুর্গন্ধ নিশ্বাস সংযুক্ত বাংলা রোগ (জিহ্বার নীচে অর্দ্ধস্বচ্ছ টিউমার) (থুজা)।

উদরে শীতলতা অনুভব (ক্যাল্ক)

<u>মল-ত্যাগকালে কাহারও উপস্থিতি, এমন কি ধাত্রীর উপস্থিতি পর্য্যন্ত সহ্য হয়না</u>; বারবার বিফল মল-প্রবৃত্তি, ও উহাতে উৎকণ্ঠার উৎপত্তি।

অনেকক্ষণ হাঁটা, ও কঠিন মল-ত্যাগ প্রভৃতি সামান্য সামান্য কারণে ঋতুদ্বয়ের ব্যবহিত কালে রক্তস্রাব

বিশেষতঃ অথবা কেবল রাত্রিতে গাঢ়, নীলাভ শুভ্র শ্লেষ্মাময়, প্রদরস্রাব

থাকিয়া থাকিয়া প্রবল আক্ষেপিক কাস, তৎসহ উদ্গার ও স্বরভঙ্গ; উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে বা পড়িলে উহার আধিক্য (ড্রস, ফস); সন্ধ্যাকালের কাসে কাস উঠেনা, প্রাতঃকালে উঠে (হাইও); "হুপ"-শব্দ বিবর্জ্জিত হুপশব্দ কাস।

উপচয়।—উষ্ণপানীয় দ্রব্যে; উষ্ণগৃহে; গীত-বাদ্যে; শয়নে; উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে বা পড়িলে; বহুলোকের বিদ্যমানতায়, ও জাগরণান্তে; বৃদ্ধি।

উপশম।—আহারান্তে; শীতল বায়ুতে; শীতল আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যে; এবং শয্যা হইতে উত্থানে; উপশম।

সম্বন্ধ।—এণ্ট, এসাফ, কাক্কা, ইথে, মস্ক, ফস, ভেলের সহিত এম্ব্রার সমগুণ সম্বন্ধ।

এরংম ট্রিফিলংম।

(Arum Triphyllum)

নাসিকার শর্দ্দি; বিদাহী, তরলস্রাব; নাসা রন্ধ্রের অংদরণ nw)।

জলবৎ স্রাব নিঃসরণ সত্ত্বেও নাসা অবরুদ্ধবৎ অনুভব (মস্কা, অ্যাম, লেনাপিসের সহিত তুলনা করুন), রাত্রিতে বিবর্দ্ধিত হাঁচি।

বিদাহী, রসানীবৎ স্রাব নিঃসরণ, তদ্দ্বারা নাসিকার অভ্যন্তর ভাগ, নাসাপার্শ্ব ও উপরের ওষ্ঠের অবদরণ (আর্স, সেপা)।

যে পর্য্যন্ত রক্ত না পড়ে সে পর্য্যন্ত নাসিকা খুঁটন; নাসিকার পার্শ্বে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করণ।

রক্ত না পড়া পর্য্যন্ত ওষ্ঠ খুঁটন; মুখের কোণের ক্ষত, বিদারণ, ও রক্তপাত; রক্ত না পড়া পর্য্যন্ত হাতের আঙ্গুল কামড়ান।

অতিশয় বেদনা লাগিলেও কাঁচা রক্তস্রাবী স্থানে খুঁটন ও অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করণ; রোগী বেদনায় চীৎকার করে অথচ অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করিতে বিরত হয় না (ডিপথিরিয়া, স্কার্লেটিনা, ও টাইফয়েড জ্বরে)।

মুখের ও গলার স্পর্শ-দ্বেষ বশতঃ শিশুদিগের পানাহারে অস্বীকৃতি (মার্ক); ও নিদ্রাহীনতা।

প্রভুক্ত, বিদাহী জালা, তদ্দ্বারা মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী খাইয়া যায়; জিহ্বা মুখ-গহ্বরের অবদরণ জন্মে ও রক্তপাত হয়

স্বর-নাশ।—উত্তর-পশ্চিমদিকের বাতাস ভোগ করিয়া সম্পূর্ণ স্বর-বিলোপ (একন, হিপ); গান করিয়া স্বর বিলোপ (আর্জ্জ না, কষ্ট, ফস, সেলে)।

ধর্ম্ম-যাজকদিগের গলা-বেদনা; স্বরের কর্কশতা, অনিশ্চিতত্তা, অনায়ত্ততা, ও ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীলতা; আলাপ করিলে, কথা বলিলে, অথবা গান করলে বৃদ্ধি। বক্তা, গায়ক, ও অভিনেতাদিগের গলা-ব্যথা।

স্কার্লেটিনা রোগে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বড় বড় গোছায় গোছায় চাম উঠিয়া যাওয়া।

ঔদাস্য, স্বল্প বা বিলুপ্ত মূত্র সহকারে সান্নিপাতিক স্কার্লেটিনা; ইউরিমিয়ার আশঙ্কা।

সাংঘাতিক স্কার্লেটিনা ও ডিপথিরিয়ায় নাসিকা ও মুখের ক্ষত এই ঔষধের পরিচালক লক্ষণ।

সম্বন্ধ।—(১) হিপার, ও নাইট-এসির পরে শুষ্ক, স্বরভঙ্গসংযুক্ত, ক্রুপের ন্যায় কাসে; এবং প্রাতঃকালের স্বরভঙ্গে ও বধিরতায় এবং স্কার্লেটিনায় কষ্টিকম ও হিপারের পরে এরূম উপযোগী। (২) নিম্নক্রমে বা পুনঃপুনঃ এরূম প্রয়োগে অনেক সময় মন্দফল দর্শে। (৩) উচ্চক্রমের ঔষধে অতি সত্বর সফল ক্রিয়া দর্শে।

এলিয়ম সেপা।

(Allium Cepa)

বিবর্দ্ধিত নিঃস্রব নিঃসরণ সহকারে শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর তরুণ প্রতিশ্যায় জনিত প্রদাহ।

সর্দ্দিজনিত অতীব্র শিরোবেদনা, তৎসহ মাথার সর্দ্দি; সন্ধ্যাকালে উহার বৃদ্ধি, অনাবৃত বায়ুতে উহার উপশম; উষ্ণগৃহে ফিরিয়া আসিলে আবার বৃদ্ধি (ইউফ্রে, পলস)।

ঋতুকালে শিরঃপীড়ার বিরতি, ও ঋতুস্রাব অন্তর্হিত হইলে উহার প্রত্যাবৃত্তি (ল্যাক, জিঙ্ক)।

চক্ষুতে ধূম লাগিয়া উৎপন্নের ন্যায় জ্বালা কামড়ানি ও টাটানি, চক্ষু রগড়াইতে হয়; চক্ষুর জলপূর্ণতা ও লালবর্ণ; উহার কৈশিকা নাড়ীতে (capillaries) রক্তাধিক্য এবং অতিশয় অশ্রুস্রাব

মস্তকের প্রতিশ্যায়, প্রচুর, জলবৎ, ও বিদাহী (acrid) নাসা-স্রাব, তৎসহ প্রচুর অবিদাহী অশ্রুস্রাব (বিদাহী অশ্রু ও অবিদাহী নাসাস্রাব, ইউফ্রে)

নাসিকার অগ্রভাগ হইতে বিন্দু বিন্দু বিদাহী জলবৎ স্রাব পতন, (আর্স, আর্স-আইয়োড)

বসন্তকালের প্রতিশ্যায় —উত্তর-পূর্বদিকের আর্দ্র বাতাসে রোগের বৃদ্ধি; স্রাব লাগিয়া উপরের ওষ্ঠে ঘা ও ক্ষত জন্মে

হে-ফিভার (ওষধি-গন্ধজ জ্বর)।—প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসে উপস্থিত; শয্যা হইতে উত্থান করিলে প্রবল হাঁচি, পিচফল নাড়াচাড়া করাতে উৎপত্তি।

নাসিকার বহুপাদ (পলিপাস) (টেউক্রি, স্যাঙ্গ, ক্যাল্ক-আইয়োড, সোরিন)।

শৈত্যজনিত স্বরযন্ত্র প্রদাহ; কাসিবার সময় রোগীকে হাত দিয়া স্বরযন্ত্র ধরিতে হয়; বোধ হয় যেন কাসিতে কাসিতে উহা ছিঁড়িয়া যাইবে।

উদর বেদনা।—পা ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া অতিরিক্ত আহার করিয়া, শসা বা শাকের কাঁচা চাটনি খাইয়া; এ অবস্থায় উহার উৎপত্তি; বালকদিগের উদর-বেদনা বসিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে হ্রাস।

বদনে, মস্তকে, দাঁতে, বুকে একগাছি দীর্ঘ সূতার ন্যায় স্নায়বিক বেদনা।

আঘাতিক পুরাতন স্নায়ু-প্রদাহ; অঙ্গচ্ছেদের পর অবশিষ্টাংশের স্নায়ুশূল; জ্বালা কর ও সূচবেধনবৎ বেদনা।

অঙ্গুল-হাড়া —নখের উপর পার্শ্বে লাল লাল দাগ, বেদনায় ক্ষিপ্তবৎ করিয়া তোলে; সূতিকাবস্থায় উহার উৎপত্তি।

পায়, বিশেষতঃ গোড়ালিতে ঘর্ষণ বশতঃ ক্ষত ও কাঁচা স্থান। "পদাতিকের পায় ক্ষত হইলে এই ঔষধ উপকারী"।

সাঁড়াশী দ্বারা প্রসবের পর (after forceps delivery) সূতিকাবস্থায় শিরা-প্রদাহ।

উপচয় ।—সায়াহ্নে ও উষ্ণগৃহে প্রধানতঃ বৃদ্ধি (পলস অনাবৃত বায়ুতে বৃদ্ধি, ইউফ্রে) ।

উপশম ।—শীতল গৃহে ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম (পলস) ।

সম্বন্ধ — (১) ফস, পলস, থুজার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ, (২) নাসা-র্বুদে (polypus) ক্যালকেরিয়া সিলিশিয়ার পূর্ব্বে উপযোগী, (৩) ইউফ্রেসিয়ার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ, কিন্তু নাসাস্রাব ও অশ্রুস্রাবে বিপরীত সম্পর্ক, (৪) পা ভিজাইবার মন্দফলে রসটক্সের সহিত সম্বন্ধ ।

এলুমিনা ।

(Alumina)

যাহারা পুরাতন রোগে ভুগিয়া থাকে তাহাদের পক্ষেই এলুমিনা বিশেষ উপযোগী ; "পুরাতন রোগে এলুমিনা একোনাইট স্বরূপ" ।

শারীরিক উত্তাপের অসদ্ভাব বিশিষ্ট ধাতু (ক্যাল, সিলি) ।

ক্ষীণ, শুষ্ক, কৃশ রোগী ; মলিন বর্ণ মুখাকৃতি , খিটখিটে প্রকৃতি ; অবসাদ-বায়ুগ্রস্ত, ব্যক্তি ; (hypocondriaca) শুষ্ক, দদ্রুবৎ, কণ্ডূয়নজনক উদ্ভেদ, শীতকালে উহার আধিক্য (পেট্রো) ; শয্যায় শরীর উষ্ণ হইতে থাকিলে সর্ব্ব শরীরের অসহ্য কণ্ডূয়ন (সলফ) ; যে পর্য্যন্ত রক্ত না পড়ে সে পর্য্যন্ত কণ্ডূয়ন, অনন্তর যাতনা ।

সময় অতিরিক্ত ধীরে ধীরে গত হয় একঘণ্টা অর্দ্ধদিনের ন্যায় বোধ হয় (ক্যান-ইণ্ড) ।

চক্ষু না মেলিয়া এবং দিবাভাগে ভিন্ন হাঁটিতে পারা যায় না ; চক্ষু বুজিয়া হাঁটিলে ঝুঁকিতে ও পড়িতে হয় (আর্জ্জ-না, জেল) ।

অস্বাভাবিক ক্ষুধা ; খেতসার, ফুলখড়ি, অঙ্গার, লবঙ্গ, চা বা কফির গুঁড়া এবং অম্ল ও অপাচ্য দ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা (সিকু, সোরি) ; গোল আলু সহ্য হয় না ।

বহুবৎসর ব্যাপী পুরাতন উদগার, সন্ধ্যাকালে উহার আতিশয্য ।

লবণ, সুরা, সির্কা গোলমরিচ প্রভৃতি মসলা উত্তেজক দ্রব্যে তৎক্ষণাৎ কাসের উৎপত্তি।

কোষ্ঠরোধ।—অধিক মল সঞ্চিত না হইলে মল-প্রবৃত্তি বা মল ত্যাগের সামর্থ্য জন্মে না (মেজিরি), অতিশয় কুন্থন, শক্ত করিয়া কিছু ধরিয়া কুন্থিতে হয়; শক্ত, গ্রন্থিল, পাথরের মত গোলাকৃত, মল; অথবা নরম, কাদার মত মল, উহা মলদ্বারে লাগিয়া থাকে (প্লাটি)।

সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, কোমল মলও নিঃসারণ করিতে অতিশয় কুন্থনের আবশ্যকতা (এলাম, প্লাটি, সিলি, ভিরেট)

স্তন্যপায়ী শিশুদিগের কৃত্রিম আহার জনিত; বোতলে দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের; বৃদ্ধদিগের (প্লাই, ওপি); এবং গর্ভাবস্থায় সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা বশতঃ (সিপি); কোষ্ঠবদ্ধতা।

মূত্র-ত্যাগ-কালে রোগিণীর অতিসার।

মল-ত্যাগ-কালে প্রস্রাব করিতে কুন্থন করিতে হয়।

শ্বেতপ্রদর।—বিদাহী ও প্রচুর, গোড়গুড়া (heels) পর্য্যন্ত প্রবাহিত স্রাব (সিফ), দিবাভাগে উহার আধিক্য; শীতলজলে ধৌতে লাঘব। ঋতুর পরে, শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা, প্রায় কথা বলিতে পারা যায় না (কার্ব্বো-এন, কক্কু)।

কথা বলিলে শ্রান্তি জন্মে; শ্রান্তি ও ক্লান্তি, অবশ্য বসিয়া থাকিতে হয়।

উপচয়।—শীতল বায়ুতে; শীতকালে; উপবেশন কালে; গোল আলু খাইলে; সুপ (মাংসের ঝোল) আহারে; একদিনপর একদিন; অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়; বৃদ্ধি।

উপশম।—মৃদু গ্রীষ্মকালে; উষ্ণপানীয় দ্রব্যপানে; আহার করিবার সময় (কোনি); ও বর্ষা কালে (কষ্টি); হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) ব্রাইওনিয়ার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ (২) ব্রাই, ল্যাক, সলফের পরে এলুমিনা ভাল খাটে। (৩) রোগের তরুণ অবস্থায় ব্রাই ও পুরাতন অবস্থায় এলু উপযোগী। (৪) বৃদ্ধদিগের রোগে ব্যারা-কার্ব্ব ও কোনায়ম এলুমিনার সমগুণ।

সীসদ্বারা বিষাক্ত হইলে ; সীস-শূলে ; ও সীসজনিত রোগে এলুমিনা একটী প্রধান ঔষধ

এলো সকোট্রিনা।

(Aloe Socotrina.)

যাহারা অলস ও ক্লান্ত ; মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে বিরক্ত ; মানসিক পরিশ্রমে যাহাদের শান্তি জন্মে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

বৃদ্ধ ব্যক্তি, বিশেষতঃ শ্লেষ্মা-প্রধান-ধাতু, শিথিল-শরীর স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। ঘর্ম্ম সহকারে অতিশয় অবসন্নতা ইহার লক্ষণ।

শীতকালের সমাগমে প্রতিবৎসরই পাঁচড়ার উপস্থিতি। (সোরি)।

আপনার প্রতি অথবা আপনার অসুখের প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত, বিশেষতঃ যখন কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রোগ ; গলা অথবা সরলান্ত্র (rectum) হইতে জেলীয়ের মত দলা দলা শ্লেষ্মার উৎপত্তি জন্মে ; সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী আক্রান্ত হয়

কপালের আড়াআড়ি শিরঃপীড়া, প্রতি পদ-বিক্ষেপে উহার বৃদ্ধি (বেল, ব্রাই), তৎসহকারে চক্ষুর গুরুত্ব, ও বিবমিষা (nausea)।

শিরঃপীড়া।—উত্তাপে উহার বৃদ্ধি ও শীতল প্রয়োগে হ্রাস (আর্স) ; কটিবেদনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে শিরোবেদনা ; অপ্রচুর মল-নিঃসরণের পর শিরঃপীড়া।

অতিসার।—আহার ও পানের অব্যবহিত পরে তাড়াতাড়ি করিয়া বহির্দ্দেশে (পায়খানায়) যাইতে হয় (ক্রোট-টি) ; মলদ্বারের আবরক-পেশীর উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না ; (অর্থাৎ মল বেগ ধারণ করা যায় না) প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বহির্দ্দেশে (পায়খানায়) যাইতে হয় (সোর, রুম, সল্ফ)।

অপান (বায়ু Flatus) নিঃসরণ কালে যেন উহার সহিত মল নির্গত হইবে এইরূপ অনুভব (ওলিন, মিউর-এসি, ন্যাট-মিউ)।

উদর-বেদনা।—উদরের দক্ষিণ ভাগের নিম্নাংশে কর্ত্তন ও মোচড়ানবৎ বেদনা ; মলত্যাগের পূর্ব্বে ও মলত্যাগ-কালে বেদনার অত্যন্ত তীব্রতা মলত্যাগের পরে সমস্ত বেদনার বিরতি ঘটে, কিন্তু প্রভূত ঘর্ম্ম ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অবশিষ্ট থাকে ; বেদনার আক্রমণের পূর্ব্বে দুর্দ্দম্য কোষ্ঠ-রোধ থাকে।

দুর্গন্ধ, জ্বালাকর, অধিক অপান (বায়ু-Flatus) নিঃসরণ। অল্প মলের সহিত অধিক অপান নির্গমন (এলো), অপান নিঃসরণের পর মলদ্বারে জ্বালা।

অনিচ্ছায় নিরেট মল ও আম রাশি নিঃসরণ ; আহারের কালে ক্ষুধা।

মল-ত্যাগের পূর্ব্বে পেট-ডাকা, সহসা প্রবল মল-বেগ, সরলান্ত্রে গুরুত্ব। মল-ত্যাগ কালে কুন্থন ও অধিক অপান নিঃসরণ ; মল-ত্যাগের পরে শ্রান্তি

অর্শ —নীলবর্ণ, আঙ্গুর ফলের থোপার ন্যায় বলি (মিউর-এসি); সরলান্ত্রে অবিরত আবেগ ; রক্তস্রাবী, স্পর্শ-দ্বেষ বিশিষ্ট, উত্তপ্ত ও শীতল জল প্রয়োগে উপশমিত-অর্শ ; তীব্র কণ্ডূয়ন।

মলদ্বারে কণ্ডূয়ন ও জ্বালা, উহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত (ইণ্ডি)।

উপচয়।—প্রত্যূষে শারীরিক পরিশ্রমের প্রভাবে ; উত্তপ্ত শুষ্ক কালে ; আহার বা পানান্তে ; দাঁড়াইলে বা হাঁটিলে ; বৃদ্ধি।

উপশম।—শীতল জলে ; শীতল কালে ; অপান ও মল নিঃসরণে উপশম।

সম্বন্ধ —(১) উদরের রক্তাধিক্য এবং যকৃৎ-শিরার রক্তাধিক্য সংযুক্ত অনেক পুরাতন রোগে সলফারের ন্যায় এই ঔষধও ব্যবহৃত হয় ; অপর এতদ্দ্বারা লুপ্ত উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়। (২) এস-মিউ, গ্যাম্ব, নক্স ও পডোফের সহিত এলোর সমগুণ সম্বন্ধ।

এষ্টিরিয়াস রুবেন্স ।

(Asterias Rubens)

সাযক-ধাতু-দোষ (সাইকোটিক ডায়াথিসিস); শিথিল, লসিকা-প্রধান (lymphatic) শারীরিক প্রকৃতি কোপন স্বভাব।

কোনপ্রকার চিত্ত-বিকারে; বিশেষতঃ প্রতিবাদে সহজে উত্তেজনায় উৎপত্তি (এনাকা, কোনা)।

উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার ন্যায় মস্তকের উত্তাপ।

মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়।

সংন্যাসরোগে; বদনের আরক্ততা, নাড়ীর দৃঢ়তা, পূর্ণতা, ও দ্রুততা।

স্তনের ক্যান্সার, তরুণ; ছুরিকা দিয়া কর্ত্তনের ন্যায় বেদনা; স্তনে আকর্ষণী বেদনা; ঋতুর পূর্ব্বে যেরূপ হয় স্তনের সেইরূপ স্ফীততা ও প্রসারিততা; স্তনদ্বয় ভিতরেরদিকে আকৃষ্ট অনুভূত হয়।

স্তনে একটী নীলবর্ণ মিশ্রিত আরক্ত চিহ্নের প্রকাশ, উহা ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রাব নিঃসরণ, ক্রমে ক্রমে সমগ্র স্তন আক্রমণ, উহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ; উহার প্রান্তভাগ পাণ্ডুর, সমুন্নত, শক্ত ও বিপর্য্যস্ত; তলদেশে ঈষৎ লোহিত কতাঙ্কুরে (granulation) আবৃত।

চলনের অদৃঢ়তা; পেশীর ইচ্ছার অনায়ত্ততা (এলম, জেল্‌)।

অপস্মার (epilepsy); রোগের আবেশ উপস্থিত হইবার চারি পাঁচ দিবস পূর্ব্বে সর্ব্ব শরীরে স্পন্দন।

কোষ্ঠ-রোধ।—দুর্দ্দম্য কোষ্ঠ-রোধ; নিষ্ফল মল-প্রবৃত্তি; অলপাইয়ের আকৃতি শক্ত শক্ত গোলার ন্যায় মল।

অতিসার।—জলবৎ কপিশবর্ণ, প্রবল ধারায় নির্গত মল (কোষ্ট, গ্রাট, সম্ব, ঝ্যাট্রি, পুল্স)।

নারীদিগের সম্ভোগ-ইচ্ছার বৃদ্ধি (সিপি)।

সম্বন্ধ।—(১) মিউরেক্স সিপিয়ার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) স্তনের ক্যান্সারে কার্ব্বো-এন, কোনা, সিলির সহিত; এবং অপস্মারে, বেল, ক্যাল্ক, ও সলফের সহিত; তুলনা হয়।

এসেটিক্ এসিড।

(Acatic Aoid)

পাণ্ডুর, ক্ষীণকায়া, শিথিল শোণিত পেশী; পাণ্ডুবর্ণ, মোমবৎ বদন (ফস্) বিশিষ্ট; ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

রক্তস্রাব।—প্রত্যেক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীময় দ্বার, নাসিকা, গলা, ফুসফুস, আমাশয় অন্ত্র, গর্ভাশয় হইতে রক্তপাত (ফস্, ক্রিও); প্রসবান্তে রক্তস্রাব; প্রতিকল্প (vicarious) রক্তস্রাব; নাসিকার আভিঘাতিক রক্তস্রাব (আর্ণি)।

বালকদিগের ক্ষয়রোগ (marasmus) ও অন্যান্য শরীরক্ষয়কর রোগ (এব্রো, আইও, স্যানি, টিউব)।

অভিঘাতের (injuries) পর (লিড-আর্ণি); শস্ত্রোপচারের পর; স্পর্শজ্ঞানবিলোপকর ঔষধ ব্যবহারের পর; অতিশয় অবসন্নতা।

শোথ, বহুমূত্র, পুরাতন অতিসার প্রভৃতি রোগে তীব্র, জ্বালাকর, অধিক জলপানেও অতৃপ্ত, পিপাসা; কিন্তু জ্বরে পিপাসাশূন্যতা।

গর্ভাবস্থায় অম্ল উদ্গার ও বমন, দিবারাত্রি মুখবিবর জল উঠা ও প্রভুত লালা-স্রাব (ল্যাক্-এসি,—রাত্রিতে লালাস্রাবের বৃদ্ধি, মার্ক-সল)।

অতিসার।—অবসাদজনক, অতিশয় পিপাসাসংযুক্ত, অধিক মলস্রাব বিশিষ্ট অতিসার, শোথ, টাইফয়েড জ্বর, ও যক্ষার অতিসার; দৈনন্দিসহকারে অতিসার।

প্রকৃত ক্রুপ, হিস্‌হিস্‌শব্দবিশিষ্ট শ্বাস, নিশ্বাস সহকারে কাস (স্পঞ্জ); শেষাবস্থা।

ক্রুপ রোগে ও সাংঘাতিক ডিপথিরিয়ায় সাইডার ভিনিগারের বাষ্প নিশ্বসন ফলপ্রদ।

চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারা যায় না (চিৎ হইয়া ভাল শয়ন করা যায়, ব্রায়ো); উদরে শূন্যতানুভব ও তজ্জন্য শ্বাস-কৃচ্ছ্র; উপুর হইয়া উদরের উপর ভর দিয়া শয়নে ভালরূপে বিশ্রাম লাভ [illegible] (এম-কা)।

প্রলেপক জ্বর (হেক্টিক ফিভার), গাত্রত্বকের পাংশুবর্ণতা ও উত্তপ্ততা; বামগালে লাল চিহ্ন ও অতিশয় নৈশঘর্ম্ম।

সম্বন্ধ—(১) স্পর্শজ্ঞানহারকবাষ্প (এমিল), অঙ্গার ও গ্যাসের ধূম, এবং ওপিয়ম ও ষ্ট্রমোনিয়মের ক্রিয়া এতদ্দ্বারা বিনষ্ট হয়। (২) সাইডার ভিনিগার (এপেল্ ফলের রসজাত সির্কা) কার্ব্বলিক এসিডের ক্রিয়া নষ্ট করে। (৩) রক্তস্রাবে সিঙ্কোনার পরে এবং শোথে ডিজিটেলিসের পরে, এসেটিক এসিড ভাল খাটে। (৪) এই ঔষধে আর্ণ, বেল, ল্যাক, ও মার্কের লক্ষণ; বিশেষতঃ বেলেডোনাজনিত শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পায়।

এসেরাম ইউরোপিয়াম।

(Asarum Europoum)

স্নায়বীয় ব্যাকুল; বিষণ্ণ বা উত্তেজনা-প্রবণ ব্যক্তিগণ।

প্রেত-দেহের ন্যায় যেন রোগী শূন্যে বিচরণ করিতেছে এরূপ অনুমান (ল্যাক ক্যান), সমস্ত অঙ্গের লঘুতা।

যে কোনপ্রকার চিত্ত-বিকার বশতঃ শীতে কম্প।

স্নায়ুর অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য, কার্পাস বা রেশমের বস্ত্রে নখের আঁচড়, অথবা কাগজের খড় খড় শব্দ সহ্য হয় না। (ফির, টার)।

কর্ণদ্বয় যেন কোন বাহ্যবস্তুর ছিপি দ্বারা বদ্ধ হইয়াছে এরূপ অনুভব।

পড়িবার সময় চক্ষু যেন প্রচাপিত হইয়া বিভিন্ন অথবা বহির্গত হইবে এপ্রকার অনুভব; শীতল জলে চক্ষু ধুইলে উহার শান্তি।

চক্ষে শীতল বায়ু বা শীতল জল বড়ই ভাল লাগে; রৌদ্র, আলোক ও বাতাস সহ্য হয় না।

বিবমিষা ।—(nausea) থাকিয়া থাকিয়া বা সতত (হিপ) বিবমিষা; আহারাদের উহার বৃদ্ধি, জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা (সলফ); গর্ভাবস্থার বিবমিষা।

মদিরাপানের দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা; রুশিয়ায় মদিরাপায়ীদিগের পক্ষে প্রচলিত ঔষধ।

প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগিবার সময় আমাশয়ে (stomach) "ভয়ঙ্কর" প্রচাপন ও খননবৎ অনুভব (অমিতাচারের পর)।

অতিশয় শ্রান্তি ও সতত জৃম্ভণ (yawning)।

উপচয়।—শীতল ও শুষ্ক, অথবা পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর আবহাওয়ায়, বৃদ্ধি (কষ্ট)।

উপশম।—মুখমণ্ডল অথবা রোগাক্রান্ত স্থান শীতলভাবে প্রক্ষালনে, ও আর্দ্র, ভিজাকালে (কষ্ট) উপশম।

সম্বন্ধ।—(১) হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে কষ্টিকমের সহিত; এবং সর্ব্বাংশে দুর্গন্ধযুক্ত মল-লক্ষণে এলো, আর্জ্জেন্টা, ম , পডো, পল, সল-এসিড সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) এসেরমের পরে বিস, কষ্ট, প , সল-এসি, ব্যবহৃত হয়

ওপিয়ম।

(Opium)

বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে; অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বালকত্বের (বার্দ্ধক্যের) রোগে (ব্যারা-কা, মিলি); এবং লঘুকেশ, শিথিল পেশী, ও শারীরিক উপদাহিতার অভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে ওপিয়ম বিশেষ উপযোগী।

ঔষধে অনুভূতির অভাব; জীবনী শক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাব, সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও কোন ফলপ্রকাশ পায়না (কার্ব্বো, সরো, ভেলে)।

অচৈতন্য এবং আংশিক বা সম্যক পক্ষাঘাত সংযুক্ত; ভয় হইতে উৎপন্ন, ভয়ের মন্দফল তখনও অবশিষ্ট (একন, হাইও); অঙ্গারের বাষ্পজনিত গ্যাস বা বাষ্প নিশ্বাসবশতঃ উদ্ভূত; এবং মদ্যপায়ীদিগের রোগ।

অতিশয় নিদ্রালুতা ; বেদনাশূন্যতা, আকাঙ্ক্ষাহীনতা ও অভিযোগ পরিশূন্যতা সংযুক্ত ; সকল রোগ।

আক্ষেপ (spasms)।—অপরিচিত ব্যক্তিদিগের আগমনে ; মাতার ভয়-প্রাপ্তির পর স্তন্যদানে (হাইওস —মাতার ক্রোধের পর স্তন্যদানে, ক্যাম, নক্স); এবং ক্রন্দন জন্য শিশুর আক্ষেপ। আক্ষেপ-কালে চক্ষু অর্দ্ধ বিকসিত ও উর্দ্ধো-ত্থিত থাকে।

আক্ষেপের পূর্ব্বে ও আক্ষেপ-কালে চিৎকার (এপিস, হেলি)।

নিশ্বাসে ও প্রশ্বাসে দুইয়েই শ্বাসের গভীর শব্দ।

প্রলাপ, অবিরত কথাবলা ; চক্ষু বিস্তৃতরূপে বিমুক্ত, মুখমণ্ডল আরক্ত ও স্ফীত (ফুলাফুলা) ; অথবা অচৈতন্য, কাচবৎ চক্‌চকে, অর্দ্ধমুদিত চক্ষু, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল গভীর তন্দ্রা (কোমা) ; তৎপূর্ব্বে সুপ্তি (ষ্টুপার)।

যে গিন্নী মনে করে যে সে বাড়ীতে নাই (ব্রাই) ; ক্রমাগতই তাহার মনে এই ভাব থাকে।

নিদ্রাবস্থায় শয্যাবস্ত্র খুঁটন (জাগ্রৎ অবস্থায়, বেল, হাইওস)।

মদাত্যয় (ডিলিরিয়ম ট্রিমেন্স) —বৃদ্ধ, শীর্ণ ব্যক্তিদিগের মদাত্যয় ; স্ফীত মুখমণ্ডল, সুপ্তি, জাড্যকর, উত্তপ্ত, শুষ্ক চক্ষু ; উচ্চ নাসা-রব।

নিদ্রা।—প্রগাঢ় নিদ্রা · সশব্দ শ্বাস, আরক্ত মুখমণ্ডল, অর্দ্ধ-মুদিত চক্ষু, রক্তবর্ণ চক্ষু, উত্তপ্ত ঘর্ম্মোবাবৃত ত্বক্ ; টঙ্কারের পরে।

নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারা যায় না (বেল, ক্যাম), শ্রুতি শক্তির তীব্রতা সহকারে নিদ্রাশূন্যতা, অধিক দূরের ঘড়ির শব্দ ও কুক্কুটের ডাক শুনিয়া রোগিণী জাগরিত থাকে।

নিদ্রাক্রান্ত হইবার সময় শ্বাস রুদ্ধতা (গ্রিণ্ড, ল্যাক)।

শয্যা এত উত্তপ্ত বোধ হয় যে রোগিণী উহাতে শয়ন করিতে পারে না (শয্যা শক্ত বোধ হয়, আর্ণ, ব্রাই, পাইরো) ; একটু শীতল স্থানের অন্বেষণে বারম্বার নড়েচড়ে ; গাত্র অনাবৃত করিতে চায়।

পরিপাক-যন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা —ধমন ক্রিয়ার (পেরিষ্টাল্টিক য়্যাক্শন) বিপর্য্যস্ততা বা পক্ষাঘাত ; অন্ত্র অবরুদ্ধ বোধ হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা।—শিশুদিগের ; স্থূলাঙ্গী, স্থপ্রকৃতি নারীদিগের (এ্যালেন) ; অন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা বা আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ; মল-প্রবৃত্তি পরিশূন্য ; ও পীড়ের বিহ্বলতা জনিত ; কোষ্ঠ-রোধ। শক্ত, গোলাকার, কৃষ্ণবর্ণ বর্তুলবৎ মল (চেলি, ম্যুর, গুর্জা), মল বাহির হইয়া আবার ভিতরে প্রবেশ করে (গিলি, গুর্জা)।

মল।—অনিচ্ছায় নির্গত, বিশেষতঃ ভয় প্রাপ্তির পরে (ওয়েল) ; কাল ও দুর্গন্ধ। মলদ্বারের মুখাবরক পেশীর পক্ষাঘাত জনিত মল।

মূত্র।—মূত্রাশয়ের পূর্ণতাসহ মূত্র-রোধ, প্রসবের পরে অথবা অত্যন্ত তামাক খাওয়া বশতঃ ; স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর ক্রোধের পরে স্তন্যপায়ী শিশুর ; জ্বরে বা তরুণ রোগে ; ও মূত্রাশয় বা মূত্রাশয়ের মুখাবরক পেশীর পক্ষাঘাত বশতঃ ; মূত্র-রোধ।

(ষ্ট্রামোনিয়মে মূত্রের অনুৎপত্তি থাকে ; কিন্তু ওপিয়মে মূত্র-নিঃসরণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, মূত্রাশয় মূত্রপূর্ণ থাকে কিন্তু রোগী সে পূর্ণতা টের পায় না) ওপিয়মে অন্ত্রের ক্রিয়ায় এমনই জড়তা জন্মে যে অতিশয় প্রবল বিরেচক ঔষধেরও ক্রিয়া দর্শেনা। (হেরিং)।

অধিক মাত্রায় ওপিয়ম দ্বারা চিকিৎসিত রোগীদিগের দুর্নিবার অতিসার (ডাঃ লিপি)।

তরুণ উদ্ভেদের আকস্মিক বিলোপ বশতঃ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত অথবা টঙ্কার (ধড়কা) (হিক্ক)।

ক্ষয়-রোগ (মারাসমাস) ; শিশুর ত্বক আকুঞ্চিত হয়, তাহাকে শুষ্কশীর্ণ ক্ষুদ্র বৃদ্ধের ন্যায় দেখায় (এরোট)।

উপচয়।—নিদ্রাকালে ও নিদ্রান্তে (এপিস, ল্যাক) ; ঘর্ম-নিঃসরণ কালে ; উষ্ণতা হইতে ; ও উত্তেজক দ্রব্যাদি সেবন বশতঃ ; বৃদ্ধি।

উপশম।—শীতলতায় ; ও অবিরত বিচরণে উপশম।

সম্বন্ধ।—(১) বিষ মাত্রায় ওপিয়ম সেবিত হইলে উগ্র কাফি, নাক্সভমিকা কাম্ফী-পার্ম, এবং অবিরত হাঁটিয়া বেড়ান উহার প্রতিকারক। (২) লক্ষণের সহিত ঐক্য হইলে ওপিয়ম সেবনের মন্দফল ওপিয়মের হোমিওপ্যাথিক ক্রমদ্বারা নিবারিত হইতে পারে। (৩) ওপিয়মের সহিত এপিস, বেল, হাইওস, ষ্ট্রাম, ও জিঙ্কের তুলনা হয়।

ককিউলাস।

(Cocculus)

পাতলা চুল ও পাতলা চক্ষু বিশিষ্ট যে সকল রমণী ঋতুকালে ও গর্ভাবস্থায় অতিশয় কষ্ট পায় তাহাদের পক্ষে ; এবং অবিবাহিতা ও সন্তানহীনা নারীদিগের পক্ষে ; এই ঔষধ উপযোগী।

যাহারা সর্ব্বদা পড়ে ; যে সকল কুমারীদিগের ঋতু বৈষম্য সহকারে অতিশয় অনুভবাধিক্য ও কল্পনাময়তা (romantic) থাকে তাহাদের পক্ষে ; এবং কৃত্রিম মৈথুনাসক্ত ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবায় দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ; এই ঔষধ উপযোগী।

গাড়ী, নৌকা অথবা বাষ্পীয় শকটে আরোহণ বশতঃ (আর্স, নক্স-ম), কিংবা সচল নৌকার প্রতি দৃষ্টিপাত জনিত, বিবমিষ ও বমন ; সামুদ্রিক বিবমিষা (Sea-Sickness) ; বাষ্পীয় শকটারোহণ-জনিত বিবমিষা

শিরঃপীড়া।—গ্রীবার ও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ; মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত ; রজ্জুদ্বারা কসিয়া বাঁধার ন্যায় ; সমুদ্রযাত্রায় বিবমিষার অনুরূপ বিবমিষা সহ ; প্রতি ঋতুকালে ; এবং মাথা চিৎ করিয়া শয়নে বিবর্দ্ধিত ; শিরঃপীড়া।

গাড়ীতে, নৌকায় অথবা রেলের গাড়ীতে আরোহণ বশতঃ সবমন শিরঃপীড়া।

মদ্যপায়ীদিগের বিশেষ রোগ

মুখে ধাতব আস্বাদ সহকারে ক্ষুধাহীনতা (মার্ক)।

সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায় (অতি ধীরে ধীরে যায়, আর্জ্জেন্ট, ক্যান-ইণ্ড)।

সমগ্র শরীরের অতিশয় আলস্য ; চেষ্টা করিয়া দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে হয় ; উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়।

অনিদ্রার, এবং মানসিক উত্তেজনা ও রাত্রিজাগরণের মন্দ ফল ; এক ঘণ্টা কাল কম নিদ্রা গেলেও ; অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব ; নিদ্রাহীনতার পরে উন্মাদ। ক্রোধ ও শোকের মন্দফল।

উত্তেজনা, শ্রম অথবা বেদনা বশতঃ বাহু ও জঙ্ঘায় কম্পন।

শয্যায় উঠিয়া বসিলে মত্তভাবৎ শিরোঘূর্ণন; অথবা গাড়ীর সঞ্চালনে শিরোঘূর্ণন (বাই)

প্রত্যেকবার নড়িলে চড়িলে উদরে ধারাল প্রস্তরের ন্যায় কর্ত্তন বা ঘর্ষণবৎ অনুভব। মস্তকে ও শরীরের অন্যান্য অংশে শূন্য-গর্ভতা অনুভব (ইগ্নে)।

রজঃ-নিঃসরণের চেষ্টায় এতই দুর্ব্বলতা যে নিম্নাঙ্গের দৌর্ব্বল্য বশতঃ (এলাম, কার্ব্বো-এন) প্রায় দাঁড়াইতে পারা যায় না; প্রত্যেকবার ঋতুর পরে অর্শ।

ঋতুর অক্রমে, অথবা ঋতুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে (আইওড, অ্যাম্ব) প্রদর; মাংস-ধৌত জলের ন্যায়; রক্তমস্তুর (Serum) ন্যায়, রসানি সদৃশ, রক্তাক্ত; স্রাব। গর্ভাবস্থায় প্রদর।

প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারা যায় না; সহজে বিরক্তি জন্মে; সামান্য সামান্য বিষয়ে ক্রোধের উদ্রেক হয়; রোগী তাড়াতাড়ি কথা বলে (এনা)।

অন্যের ধীর, প্রচ্ছন্ন ও স্বভাবীয় প্রকৃতি দর্শন, তৎসহকারে শিরোঘূর্ণন; ও ক্রোধ-প্রবণতা।

উপচয়।—আহারে, পানে, নিদ্রায়, ধূমপানে, আলাপে, শকটারোহণে, জাহাজের সঞ্চলনে বা সন্দোলনে; এবং গর্ভাবস্থায় উত্থানে; বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ—(১) কোরিয়া ও পক্ষাঘাতের জন্যে ইগ্নে ও নাক্সের সহিত; এবং রোগাক্রান্ত স্থানের ঘর্ষে এণ্ট-টার্টের সহিত ককিউলাসের তুলনা কর।

(২) দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত নাভীদেশীয় অন্তবৃদ্ধিতে (umbilical hernia) সকল বিফলান্তে এই ঔষধে আরোগ্য জন্মিয়াছে

কফিয়া ক্রুডা।

(Coffea Cruda.)

দীর্ঘ, ক্ষীণ, অবনতদেহ, মলিন মুখাকৃতি, রক্ত-প্রধান পিত্ত-প্রকৃতির রোগী।

—অতিরিক্ত অনুভূতি; দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, সকল ইন্দ্রিয়েরই অতিশয় তীক্ষ্ণতা (বেল ক্যাম, ওপি)।

মন ও শরীরের অসাধারণ কার্য্য-পরতন্ত্রতা (unusual activity)।

মনে নানাপ্রকার ভাবের উদয় ; শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য-সম্পাদন, তজ্জন্য নিদ্রায় বিরতি।

আকস্মিক মনোভাবের অথবা আনন্দজনক বিস্ময়ের মন্দফল (কফি।— উত্তেজনাজনক বা অমঙ্গলজনক সংবাদের মন্দফল, জেলস) ; আনন্দাশ্রুপাত ; পর্য্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন।

বেদনায় অতিশয় তীব্রতা অনুভব উহা অসহ্যপ্রায় বোধ হয়, রোগীকে ক্ষিপ্তবৎ করিয়া তোলে (একো, ক্যাম) ; সে যাতনায় অবলুণ্ঠিত হয়।

নিদ্রাহীনতা, সম্পূর্ণ জাগ্রৎ অবস্থা ; চক্ষু বুজিতে অসাধ্যতা ; মানসিক উল্লাসে শারীরিক উত্তেজনা। (রজোনিবৃত্তিকালে কন্দ (prolapsus uteri), জরায়ুর উপদাহ জনিত নিদ্রাহীনতায় সিমিসিফুর সহিত তুলনা হয়)।

শিরঃপীড়া।—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, চিন্তা, ও আলাপন জনিত শিরঃপীড়া ; এক পার্শ্বের শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তিষ্কে প্রেক বিদ্ধ হইতেছে (ইগ্নে, নক্স), মস্তিষ্ক যেন ছিন্নভিন্ন অথবা আঘাতিত হইয়া খণ্ডখণ্ড হইতেছে ; অনাবৃত বায়ুতে উহার বৃদ্ধি।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া আহার ও পান করা (বেল, হিপ)।

সবিরাম, উৎক্ষেপণবৎ (jerking), এবং মুখে বরফের জল রাখিলে উপশমিত, কিন্তু সেই জল উষ্ণ হইবামাত্র প্রত্যাবৃত্ত ; দন্তবেদনা। (ব্রায়, মার্ক, পল্স, কষ্ট, সিপি, ন্যাট-সল)।

উপচয়।—আকস্মিক মনোভাবে ; অত্যন্ত আনন্দে ; শীতল, অনাবৃত বায়ুতে ; মাদক ঔষধে ; বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—(১) একো, ক্যাম, ইগ্নে, সলফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) ক্যাম্ফ, কষ্ট, কক, ইগ্নের সহিত বিষমগুণ সম্বন্ধ।

কলচিকম অটমনেল।

(Colchicum Autumnale.)

আমবাতিক ও অস্থি-বাতিক (rheumatic) ধাতুতে; হৃষ্ট পুষ্ট সবল ব্যক্তিদিগের পক্ষে; এবং বৃদ্ধদিগের রোগে; কলচিকম উপযোগী।

আলোক, শব্দ, উগ্রগন্ধ, স্পর্শ ও অপরের অন্যাচরণ রোগীকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তোলে (নক্স,); তাহার যাতনা অসহ্য বোধ হয়।

শোক বা অন্যের দুর্ব্যবহার জনিত পীড়া (ষ্ট্যাফ)।

আকর্ষণ, ছেদন, ও প্রচাপনবৎ (pressing) বেদনা; উষাকালে উহার অত্যুগ্রতা; বায়ু শীতল হইলে অস্থি ও গভীর বিধান-তন্তুর (deeper tissue) আক্রান্ততা, বাম হইতে দক্ষিণ দিকে বেদনার গতি (ল্যাক)।

ঘ্রাণ-শক্তির অতিশয় তীব্রতা; খাদ্যদ্রব্য পাকের গন্ধে বিশেষতঃ মৎস্য, অণ্ড অথবা বসাক্তমাংসপাকের গন্ধে (আর্স,সিপি) বিবমিষা ও দুর্ব্বলতা; রাত্রি জাগরণের মন্দফল (ককু)।

খাদ্যদ্রব্যে অপ্রবৃত্তি; উহা দেখিলে, অধিকন্তু উহার গন্ধে বিরক্তি.

বায়ুজনিত (gas) উদরের অতিশয় স্ফীততা, বোধহয় যেন উদর ফাটিয়া যাইবে

আমাশয়স্থ উদরে জ্বালা বা বরফের ন্যায় শীতলতা।

শরৎকালের রক্তাতিসার, অন্ত্র হইতে অধিক পরিমাণে সাদা সাদা কুচিকুচি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ নিঃসরণ; সাদা আম; ও অন্ত্রের চাঁচার ন্যায় পদার্থ (ক্যান্থ, কার্ব্ব-এসি) নির্গমন।

মূত্র।—মলিন, শ্যাম, বা বিলুপ্ত মূত্র; সাদা অধঃপতিত পদার্থ সংযুক্ত বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত, রক্তাক্ত, কপিশ, কালীর মত, মূত্র; বিগলিত (putrid) ও বিগলিত (decomposed) রক্তের খণ্ড, এলবুমেন, ও চিনি।

স্পর্শ করিলে ও নাড়িলে চাড়িলে রুগ্ন স্থানে অতিশয় অসহ্যতা।

সন্ধিস্থানে সন্ধি-বাতজনিত বেদনা; সন্ধি-স্থান স্পর্শ করিলে বেদনায় রোগীর চিৎকার।

উপচয় ।—মনে ভাবে বা অবসন্নতায় ; অতিশয় অধ্যয়নে ; খাদ্য দ্রব্য পাকের গন্ধে বৃদ্ধি

উপশম ।—রোগী সম্পূর্ণ সুস্থির হইয়া থাকিলে বমন-প্রবৃত্তির লাঘব ; নড়িলে চড়িলে উহার পুনরুপস্থিতি (ব্রাই) ।

সম্বন্ধ ।—(১) আমবাতিক গ্রন্থি-বাতে (গাউট) সস্তু-রস-ক্ষরণ (Serous effusions) লক্ষণে , উষ্ণকালের আমবাতে ; লাইকোপডিয়ামের সহিত তুলনা হয় । (২) এপিস আর্সেনিক বিফল হইলে এই ঔষধে অনেক সময় শোথ আরোগ্যপ্রাপ্ত হয় ।

কলোফাইলম ।

(Caulophyllum)

গর্ভাবস্থায়, প্রসবাবস্থায়, স্তন্যদানাবস্থায়, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কলোফাইলম বিশেষ উপযোগী

স্ত্রীলোকদিগের বাত, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাত (এক্টিয়া স্পি) ; কয়েক মিনিট পর পর বেদনার স্থান-পরিবর্ত্তন (পলস) ; আক্রান্ত সন্ধির বেদনাযুক্ত স্তব্ধতা (Stillness), আবেশিক (Paroxysmal), আক্ষেপিক, ও সবিরাম বেদনা ।

যৌবনাগমে, ঋতু-প্রকাশ-কালে কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া, অথবা অপস্মার (epilepsy) (এক্টিয়া) ।

প্রদর ।—বিদাহী, অবসাদজনক স্রাব ; উপরের অক্ষিপুটের গুরুত্ব, আঙ্গুল দিয়া উহা তুলিয়া রাখিতে হয় (জেল) ; কপালে মাশিয়া (মেছেতা) (সিপি) । ছোট ছোট বালিকাদিগের প্রদর (ক্যাল্ক) । গর্ভ-ধারণের প্রতিবন্ধকতা জনক প্রদর ।

জরায়ুর দৌর্ব্বল্য বশতঃ অভ্যস্ত গর্ভস্রাব (এলিট্রি ।—গভীর বিষাদ সংযুক্ত নীরক্ততা জনিত গর্ভস্রাব, হেলন) ।

আক্ষেপসংযুক্ত সুদৃঢ় জরায়ু-মুখ, তজ্জন্য প্রসবের বিলম্ব। জরায়ু-গ্রীবার (cervix) সূচী-বেধবৎ বেদনা।

অল্পক্ষণস্থায়ী, অনিয়মিত, আক্ষেপিক প্রসব-বেদনা; প্রসবের প্রারম্ভে কষ্টপ্রদ, নিষ্ফল বেদনা (এক্টি); বেদনায় প্রসব-ক্রিয়া প্রবাহিত হয় না। লক্ষণের সহিত ঐক্য হইলে এই ঔষধে জীবনীশক্তির অসদ্ভাব পরিশোধিত হয় ও ফলপ্রদ প্রসব-বেদনা জন্মে।

দ্রুত প্রসবের পর রক্তস্রাব, পেশী তন্তুর স্থিতিস্থাপকত্বের অসদ্ভাব; গর্ভ-স্রাবের পর অপ্রবল রক্ত-স্রাব (সিকেলি, প্লাম্ব)।

প্রসবান্তিক বেদনা।—অধিক সময় স্থায়ী অবসাদকর প্রসবের পরবর্তী আক্ষেপিক, উদরের নিম্নভাগের আড়াআড়ি; কুচকী পর্যন্ত প্রসারিত; বেদনা (পায়ের নলা পর্যন্ত প্রসারিত, কার্বো ভেজি, কক)।

প্রসবান্তিক স্রাবের দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবস্থিতি; পেশীর অতিশয় দুর্বলতা; শিথিলিত নাড়ী হইতে অনেক দিন পর্যন্ত বিন্দু বিন্দু ক্ষরিয়া স্রবণ (সিকে)।

সম্বন্ধ।—(১) এক্টিয়া, বেল, লিল, পলস, সিকেলি, প্লাস, ভাইবার্ণের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) পলসেটিলার প্রসব বেদনার সহিত সমগুণ, কিন্তু মানসিক অবস্থা বিপরীত। (৩) "মাথিয়া" ও জরায়ুর ক্রিয়া বৈষম্য জনিত প্রতিক্ষিপ্ত (reflex) লক্ষণে, সিপিয়ার সমগুণ।

কলোসিন্থিস।

(Colocynthis.)

উদরে যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা, তজ্জন্য রোগীর অবনত হইয়া দ্বিভাঁজ হইয়া থাকা, তৎসহকারে অস্থিরতা, এবং শান্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আবর্তন; শক্ত প্রচাপনে উপশম (উত্তাপপ্রয়োগে উপশম, ম্যাগ-ফস)।

বেদনা।—আহার বা পানান্তে বেদনার বৃদ্ধি; বেদনা বশতঃ অবনত হইয়া দ্বিভাঁজ হইতে হয় (ম্যাগ-ফস।—অবনত হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে বৃদ্ধি, ডাইওস);

বৈরক্তি (chagrin, ill-humour, অসন্তোষ) বশতঃ রজোবিলোপ, উদর-বেদনা।

অত্যন্ত কোপনতা ও অধীরতা, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে রাগ বা বিরক্তির উদ্রেক।

কোপনতা, হাত হইতে দ্রব্যাদি ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া।

ক্রোধজনিত রোগ,—যথা, উদর বেদনা, বমন, অতিসার ■ রজোলোপ (ক্যাম, ষ্টাফ)।

শিরোঘূর্ণন।—দ্রুতবেগে মস্তকঘুরাইবার সময় বিশেষতঃ বামদিকে, পতনোপক্রম উত্তেজক দ্রব্য সেবনজনিত শিরোঘূর্ণন।

সায়েটিকা—যেন পেঁচদ্বারা আঁটা হইতেছে কুচকীতে এরূপ খালধরা বেদনা; রুগ্নপার্শ্বে শয়ন।

সমগ্র অঙ্গের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত, বাম কুচকীতে, বাম উরুতে, বাম জানুতে, ও জানুর পশ্চাদ্ভাগের গহ্বরে তাড়িতাঘ তবৎ সঞ্চরমান বেদনা।*

উপচয়।—ক্রোধে ও কোপে; অতুষ্টিজনিত বিরক্তিতে (ষ্টাফ, ল ই); এবং (উদর বেদনার) পনির ভোজনে; বৃদ্ধি।

উপশম।—অবনত হইয়া বিভাঁজ হইলে; ও শক্ত প্রচাপনে; উপশম।

সম্বন্ধ।—(১) দক্ষিণ সায়েটিক স্নায়ুর অনুক্রমে (along right sciatic-nerve) দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ-সন্ধি (hip joint) হইতে পা পর্য্যন্ত দারুণ বেদনা; শয়নে, সঞ্চালনে, ও পদ-বিক্ষেপে উহার আতিশয্য; এবং উপবেশনে উপশম; এই সকল লক্ষণে, নেফের সহিত কলোসিন্থের তুলনা হয়। (২) ক্রোধের, ও লুক্কায়িত রোষের অথবা নীরব শোকের মন্দফল জনিত ডিম্বাশয়ের (ovary) রোগে অথবা অন্যান্য রোগে ষ্টাফের সহিত কলোসের তুলনা হয়।

কষ্টিকম।

(Causticum.)

কৃষ্ণ-কেশ, দৃঢ়-দেহ-তন্তু ; দুর্বল, গোরা-দোষগস্ত অতিশয় পীতবর্ণ ও মলিন মুখাকৃতি সংযুক্ত ; এবং শ্বাস-পথ ও মূত্র-পথের পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি-দিগের পক্ষে কষ্টিকম উপযোগী।

কৃষ্ণবর্ণ-চুল ও চক্ষু, এবং সুকুমার, ও অতিশয় অনুভূতি বিশিষ্ট বালকবালিকা ; দন্তোদ্গমকালে ত্বকে ইণ্টারট্রিগো (অহিপুতন) (লাইকো), অথবা টিকাবের (মড়কা) উৎপত্তি (হীপ)।

অবসাদজনক রোগ অথবা দারুণ চিত্ত-বিকার বশতঃ মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুচ্ছের ক্রিয়া বিকার ও তজ্জনিত পক্ষাঘাত।

মস্তক-তল, গল মধ্য, শ্বাস-পথ সরলান্ত্র, মল-দ্বার, মূত্র-মার্গ জরায়ু-দ্বার, ও অস্থায়ুর অবদরণ অথবা স্পর্শ-ক্লেশ (soreness) (দুষ্টবৎ অনুভব, আর্স ; সচক্ষানবৎ অনুভব, রাস্টক্স)

বিষয়ভাব।—নিরাশতা, নিরাশতা ; দুশ্চিন্তা, শোক, ও দুঃখ হইতে উহার উৎপত্তি ; তৎসহ অশ্রুপাত, সর্বসাধারণ কারণে বালক কাঁদিয়া উঠে।

অন্যের দুর্দশায় তীব্র সহানুভূতি।

দীর্ঘকালস্থায়ী শোক ও দুঃখ (ফস-এসি) ; নিদ্রাহীনতা ও রাত্রিজাগরণ (কক্কু. ইগ্নে) ; ভয় ও অন্যান্য আকস্মিক চিত্ত-বিকার (কফি, জেল) ; ক্রোধ বা বিরক্তি ; এবং বিলুপ্ত উদ্ভেদ ; হইতে উৎপন্ন পীড়া।

শিশুদিগের হাঁটিতে শিখিতে বিলম্ব (ক্যাল্ক ফস)।

শিশুদিগের অদৃঢ় বিচরণ ও সহজে পতন।

অনৈচ্ছিক মূত্র।—কাশিতে, হাঁচিতে, ও নাকে ফোঁৎকরিতে অনিচ্ছায় মূত্র-পাত (পাল, স্কুইলা ভিরে)।

কোষ্ঠ-রোধ।—বারম্বার নিষ্ফল মল-প্রবৃত্তি (নক্স), দণ্ডায়মান অবস্থায় মল-ত্যাগে সুবিধা ; অর্শ-বলিদ্বারা মল-নিঃসরণের প্রতিবন্ধকতা ; শক্ত ও চিক্কণ (shining), চর্বির ন্যায় মল ; রাত্রিতে শয্যায় মূত্রত্যাগ সহ শিশু-দিগের কোষ্ঠবদ্ধতা।

কাস — বক্ষঃস্থলে অবদরণ ও স্পার্শ-দ্বেষ সংযুক্ত; সিক্ত ফেলিতে অসমর্থতা, সুতরাং নিষ্ঠীবন-নিগীরণ (swallowing of sputa, (আর্ণ, কালী-কা) ; শীতলজল গিলিলে উপশমপ্রাপ্তি; প্রশ্বাসে উত্থানে, (একম), কুচকুর্দা ... গীতে বেদনা সংযুক্ত, হুপশব্দক কাসের পরে অবশিষ্ট; প্রধানতঃ রাত্রিতে ... ও শ্লেষ্ম নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট; কাস। এক

অবদমন ... (rawness), ও স্বরনাশ সহ স্বরভঙ্গ, প্রাতে উহার (স্বায়ংকালে বৃদ্ধি, কার্বো-ভেজি, ফস)।

রাত্রিতে কোন প্রকার অবস্থানেই স্বচ্ছন্দতা বোধ হয় না অথবা এক স্থানে পরিস্থির হইয়া থাকিতে পারা যায় না (ইউপ, রস)।

সর্ব্বদা নড়িতে চড়িতে হয়, কিন্তু সঞ্চালনে শান্তি জন্মে না।

নাসিকা
nutri

অতিরিক্ত উষ্ণভাবে আবৃত হইতে পারা যায় না, উষ্ণতায় শান্তি ...; মূর্চ্ছাবেশের ন্যায় শক্তির বিলোপ; দুর্ব্বলতা ও কম্পন। পক্ষে;

অগ্নিদাহের ক্ষত-চিহ্নের পুনরায় নূতনত্বপ্রাপ্তি, পুনরায় টাটানি; ... উপঘাতের আবার উন্মুক্তি, রোগীরা বলে যে এই অগ্নি-দাহ অবধি ... কখনও স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করে নাই কালের ... আঘা-

ঋতু।—নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে উপস্থিত; অতিরিক্ত ... হইতে কেবল দিবাভাগে প্রবাহিত; ও শয়নে স্থগিত; ঋতু।

পক্ষাঘাত।— একাঙ্গের; স্বরযন্ত্র জিহ্বা অক্ষিপুট, বদন, শ..., শ্রবণ, ও ...নে; এবং বা মূত্রাশয়ের; সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে; শীতল বাতাস কিংবা ... জনিত; টাইফয়েড বা টাইফস জ্বর অথবা ডিপথিরিয়ার পরবর্ত্তী; ও ...ীর অবস্থা প্রকাশিত; পক্ষাঘাত।

উপরের অক্ষি-পল্লবের পতন; উহা উন্মীলিত রাখিতে পারা যায় না। (জেল, গ্রাফ —ঊর্দ্ধ ও নিম্ন উভয় অক্ষি-পল্লবের-পতন, সিপি)।

অবনমনকর পেশীর (flexor muscles) আকুঞ্চন ও সন্ধিস্থানের ...; স্ফ সংযুক্ত আমবাতিক রোগ; পেশীর অশিথিলতা ও হ্রস্বতা (এম-মি স..., গোয়াক, ন্যাট)। ...ণীভূত

আঁচিল।— বৃহৎ, অসমান, বৃন্তসংযুক্ত; সহজে রক্তস্রাবী, রস-ক্ষরণশীল; ...

শরীরে ব্যাপ্ত ; চক্ষুর পাতা ও মুখমণ্ডলের উপর অবস্থিত, এবং স্ফীত ; ফাটিল।

শীঘ্র কিছুকাল উপশম থাকিয়া তৎপরে উপকারের বিপরীত (সেপিয়া, ৩ন)।

বৃদ্ধি ও উপচয়।—পরিচ্ছন্ন, উত্তম কালে (in clear fine weather); নিদ্রা হইতে উত্থানের প্রারম্ভে (প্রাতে); শীতল বায়ুতে, বিশেষতঃ শীতল বায়ু ; শীতল হইলে, এবং আর্দ্র হইলে অথবা স্নান করিলে ; বৃদ্ধি

হ্রাসে উপশম।—আর্দ্র, সিক্ত কালে (in damp wet weather); ও (গরম) স্থানে ; হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) কার্বো-ভেজি, ও পেট্রোলের সহিত সম্পূরক (complementary) সম্বন্ধ। (২) ক্যাম্ফরের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ। ... পূর্বে ... ক্রম ব্যবহৃত হয় না ; এসিডস ও কফির সহিতও প্রতিকূল ... সাধারণ খাদ্য গিলিয়া ফেলার আবশ্যকতায়, আর্নিকার সহিত ; অ্যাকোনাইট ... আর্স ; ঐ জোন, ব্রাইও, সিপিয়ার সহিত ; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধিতে পরিবর্ধিত বিশেষতঃ কার্বো-ভেজির সহিত ; পুরাতন সংবাদে, সালফারের সহিত ; উপকারী সম্বন্ধ। (৪) সীসঘটিত বিষাক্ততায় (কলোনী জাতিদিগের মুখে আস্বাদনের সীসের সংক্রমণের সম্বন্ধে) ; এবং পাচকতায়, লবণ বা শাক দীর্ঘকালের সম্বন্ধে ; ক্রিয়া বিষদোষ নষ্ট করে (৫) ... পারদ (ক্যাল্ক, ইপে) ক্রিয়ার প্রাধান্য প্রকাশ পায়।

বা বিরক্তি ;

শিশুদিগে

শিশুদিগে

আটোনিক

স্বল্প মাত্রা (৩

কোষ্ঠ-

কার্ব্বলিক এসিড। *

(Carbolic Acid.)

অবস্থায় ... বেদনা ; সহসা আবির্ভাব, অল্পকাল অবস্থিতি, এবং সহসা অন্তর্হিত (বেল, ম্যাগ-ফস)।

নিদ্রা ... ... থাকে ... স্থানে ... ... হয়।

গভীর অবসন্নতা, পতনাবস্থা; গাত্রের পাণ্ডুরতা ও শীতল ঘর্ম-সিক্ততা (ক্যাম্ফ কার্ব্বো-ভেজি ভিরে)।

শারীরিক পরিশ্রমে, এমনকি অধিক হাটিলে ও শরীরের কোন স্থানে, কিন্তু সাধারণতঃ দক্ষিণ কর্ণে স্ফোটকের উৎপত্তি।

মস্তকের সম্মুখভাগের অগ্রে, গুরুত্বসংযুক্ত শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন এক শঙ্খস্থান (temple) হইতে অন্য শঙ্খস্থান পর্য্যন্ত [illegible] একগাছি রবারের ফিতা দৃঢ়রূপে প্রসারিত রহিয়াছে (জেল,গ্লাট, সল)।

অস্থিদাহের [illegible] পরিণতি ও রসানি নিঃসরণ।

নাসিকা, গল-মধ্য, নাসা-রন্ধ্র সরলান্ত্র ও অপত্য-পথ (vagina) [illegible]-পচা) স্রাব নিঃসরণ (এস্কু,l, সোরি, পাইরো)।

যুবক বা যু[illegible]টিনা ও বসন্ত (এম-কা)।

[illegible] দুর্ব্বলীভূত, ভোঁতা) অস্ত্রদ্বারা বিদারিত-ক্ষত; অস্থি অনাবৃত, ও সংশ্লিষ্ট ঔষধ উপর কোমলাংশে অধিক পচনা পড়া (ক্যালেণ্ড)।

পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible] ও তামাক সেবনের স্পৃহা (এসার, কার্ব্বো-ভেজি)।

ম বা কারো গর্ভিণীর, এবং সামুদ্রিক বিবমিষা ও ক্যান্সার রোগের বমন; [illegible] [illegible]ইয়ের ন্যায় সবুজ বর্ণ তরল পদার্থ বমন (পাইরো)।

মারোগে বিল্লীর চাঁচার ন্যায় তরল আম অতি কুন্থনে নিঃসারণ লক্ষণাপন্ন কুইনার (dysentery) (ক্যাপ্ত), পাতলা, অনিচ্ছায়-নির্গত, কৃষ্ণবর্ণ, অগন্ধ বর্ণাক্ত তসার।

অতিরিক্তের দুর্গন্ধ শ্বাস সহকারে কোষ্ঠবদ্ধ (ওপি, সোরি)।

রক্তপ্রভূত, দুর্গন্ধ সবুজবর্ণ প্রদর।

ইতে সম্বন্ধ—অ[illegible] ন[illegible]হে, আর্স ও ক্রিয়েজোটের সহিত; এবং দুর্গন্ধ ও অস্থ্য স্পৃষ্ট ক্ষতে, মেজ, মার্ক, সলফের সহিত, কার্ব্বলিক এসিডের তুলনা হয়

[illegible]নাক্রমে অথবা আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কার্ব্বলিক এসিড সেবন [illegible]লে অথবা কোন প্রকারে শরীরের বাহ্যাংশে লাগিলে জলমিশ্রিত সাইডার [illegible]র প্রয়োগে উহার আভ্যন্তরিক ও বাহিক বিষ-দোষ বিনষ্ট হয়।

কার্ব্বো এনিম্যালিস।

(Carbo Animalis.)

শিরঃপীড়া।—মাথায় যেন বাতাবর্ত্ত (ঘূর্ণীবায়ু) প্রবিষ্ট হইয়াছে এরূপ অনুভব; মাথা যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া উড়াইয়া লইয়া গেল এরূপ অনুভব, রাত্রিতে উঠিয়া বসিয়া মাথা ধরিয়া রাখিতে হয়।

শৈরিক রক্তাধিক্য, নীলগণ্ড, নীল ওষ্ঠ ও অতিশয় দৌর্বল্যবিশিষ্ট পাকশক্তিহীন বয়স্কদিগের রোগ।

রক্ত-সঞ্চালনের ক্ষীণতা, ও শিথিলতা (ইত্যাদি), দৈহিক উত্তাপের অত্যন্ত অনতা; নীল রোগ ((cyanosis)) (এণ্ট-টার্ট, কার্ব্বো-ভেজি)।

গ্রন্থি।—ঘাড়, কক্ষতল, কুচকি, স্তন প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থির স্ফীতি, কঠিনতা, ও ব্যথিতত্ব; ধারাল শস্ত্র-বিদ্ধবৎ, কর্ত্তনবৎ ও জ্বালাবৎ বেদনা (কোনি)।

শুদ্ধ পূযের দূষিত পূযে বা রসানীতে পরিণতি।

উত্তোলনে, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভার উঠাইতে সহজে শরীর মচকিয়া যাওয়া; কিছু উঠাইতে সহজে অতিশয় দুর্ব্বলতার উৎপত্তি, হাঁটিবার সময় পায়ের গোড়ালি ঘুরিয়া যায়।

সন্ধির দুর্ব্বলতা; সামান্য পরিশ্রমে উহা সহজে মচকিয়া যায়।

বিমুক্ত শুষ্ক, শীতল বায়ুতে অপ্রবৃত্তি।

ঋতু প্রকাশের পর ঋতুমতীর এত দুর্ব্বলতা যে কথা বলিতে পারা যায় না (এলাম, কক); কেবল প্রাতঃকালেই ঋতু রক্ত প্রবাহিত হয়।

শ্রবণশক্তির বৈলক্ষণ্য, কোন্ দিক্ হইতে শব্দ আইসে বলিতে পারা যায় না।

ফুসফুস-বেষ্ট প্রদাহ (pleurisy) হইতে আরোগ্য লাভের পর বক্ষে একপ্রকার সূচী-বেধবৎ বেদনা ও বশিষ্টতা (র‍্যান-বল্ব)।

স্রাবঃ, প্রদর, অতিসার সকলই অবসাদকর (আর্স।—সকলই দুর্গন্ধ সোরি)।

উপচয়।—ক্ষৌরি হইবার পরে বৃদ্ধি (ক্ষৌরি হইবার পরে উপশম, ব্রোম); যৎসামান্য স্পর্শে; ও মধ্যরাত্রির পরে; বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—(১) ক্যাপ্‌-ধসের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) ব্যাপ্‌ত, ব্রোম, কার্ব্বো-ভেজি, ফস, সিপি, সলফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (৩) পচা মাছ ও পচা উদ্ভিদ আহারের মন্দফলে কার্ব্বো এনিম্যালিস ফলপ্রদ (কার্ব্বো- ভেজি, সেপা)।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস।

(Carbo Vegetabilis.)

যুবক বা বৃদ্ধদিগের অবসাদজনক রোগের মন্দফলে (সিঙ্ক, ফস, সোরি); এবং দুর্ব্বলীভূত অথবা অবসন্ন জীবনীশক্তি বিশিষ্ট ধাতু-বিকৃত ব্যক্তিদিগের পক্ষে; এই ঔষধ উপযোগী।

পূর্ব্ববর্ত্তী রোগের দৌর্ব্বল্যকর ফলের অবশেষের বিদ্যমানতায়; বাল্যকালের হাম বা কাসের অবশেষ স্বরূপ-শ্বাস রোগে; অপরিমিত মদিরা পানজনিত অগ্নি-মান্দ্যে; দীর্ঘকাল পূর্ব্বের উপঘাতের ফলে; এবং টাইফয়েড জ্বরের ফল হইতে অনারোগ্যে; কার্ব্বো-ভেজি উপযোগী।

কুইনাইনের কুফলে, বিশেষতঃ সবিরাম জ্বরের অবরোধে; পারদ, লবণ, ও লবণাক্ত মাংসের অপব্যবহারে; নষ্ট মৎস্য, মাংস বা বসা সেবনে; এবং অতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়াতে; অসুখ।

রক্তাদি তরল বিধানের অপচয়ের মন্দফল (কষ্ট); শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অসাবস্থা হইতে রক্তপাত (সিঙ্ক, ফস)।

স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা ও চিন্তাশক্তির ধীরতা।

সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রতিদিন নাসিকা হইতে রক্তপাত, পরিশ্রমে উহার বৃদ্ধি; রক্তপাতের পূর্ব্বে ও পরে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর যে কোন দ্বার হইতে রক্তপাত; অসাড়, দুর্ব্বলীভূত

ব্যক্তিদিগের রক্তস্রাব ; দুর্বলীভূত বিধান তন্তু হইতে রক্ত গলিত হয় ; জীবনী শক্তির অবসন্নতা।

পাণ্ডুর, নিমগ্ন, আকুঞ্চিত মুখমণ্ডল ; অত্যন্ত পাণ্ডুর (ফেকাসে), ধূসরাভ পীতবর্ণ, ঈষৎ নীলবর্ণ, শীতল ঘর্ম্মে শীতল, মুখমণ্ডল ; রক্তস্রাবের পর।

দন্তের শিথিলতা, মাড়ী হইতে সহজে রক্তস্রাব

যাহাতে রোগীর অসুখ করে রোগী সেই সকল দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা করে ; পুরাতন মদ্যপায়ীরা হুইস্কি বা ব্রাণ্ডি চায় ; রোগী উদরের চারিদিকের কাপড় ঢিলা করিয়া দিতে চায়

পরিপাক শক্তির দুর্বলত ।–অত্যন্ত সামান্য আহারও সহ্য হয় না ; আমাশয়ে ও অন্ত্রে অতিশয় বাষ্প-সঞ্চয়, শয়নে উহার আতিশয্য ; আহার বা পানান্তে আমাশয় যেন ফাটিয়া পড়িবে এপ্রকার অনুভব ; অতিরিক্ত মদিরাপান, অধিক রাত্রিতে আহার, ও অধিক মসলা যুক্ত আহারের মন্দফল

উদ্গারে অল্পকালস্থায়ী উপশম

শিরামণ্ডলীর রোগের প্রাধান্য (সঙ্গে) ; রক্তে অক্সিজেন সংযোগের লক্ষণ (আর্জ্জ-নাই)।

কৈশিকানাড়ীর (capillary) রক্ত সঞ্চালনের অবসাদ বশতঃ ত্বকের নীলাক্ততা ও হস্তপদের শীতলতা ; জীবনীশক্তির প্রায় অবসন্নতা ; অবিরত পাখার বাতাস পাইবার ইচ্ছা।

স্বরভঙ্গ ।—সন্ধ্যাকালে ; আর্দ্র শৈত্যবায়ুতে ; ও উষ্ণ সিক্তকালে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি ; এবং স্বর-চেষ্টায় উহার বিফলতা (প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, কষ্ট)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শীতলতা বশতঃ নিদ্রা হইতে জাগরণ এবং রাত্রিতে জানুর শীতলতা বশতঃ কষ্ট (এপিস)।

বারংবার, অনিচ্ছায় নিঃসৃত অতিদুর্গন্ধ মল, মলত্যাগের পর জ্বালা , কোমল মলও অনায়াসে পরিত্যক্ত হয় না (এলম)

রোগের চরম অবস্থায় (Last stage) প্রভূত শীতল ঘর্ম্ম, শীতল শ্বাস, শীতল জিহ্বা, ও স্বর লোপ লক্ষণে, এই ঔষধে জীবন রক্ষা পাইতে পারে।

উপচয়।—মাখন, শূকরের মাংস, মসাক্ত খাদ্যদ্রব্য সেবনে; কুইনাইন, সিঙ্কোনা ও পারদ অপব্যবহারে; উচ্চৈঃস্বরে গানে বা পাঠে, এবং উষ্ণ, আর্দ্রকালে।

উপশম।—উদ্গারে; ও পাখার বাতাসে; ভ্রাম।

সম্বন্ধ।—(১) কালি-কার্ব্বের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও অনুভূতির অভাব (ওপি)। (৩) উপেক্ষিত নিউমোনিয়ায় সিপ ও লাইকের সহিত বিশেষতঃ পুরাতন মদ্যপায়ীদিগের রোগে। আলগা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে অসমর্থতা বশতঃ ফুসফুসের পক্ষাঘাতাশঙ্কায়, এণ্ট-টার্টের সহিত তুলনা হয়। (৪) সুব্যবস্থেয় ঔষধ ব্যবহারেও প্রতিক্রিয়া না জন্মিলে স্থায়ী উপকার না দর্শিলে ওপিয়ম ও ভেলের সহিত; (৫) সহজে রক্তস্রাবী ক্ষতে ফসের সহিত; (৬) বসাময় খাদ্য দ্রব্য ও পিষ্টকাদির কুফলে পলসের সহিত; এবং (৭) উগ্র-গন্ধ ঋতু-রক্ত ও স্তনের বিসর্পে (erysipelas) সলফের সহিত; কার্ব্বো ভেজির তুলনা হয়।

কালী কার্ব্বনিকম।

(Kali Carbonicum.)

কৃষ্ণ-কেশ, শিথিল দেহ-তন্তু, মেদ-প্রবণ বৃদ্ধদিগের রোগ, বিশেষতঃ শোথ ও পক্ষাঘাত (এম-কার্ব্ব গ্রাফ)।

শরীরের তরল পদার্থ অথবা জীবনীশক্তির অপচয়ের পরে, বিশেষতঃ নীরক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে (সিঙ্ক, ফস-এসি, ফস, সোরি); এই ঔষধ উপযোগী।

সূচী-বেধন, ও চিড়িকমারা বেদনাসমূহ, বিশ্রামকালে ও আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে, উহার আতিশয্য (বিশ্রামকালে ও ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে হ্রাস, ব্রাই-)।

অন্যের স্পর্শ সহ্য করিতে পারা যায় না। ঈষৎ স্পর্শেই, বিশেষতঃ পদ-স্পর্শে, রোগী চমকিত হইয়া উঠে।

একাকী থাকিতে অতিশয় অপ্রবৃত্তি (আর্স, বিস, লাই—একাকী থাকিতে ইচ্ছা, ইগে, নক্স)।

উপরের অক্ষি-পল্লব (eye-lids) ও ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী স্থানে থলীর ন্যায় স্ফীততা।

রমণান্তে, এবং স্বপ্নে রেতঃপাত গর্ভপাত ও ঘামের পর চক্ষুর দুর্ব্বলতা।

আমাশয়ের স্ফীততা ও অতিশয় অতৃপ্তি ; যেন ফাটিয়া পড়িবে এরূপ অনুভব; অতিশয় আধ্মান, রোগিণী যাহা কিছু পানাহার করে তাহাই যেন বাষ্পে পরিণত হইবে বলিয়া বোধ হয় (আইওড)।

প্রাতে মুখ ধুইবার সময়, নাসিকা হইতে রক্ত-পাত।

কেবল আহার করিবার সময় দাঁত-বেদনা ; দপদপকরা বেদনা ; উষ্ণ বা শীতল কিছু দাঁতে লাগিলে বেদনার আধিক্য

গর্ভ-পাত, প্রসব বা জরায়ু হইতে রক্তস্রাবের পর ; ও আহারকালে; পৃষ্ঠ বেদনা ঘর্ম ও দুর্ব্বলতা ; হাঁটিবার সময় বোধ হয় যেন হাঁটা ছাড়িয়া শয়ন করা আবশ্যক।

কাস।—শুষ্ক, আবেশিক কাস, কাসিতে কাসিতে আঠা আঠা শ্লেষ্মা বা পুয আল্‌গা হয়, উহা গিলিয়া ফেলিতে হয়, গল-রোধ বা ভুক্ত-দ্রব্য বমন বিশিষ্ট আক্ষেপিক কাস ; কাসিবার সময় গল হইতে রক্ত শুদ্ধ, অথবা পুয়ময় খণ্ড সমূহের বিক্ষেপ (ব্যাক্র, চেলি)।

ঋতু হইবার সপ্তাহ পূর্ব্বে অসুখ অনুভব, ঋতুকালে ও ঋতুর পূর্ব্বে পৃষ্ঠ-বেদনা

অপ্রচুর প্রসব-বেদনা, প্রবল পৃষ্ঠ-বেদনা, পৃষ্ঠ প্রচাপিত হইবার ইচ্ছা (কষ্ট)।

উঠিয়া বসিলে অথবা সম্মুখদিকে অবনত হইলে কিংবা আন্দোলিত হইলে উপশম-প্রাপ্ত শ্বাস-রোগ (asthma), রাত্রি ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত আধিক্য

ফুসফুসের ক্ষত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই সোরা-দোষঘ্ন ঔষধ ব্যতীত কদাচিৎ আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।—হানিম্যান।

গিলিতে আয়াস ; গলকোষে (Pharynx) মৎস্য-কণ্টকবিদ্ধের ন্যায় কোনবৎ (Sticking) বেদনা (হিপ, নাই-এসি) ; খাদ্যনলীতে সহজে আহারের প্রবেশ ; গিলিবার সময় পিঠে বেদনা।

কোষ্ঠবদ্ধতা।—বৃহৎ, আয়াসে (difficult) নিঃসারিত, দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উদরে সূচীবেধনবৎ বেদনা সংযুক্ত, মল।

হৃৎপিণ্ড।—মেদাপকৃষ্টতার (fatty degeneration) প্রবণতা (ফস) ; বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড সূতাদ্বারা ঝুলায়মান রহিয়াছে (ল্যাক)।

ঘন ঘন সর্দ্দি-লাগা।

সম্বন্ধ (১) কার্ব্বো ভেজির সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) ব্রাই, লাই, ষ্ট্যাট-মি, নাই-এসি, ষ্টানের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (৩) তরল, ঘড়ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাসে, কালী-সল, ফস, ষ্টানের পরে ইহা ভাল খাটে। (৪) ষ্ট্যাট-মিউ ব্যবহারে ঋতু না হইলে এই ঔষধে ঋতু প্রকাশিত হয়—হানিম্যান।

কালী বাইক্রমিকম।

(Kali Bichromicum.)

প্রতিশ্যায়জনিত, উপদংশজনিত ও গোরা-রোগজনিত রোগ-রোগী স্থূলকায়, লঘু-কেশ ব্যক্তি।

ক্রুপ ও ক্রুপজনিত রোগ প্রবণ স্থূল, সুন্দর, হ্রস্ব-গ্রীব (short necked) বালক বালিকা।

চক্ষু, নাসিকা, মুখ-বিবর, গল-বিবর, বায়ু-নলী-ভুজ, আমাশয়ান্ত্রপথ (gastro-intestinal) এবং জনন ও মূত্র-যন্ত্র-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পীড়া—ক্লেদযুক্ত রজ্জুবৎ শ্লেষ্মাস্রাব, উহার এক অংশের সহিত অন্য অংশ লাগিয়া থাকে, টানিলে দীর্ঘ দড়ির মত লম্বা করিতে পারা যায়। (হাইড্রা, লাইসি)।

গ্রীষ্মকালে সমুৎপন্ন রোগ।

সিক্ত বায়ুতে শান্তি লাভ।

পর্য্যায়ক্রমে আমবাত ও আমাশয়ের উপদ্রব, শরৎকালে এক রোগের ও বসন্তকালে অপর রোগের আবির্ভাব; আমবাত ও আম-রক্তের পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিতি (এব্রো)।

বেদনা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা, অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা সেই সেই স্থান আবৃত করিতে পারা যায় (ইগ্নে); একস্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুতবেগে বেদনার অবস্থিতির পরিবর্ত্তন (কালী সল, ল্যাক-ক্যান, পল্স); সহসা আবির্ভাব ও তিরোভাব (বেল ইগ্নে ম্যাগ-ফস)।

প্রতিদিন একই ঘড়িকায় বায়ু-শূলের উপস্থিতি (চিনি-সল)।

আমাশয়ের রোগ।—বিয়ার নামক মদিরা পানের কুফল; ক্ষুধানাশ (ক্ষুধার বিলুপ্তি; আমাশয়-গহ্বরে গুরুত্ব, অগ্নিমান্দ্য; আহারের অব্যবহিত পরে বমি; রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন; আমাশয়ের গোলাকার ক্ষত (ক্রিয়)।

নাসিকা।—নাসা-মূলে প্রচাপনী বেদনা (কপালে ও নাসা-মূলে ঐ প্রকার বেদনা ষ্টিক্ট।) পোঁটকেরমত শ্লেষ্মাস্রাব, চটচটে, রজ্জুবৎ সবুজ বর্ণ তরল শ্লেষ্মা নিঃসরণ; পরিষ্কার খ্যাঁসী খ্যাঁসী শ্লেষ্মা-নিঃসরণ, শ্লেষ্মাস্রাব রুদ্ধ হইলে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ হইতে কপাল পর্য্যন্ত প্রবল বেদনা।

নাসারন্ধ্র-প্রভেদক অস্থি খণ্ডের (Septum) ক্ষত, ও ঐস্থানে প্রায় অনবরত শক্ত শক্ত শ্লেষ্মার বদ্ধ বদ্ধ খণ্ড নিঃসরণ (এলম, মিশি, ট্টিউক্র)।

ডিপথিরিয়া।—সুদৃঢ়, মুক্তা-সদৃশ, তন্তুময় (fibrinous) নিম্নাভিমুখে স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীতে প্রসারণ-প্রবণ কৃত্রিম ঝিল্লী।

অগ্নিজিহ্বা জলপূর্ণ কোষের ন্যায় দৃষ্ট হয়; উহার অধিক স্ফীততা, কিন্তু অল্প আরক্ততা (রসটক্স)।

ক্রূপ।—প্রবল ঘড় ঘড় শব্দ সংযুক্ত, গলায় আঠা আঠা শ্লেষ্মা দম বন্ধকর গল-রোধজনক, কাসি; কাপড় ছাড়িবারসময় উহার আধিক্য (হিপ)।

কাসি—ভগ্ন ধাতব স্বর (কর্কশ ধাতব স্বরে ২০।) হাঁসিতে আগাগোড়া সূত্রবৎ শ্লেষ্মা অথবা স্থিতিস্থাপক তন্তুময় পদার্থ নিষ্ঠীবন; শ্বাস কষ্ট, শয়নে উহার উপশম (শয়নে আর্জেণ্ট, ফেরম, ল্যাক)।

গল-কোষে উপদংশজ গভীর-খাদক (deep eating) ক্ষত।

শিরঃপীড়া —আক্রমণের পূর্ব্বে অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি অথবা দৃষ্টি-হীনতা (ফেরাম, ন্যাক-ফ্ল)। তজ্জন্য শয়ন করিয়া থাকিবার আবশ্যকতা; আলোক ও শব্দে বিরক্তি; শিরঃপীড়া বর্দ্ধিত হইলে পুনরায় দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা (আইরিস, ষ্টাট, ন্যাক-ফ্ল)

কম্প গ্রীষ্মকালে উহার পরিদৃশ্যমানতা।

মাংসল ব্যক্তিদিগের সম্ভোগ-লিপ্সার অসদ্ভাব

উপচয়।—গ্রীষ্ম ঋতুতে; ও উত্তপ্তকালে; বৃদ্ধি।

উপশম।—শীতকালে চর্ম্ম-লক্ষণের উপশম (এলম ও পেটের বিপরীত)।

সম্বন্ধ।—(১) ক্রুপরোগে ব্রোম, হিপার, ও আইওডের সহিত ইহার তুলনা হয়। (২) ক্যাম্ফ অথবা কার্ব্বল-এসি ব্যবহারে অন্ত্রের চাঁচার ন্যায় পদার্থের নিঃসরণ দূরীকৃত হইলে আম-রক্ত রোগে ইহার ব্যবহার হয়। (৩) ক্রুপ রোগে, আইওডিনের পরে, স্বরভঙ্গসংযুক্ত কাস, দুশ্ছেদ্য কৃত্রিম ঝিল্লী, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা ও শীতলতা লক্ষণে; কালী-বাইক্রম প্রয়োজিত হয়. (৪) নাসিকার অর্ব্বুদ বা পুরাতন প্রতিশ্যায়ে ক্যালকেরিয়ার পরে এই ঔষধ উপযোগী হইয়া থাকে। (৫) প্রতিশ্যায় জনিত রোগে ও চর্ম্ম-রোগে কালীবাইক্রমের পরে এণ্ট-টার্ট ভাল খাটে

কালী-ব্রোমেটম।

(Kali Bromatum.)

স্থূলকায় মেদ-রোগ-প্রবণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী; যুবক অপেক্ষা বালকদিগের প্রতিই ইহার উৎকৃষ্টতর ক্রিয়া দর্শে।

গল-গহবর, স্বরযন্ত্র, মূত্র-মার্গ, প্রভৃতি সমগ্র শরীরের অসুস্থতা-রাহিত্য, আন্দোলিত অনিশ্চিত গতি; বোধ হয় যেন অজ্ঞাতসারে পার্শ্বদিকেই চলিতেছে।

স্নায়বীয়তা, অস্থিরতা; স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারা যায় না, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে অথবা কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিতে হয়; হস্ত ও হস্তাঙ্গুলী সর্ব্বদাই সঞ্চালিত হয়; হস্তদ্বয়ের অস্থিরতা (পদদ্বয়ের অস্থিরতা, জিঙ্ক); হস্তাঙ্গুলীর স্পন্দন।

অদম্য ক্রন্দন ও গভীর বিষাদপূর্ণ ভ্রান্তি অর্থাৎ অবাস্তবিক বিষয়কে বাস্তবিক বোধ করিয়া বিষণ্ণতা।

স্মৃতি-শক্তির ক্ষীণতা; কথা বলিতে ভুল হয়; বিমনস্কতা, কোন কথা বলাইবার পূর্ব্বে সেই কথাটী বলিয়া দিতে হয় (এনাক)।

বিষণ্ণতা, হতোৎসাহিতা, উৎকণ্ঠা, বোধ হয় যেন চিত্ত-ভ্রংশ হইবে।

পেশীর অসামঞ্জস্য (জেল; স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য অথবা গতির জড়তা ও অবশতা।

বিরক্তি ও শোক, সম্পত্তি বা সম্ভ্রমের অপচয়, এবং বিষয় কার্য্য-সংক্রান্ত উপদ্রব বশতঃ অস্থিরতা ও নিদ্রাহীনতা

বালকদিগের রাত্রিকালে ভয় (কালী-ফস); নিদ্রায় দাঁত কড়মড়, চিৎকার, কোঁকো, ও ক্রন্দন করা। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আত্মীয় স্বজনের কথায় শান্তি জন্মে না। স্বপ্ন-সঞ্চরণ (সিলি)।

আক্ষেপ—ভয়, ক্রোধ, বা মনোভাবজনিত কারণে স্নায়বীয়-প্রকৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগের আক্ষেপ; প্রসব-কালে, দন্তোদ্গমকালে, হুপ শব্দ-কাশে, ও ব্রাইট্‌স ডিজিজ নামক রোগে, আক্ষেপ

অপস্মার—আজন্ম উপদংশজ, বা টিউবারকেল জনিত অপস্মার; সাধারণতঃ ঋতুর দুই এক দিবস পূর্ব্বে; ও অমাবস্যার সময় রোগের আবেশ; আক্রমণের পরে শিরঃপীড়া।

মস্তিষ্কের প্রতিক্ষিপ্ত উপদাহ সংযুক্ত শিশু-বিসূচিকা; মস্তিষ্কে রস-স্রাবের পূর্ব্বে; হাইড্রোকেফালয়েডের প্রথমাবস্থায়, প্রযুজ্য।

পূর্ব্বাহ্ণ ৫ টার সময় প্রত্যহ শিশুদিগের উদর-বেদনা (অপরাহ্ণে ৫ টার সময়, কলো, লাই)

গর্ভাবস্থায় স্নায়বীয় কাস ; শুষ্ক, কঠিন, প্রায় অবিরত, গর্ভ-পাতের আশঙ্কা-জনক, কাস (কোনা)।

গদগদ-ভাষণ (তোতলা কথা)। ধীরে ধীরে আয়াসিত শব্দ (বোভ, ষ্ট্রাম)

মুখ-দূষিকা (বয়স-ফোড়া)।—যুবক মাংসল ব্যক্তিদিগের সামান্য, শক্ত, পাটলবর্ণ পীড়কা। মুখমণ্ডলে বক্ষস্থলে, ও স্কন্ধদ্বয়ে নীললোহিত, পচ্যমান (যাহা পাকে) পীড়ক ; উহার কুৎসিত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে (কার্ব্বো-এন)।

সম্বন্ধ।—(১) সীসজনিত বিষাক্ততার অন্যতম বিষয় ঔষধ। (২) মুখ-দূষিকায় ইউজিনিয়া জ্যাম্বোসের পরে এই ঔষধ প্রায়ই আরোগ্যকর।

কুপ্রাম মেটেলিকম।

Cuprum metallicum)

আক্ষেপ ও থল্লী ; পুঞ্জে পুঞ্জে ও নির্দ্ধারিত সময়ে রোগ-লক্ষণের আবির্ভাব

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম এবং নিদ্রাহীনতা (কক, নক্স) বশতঃ মানসিক ও শারীরিক অবসাদ ; অজের উৎকণ্ঠার আক্রমণ।

লালাস্রাব সহকারে মুখে তীব্র, ঈষৎ মিষ্ট ধাতব তাবাটে (তাম্রবৎ) আস্বাদ (রসটক্স)।

সর্পের ন্যায় অবিরত জিহ্বা বাহির করা ও ভিতরে নেওয়া (ল্যাক)।

পান করিবার সময় তরল পদার্থ গলগল শব্দে নামা (আর্স, থুজা)।

উদরে ও জঙ্ঘার পশ্চাদ্ভাগে (পায়ের ডিমে) থল্লীসহ ওলাউঠা

উদ্ভেদ-বিলোপের অর্থাৎ বসিয়া যাওয়ার মন্দফল (বাহির না হওয়ার মন্দ ফল, জিঙ্ক), ও তজ্জন্য মস্তিষ্কের পীড়া, আক্ষেপ, টঙ্কার, বমন, পায়ের ঘর্ম্মের বিলোপের মন্দফল (সিলি, জিঙ্ক)।

নীলবর্ণ মুখমণ্ডল ও আকুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠ সহ টঙ্কার (দড়কা)।

শরীর-শাখায় খলী (cramps), করতলে, পদতলে, জঙ্ঘা পশ্চাতে খল্লী, তৎসহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অতিশয় শ্রান্তি।

ঘনঘন পেশীর সঙ্কোচন ■ প্রসারণ বিশিষ্ট আক্ষেপ, হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলীতে উহার আরম্ভ, সমগ্র শরীরোপরি সংপ্রসারণ ; গর্ভাবস্থায় আক্ষেপ ; প্রসবান্তে আক্ষেপ (দড়কা) ভয় বা বিরক্তির পরবর্ত্তী আক্ষেপ ; অন্ত্র যন্ত্রের রোগের মস্তিষ্কের স্থান বিকল্প বশতঃ আক্ষেপ (জিঙ্ক)।

জিহ্বার পক্ষাঘাত ; অসম্পূর্ণ, তোতলা কথা।

অপস্মার।—জানু হইতে "অরা" অর্থাৎ এক প্রকার 'সর্‌সরেপ্প' আরম্ভ ■ উপরে উত্থিতি ; রাত্রিতে নিদ্রাকালে বৃদ্ধি (বিউফো) ; অমাবস্যার সময় ; নির্দ্ধারিত ব বধান সময়ের পরে অর্থাৎ ঋতুকালে ; পতন বা মস্তকে আঘাত প্রাপ্তি হইতে, ও জলে ভিজাতে ; রোগের আবেশের উপস্থিতি।

বোতল হইতে জল ঢালিবার শব্দের ন্যায় কাসের গল্‌গল্‌ শব্দ।

শীতল জল পানে কাসের উপশম (কষ্ট। শীতল জল পানে বৃদ্ধি, স্পঞ্জ)।

হুপিশক্স-কাস।—অনেকক্ষণস্থায়ী, শ্বাস-রোধকর, আক্ষেপিক কাস ; কথা বলিতে অশক্তি, শ্বাস-শূন্যতা (বেদম হইয়া পড়া), নীলবর্ণ মুখমণ্ডল, শরীরের-দৃঢ়তা ও স্তব্ধতা ; ক্রমান্বয়ে তিন আবেশ (ষ্টান) ; চৈতন্য লাভের পর অত্যন্ত ভুক্তদ্রব্য বমন (ক্যান) ; প্রত্যেক আবেশের সহিত ক্যাটালেপ্সি সদৃশ আক্ষেপ

জঙ্ঘার পশ্চাদ্ভাগে ও পদতলে উগ্র, যাতনাপ্রদ আক্ষেপিক বেদনার গতি।

উপচয়।- শীতল বায়ু ; শীতল বাতাস (wind) ; রাত্রিকাল ; পদের ঘর্ম্ম বা উদ্ভেদের বিলোপ ; বশতঃ বৃদ্ধি

উপশম।—একঢোক ঠাণ্ডা জল গিলিলে বিবমিষা, বমন, ও কাসের হ্রাস

সম্বন্ধ।—(১) ক্যালকেরিয়ার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) ওলাউঠায়, আর্সেনিক ও ভিরেট্রমের সহিত তুলনা হয়, ইপিকাক কুপ্রমের উদ্ভিদ সমগুণ। (৩) হুপিশক্স-কাসে ও ওলাউঠায় কুপ্রমের পরে ভিরেট্রম ; এবং উদ্ভেদ-বিলোপজনিত আক্ষেপে এপিস ও জিঙ্ক, ভালখাটে

কোকা।

(Coca)

কার্য্যশীল জীবনে অতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বশতঃ শরীরের ক্ষয়প্রাপ্তি ; এবং স্নায়ু ও মস্তিষ্কের অবসন্নতা নিবন্ধন পীড়া (ফ্লোর-এসি)।

স্নায়বীয় অবসন্নতা জনিত বিষাদ সলজ্জতা, ভীরুতা, লোক-সংসর্গে অস্বচ্ছন্দতা

বিষণ্ণতা, কোপনতা, নির্জ্জনতায় ও গুপ্ততায় আনন্দ

মদিরা ও তাম্রকুট সেবনের স্পৃহা ; অন্যান্য উত্তেজক পদার্থ সেবনের আকাঙ্ক্ষা

ব্যায়াম-ক্রীড়ায় নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের, বৃদ্ধদিগের ; এবং অধিক পরিমাণে হুইস্কি মদিরা ও তাম্রকুট সেবিদিগের ; শ্বাস-হ্রস্বতা।

বক্ষঃস্থলের গৌরব (oppression, heaviness) ও শ্বাস-কৃচ্ছ্র সহকারে ফুসফুস হইতে রক্তপাত

নিদ্রাতুরতা, অথচ কোথাও আরাম পাওয়া যায় না।

বাতাধ্মান জন্য (আর্জ্জ-না, নক্স) ; অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃ ; এবং হৃৎপিণ্ডের অতিক্রিয়া হইতে (আর্ণ, বোরা, কষ্ট) ; প্রবল হৃৎকম্প।

পর্ব্বত বা ব্যোমযান আরোহণের মন্দফল (আর্স) ; উত্তেজক দ্রব্য, মদিরা, ও তামাক সেবনের কুফল।

এই ঔষধে দাঁতের কেরিজ নিবারিত হয়

সম্বন্ধ।—(১) রোগীর আলোক ও লোক-সংসর্গের ইচ্ছায়, ষ্ট্রামো ; এবং অন্ধকার ও নির্জ্জনতায় আকাঙ্ক্ষায়, কোকা ; ব্যবহৃত হয়। (২) তামাকের বিষঘ্ন স্বরূপ প্রথমে কোকার ব্যবহার হইয়াছিল

কোনায়ম ম্যাকিউলেটম।

(Conium maculatum)

রজোনিবৃত্তি-কালে ও রজোনিবৃত্তির পরে বৃদ্ধা কুমারী ও স্ত্রীদিগের রোগে এই ঔষধ পরমোপকারী।

বৃদ্ধ পুরুষ; বৃদ্ধা কুমারী; বৃদ্ধ কুমার; দৃঢ় পেশী-তন্তুবিশিষ্ট, সহজে উত্তেজনা-শীল লঘু-কেশ ব্যক্তি, শারীরিক পরিশ্রম পরিশূন্য বলবান ব্যক্তি; এই সকল রোগীদিগের রোগে কোনায়ম বিশেষ উপযোগী।

বৃদ্ধদিগের দুর্ব্বলতা; আঘাত বা পতনজনিত রোগ; বিবর্দ্ধিত গ্রন্থিবিশিষ্ট, ক্যান্সার ও স্ক্রুফুলাগ্রস্ত; দৃঢ়-তন্তু; ব্যক্তিদিগের রোগ।

কার্য্য বা অধ্যয়নে প্রবৃত্তি-বিশূন্য; অলস, উদাসীন, সকল বিষয়েই অমনো-যোগী ব্যক্তি।

স্মৃতি-শক্তির দুর্ব্বলতা, মানসিক চেষ্টা সহ্য করিতে অসামর্থ্য।

উগ্রস্বভাব; সহজে বিরক্ত, প্রভুত্বপ্রিয়, বিবাদী, তর্জ্জনকারী প্রতিবাদে অসহিষ্ণু (অর) ব্যক্তি; যে কোন প্রকার উত্তেজনায় মানসিক অবসাদের উৎপত্তি।

একাকী থাকিতে ভয়, অথচ লোক-সংসর্গ পরিত্যাগ (কালী কা, লাই)।

প্রস্তরবৎ দৃঢ়তা; দুষ্টব্রণ ও উপঘাতের পর; কর্কট রোগ-প্রবণ ব্যক্তি-দিগের স্তনের বা অণ্ডের দৃঢ়তা।

ঋতুকালে ও ঋতুকালের পূর্ব্বে স্তনের স্পর্শ-দ্বেষ কঠিনতা ও ব্যথিতত্তা, (ল্যাক-ক্যান, কালী-কা)।

শিরোঘূর্ণন—বিশেষতঃ, শয়ন সময়ে ও শয্যায় পাশ ফিরি-বারসময়ে; যৎসামান্যরূপে মস্তক-সঞ্চালনে, অথবা চক্ষু সঞ্চালনে; মাথা ঘোরে। মস্তক সম্পূর্ণ সুস্থির রাখা আবশ্যক হয়; বামদিকে মাথা ফিরাইলে (কলো); বৃদ্ধদিগের; এবং ডিম্বাশয়েরও গর্ভাশয়ের পীড়ার সহিত সংসৃষ্ট; শিরোঘূর্ণন।

কাস; স্বরযন্ত্রে শুষ্ক স্থান জন্য উৎপন্ন, থাকিয়া থাকিয়া কাসের আক্ষেপিক আবেশ (spasmodic paroxysm); বক্ষঃস্থলে ও গলার অভ্যন্তরে কণ্ডূয়ন

(আইওড) ; রাত্রিতে, শয়ন-সময়ে ও গর্ভাবস্থায়, আধিক্য (কষ্ট,কালী-বাই) ।

মূত্র-ত্যাগে অতিশয় কষ্ট । মূত্র-প্রবাহের সবিরামতা ; মূত্র একবার থামে আবার পড়ে ; মূত্রাশয়ের মুখশায়ীগ্রন্থির অথবা গর্ভাশয়ের পীড়া ।

ঋতু —ক্ষীণ, বিলুপ্ত, নিয়মিত সময়ের অনেক পরে, অত্যল্প পরিমাণে নিঃসৃত, অল্পকাল স্থায়ী ; গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত বর্ণ উদ্ভেদ ও ঋতুপ্রবাহিত হইলে উহার বিলোপ (ডল) লক্ষণাপন্ন । সর্দি লাগিলে স্থগিত , শীতল জলে হাত রাখিলে অবরুদ্ধ (ল্যাক-ডি) , রজঃ

প্রদর ।—ঋতুর দশদিন পরে প্রদর-স্রাব (বোরা, বোভি) ; বিদাহী রক্তোক্ত ; দুগ্ধাকার ; প্রভূত ; গাঢ় ; সবিরাম , স্রাব ।

মন্দফল —সংযত সঙ্গম-প্রবৃত্তির, অথবা বিলুপ্ত ঋতুর মন্দফল ; কাম প্রবৃত্তির অপরিতৃপ্তি, অথবা অতি-পরিতৃপ্তির মন্দফল ।

চক্ষুর প্রদাহ ব্যতীতও আলোকে বিতৃষ্ণা ; কৃত্রিম আলোকে চক্ষুর ব্যবহারে উহার আতিশয্য ; রাত্রিতে পড়িবার জন্য ছাত্রদিগের ঔষধ ; তীব্র আলোকাতঙ্ক (সোরি) ।

দিবারাত্রি ঘর্ম, নিদ্রা আসিবামাত্র, অথবা চক্ষুরুদ্ধ করিবামাত্র ঘর্ম (সিঙ্ক) ।

উপচয় ।—রাত্রিতে, শয়নে ; শয্যায় পাশ ফিরিলে বা উঠিয়া বসিলে ; ও কৌমার্য্যে ; বৃদ্ধি ।

উপশম ।—(১) যে সকল রোগীদিগের পক্ষে কোনায়ম উপযোগী সুরা বা উত্তেজক পদার্থ সেবনে রোগকালে তাহাদের উপকার দর্শে, কিন্তু সুস্থাবস্থায় কোনায়মের রোগীদিগের মদিরা সহ্য হয়না। (২) ঘৃষ্টব্রণে, আর্নিকা, ও রসটক্সের সহিত , ক্যান্সার রোগে, আর্স, ও এষ্টারের সহিত ; গ্রন্থির স্ফীততায়, ক্যাল্ক, ও সোরির সহিত , কোনায়মের তুলনা হয়। (৩) স্তনের অর্ব্বুদে (tumour) দূষিততার আশঙ্কায় কোনায়মের পরে সোরিণম ভাল খাটে।

কোলিনসোনিয়া ।

(Collinsonia)

বস্তি-গহ্বরে (pelvis) ও যকৃতের শিরায় রক্ত সঞ্চয় জনিত মলাঃকৃচ্ছ্র ও অর্শ।

অর্শসহ বস্তি-গহ্বরের মধ্যে রক্ত সঞ্চয়, বিশেষতঃ গর্ভের শেষ কয়েক মাসে।

হৃদ্রোগজনিত শোথ।

অর্শ ও অগ্নি-মান্দ্যগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের হৃৎকম্প ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার প্রতিনিয়ত দ্রুততা অথচ দুর্ব্বলতা।

পুরাতন যাতনাসংযুক্ত, রক্তস্রাবী অর্শ ; সরলান্ত্রে যেন কাষ্ঠ-খণ্ড; বালুক অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর রহিয়াছে এরূপ অনুভব (ইস্কিউ)

অর্শজনিত সকুন্থন রক্তাতিসার।

পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠ-রোধ ও অতিসার ; রক্তসঞ্চয় জনিত নিম্নান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা ; ধীরে ধীরে নির্গত কঠিন মল, তৎসহ বেদনা ও অতিশয় আধ্মান (flatulence)।

গর্ভাবস্থায় অর্শসহকারে জননেন্দ্রিয়েরকণ্ডূয়ন, শয়ন করিতে অসামর্থ্য

উপচয়।—যৎসামান্য মনোভাবে বা মানসিক উত্তেজনায় রোগলক্ষণের বৃদ্ধি (আর্জ্জ-না)।

সম্বন্ধ।—(১) অর্শসংসৃষ্ট হৃদ্রোগে ক্যাক্ট, ডিজি, ও অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলে কোলিনসোনিয়া ব্যবস্থেয় হয় কিনা দেখা উচিত (২) কলো ও নক্স বিফল হইলে কোলিন উদর-বেদনা (colic) আরোগ্য করিয়াছে। (৩) কোলিনের সহিত, ইস্কিউ, এলো, ক্যাপ, নক্স, ও সলফের তুলনা হয়।

ক্যাক্টস গ্রাণ্ডিফ্লোরাস ।

(Cactus Grandiflorus.)

রক্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের রক্ত সঞ্চয় (একন) অনেক সময় সেই রক্ত-সঞ্চয় হইতে রক্তস্রাব, রক্ত-জনিত সন্ন্যাস

মৃত্যু-ভয়। রোগ দুরারোগ্য বলিয়া রোগীর বিশ্বাস (আর্স)।

নাসিকা, ফুসফুস, আমাশয়, সরলান্ত্র ও মূত্রাশয় হইতে রক্তস্রাব (ক্রোট, মিলি, ফস)।

মস্তকের মধ্যস্থানে গুরুভার প্রচাপনের ন্যায় শিরঃপীড়া (প্রচাপনে উপশম, মেলি); রজোনিবৃত্তি-কালের শিরোবেদনা (গ্লন, ল্যাক)।

রক্ত-সঞ্চয় জনিত ও নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত; দক্ষিণ পার্শ্বের শিরঃপীড়া ও স্নায়ু-শূল ; তীব্র দপদপকর, ও স্পন্দনকর বেদনা।

সমগ্র দেহ পিঞ্জর-বদ্ধবৎ বোধ হয়, পিঞ্জরের প্রত্যেকটী তার যেন কষিয়া কষিয়া মোচড়ান হয়।

গল-মধ্য, বক্ষঃস্থল, হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয়, সরলান্ত্র, গর্ভাশয়, ও যোনির আকুঞ্চন ; সাধারণতঃ যৎসামান্য সংস্পর্শে উহার উৎপত্তি বা উদ্রেক।

গুরুভারজনিত চাপের ন্যায় বক্ষঃস্থলে চাপানুভব ; বোধ হয় যেন লোহার ফিতার বন্ধনে উহার স্বাভাবিক সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশের চারিদিকে যেন দৃঢ়রূপে এক গাছি রজ্জু বদ্ধ রহিয়াছে এরূপ অনুভব, ডায়াফ্রামের সুস্পষ্ট আবদ্ধতা

লৌহ নির্ম্মিত হস্তে যেন হৃৎপিণ্ড শীঘ্র শীঘ্র একবার ধৃত একবার বিমুক্ত হইতেছে এপ্রকার অনুভব; স্পন্দনের স্থানাভাব এরূপ আবদ্ধতা অনুভব।

সকল স্থানেই বেদনা ; তাড়িত শৃঙ্খলের ন্যায় উৎক্ষেপণ ও উল্লম্ফন এবং সুতীব্র আকুঞ্চনে পরিসমাপ্তি, তৎপরে পুনরায় উপস্থিতি।

শয়ন-কালে রক্ত-প্রবাহের বিরতি (বোভি, কষ্টি)।

হৃৎকম্প।— দিনরাত্রি; হাঁটিবার সময় ও বামপার্শ্বে শয়নে (ল্যাক); এবং ঋতু-কালের নৈকট্যে ; বৃদ্ধি।

পূর্ব্বাহ্ন ১১টা ও অপরাহ্ন ১১টার সময় জ্বরের আবেশের প্রত্যাবৃত্তি।

সম্বন্ধ।— একন, ডিজি , জেল, ক্যালমিয়া, ল্যাক, ট্যাবের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

ক্যানেবিস ইণ্ডিকা।

(Cannabis Indica)

অতিশয় বিস্মৃতি ; শেষ কথা ও ভাব স্মরণ থাকেনা ; কোন বাক্য আরম্ভ করিয়া যাহা বলিতে হইবে তাহা মনে থাকেনা; মস্তিষ্কে অন্যান্য চিন্তা সমবেত হওয়াতে কোন চিন্তা বা ঘটনা পুনঃস্মরণ করিতে পারা যায় না (এনাক, ল্যাক-কা)।

অবিরত অনুমিতি (Constantly theorizing)

প্রতি সামান্য কথায় অপরিমিত হাস্য।

কৌতুক ও অপকার করা, অনন্তর বিলাপ ও ক্রন্দন করা।

মৃত্যু সমীপবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া অতিশয় আশঙ্কা।

মদাত্যয় (delirium tremens); অত্যন্ত বাচালতা; সময় ও স্থান অত্যন্ত বাড়াইয়া বলা।

সময় অতিশয় দীর্ঘ বোধ হয় (আর্জ্জনা); এক বিপল একযুগের ন্যায় অনুভূত হয়

স্থান অতিশয় দীর্ঘ বোধ হয়; কতিপয় হস্ত কতিপয় ক্রোশের ন্যায় বোধ হয়

করোটী যেন উন্মুক্ত ও অবরুদ্ধ হইতেছে এপ্রকার অনুভব (এষ্টিয়া)

মূলাধারে (perineum) অথবা মলদ্বারের নিকটে কোন গোলার উপরে উপবেশনের ন্যায় স্ফীততা অনুভব (তৎসহকারে মূত্রে অধিক পরিমাণে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মার অবস্থিতি, সিপ্ক)।

সম্বন্ধ। — বেল, হাইও, ষ্ট্রামোর সহিত তুলনা করা যয়।

ক্যানেবিস স্যাটাইভা।

(Cannabis Sativa.)

শরীরের কোন কোন স্থানের উপর অথবা কোন কোন স্থান হইতে, যথা মস্তকের উপর, এবং মলদ্বার, আমাশয় ও হৃৎপিণ্ড হইতে যেন বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে, এরূপ অনুভব।

দুর্দ্দম্য কোষ্ঠ-রোধ, তজ্জন্য মূত্র-রোধ, মলদ্বারের আকুঞ্চন।

মর্চাকিয়া খাওয়ার পর হাতের আঙ্গুলের সঙ্কোচন।

সিঁড়ির উপরে উঠিতে কলকাশির (Pulella) বিচ্যুতি।

শ্বাস কৃচ্ছ্র, বা শ্বাস-কাস রোগে রোগীর কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, শ্বাস-ক্রিয়ায় সামর্থ্য।

গিলিতে গলায় বাধা খাদ্য দ্রব্যের নিম্নপথে গতি (এমাক)

প্রমেহ রোগের তরুণ, প্রদাহিত অবস্থা (দ্বিতীয় অবস্থায়, মূত্রত্যাগান্তে জ্বালা গাঢ়, পীতবর্ণ পূযবৎ স্রাব লক্ষণে, কিউবেব)।

স্পর্শে বা প্রচাপনে মূত্র-মার্গের অতিশয় অনুভবাধিক্য ; অত্যাধিক না ছড়াইয়া হাটিতে পারা যায় না, উহাতে মূত্র মার্গে আঘাত লাগে।

মূত্র ত্যাগ-কালে জ্বালাকর ও দংশনকর, এবং পশ্চাদ্ভাগে অধিকতর ভেদনবৎ বেদনায় মূত্রমার্গের মুখ হইতে পশ্চাদ্দিকে প্রসারণ।

মূত্রমার্গে বরাবর কুটিল গতিতে ছেদনবৎ বেদনা

সম্বন্ধ। মূত্রমার্গের বিশেষ প্রদাহের অপ্রবর্দ্ধিত অবস্থায় ক্যান্থ, ক্যাপ্স, জেল, পেট্রোসের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

ক্যান্থেরাইডিস।

(Cantharides)

সকল অঙ্গের অভ্যন্তরের ও বাহিরের অতিরিক্ত অনুভূতি।

বেদনা ; শরীরের সর্ব্বাংশেই জ্বালা, অবদরণ ও টাটানি ; তৎসহ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

নাসিকা, মুখ-বিবর, অন্ত্র, জনন-যন্ত্র ও মূত্র-যন্ত্র হইতে রক্ত-স্রাব

প্রত্যেক বস্তুতেই বিরক্তি ; পান, আহার, ও তামাকে অপ্রবৃত্তি।

অল্পমাত্র জলপান করিলেও মূত্রাশয়ের বেদনার বৃদ্ধি।

অবিরত মূত্র-বেগ, এক এক বার কয়েক বিন্দু মাত্র রক্তমিশ্রিত মূত্র নিঃসরণ (সহসা মূত্র-প্রবৃত্তি ও মূত্র-মার্গে তীব্র কণ্ডূয়ন, পেট্রোস)।

মূত্র-ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে এবং মূত্র-ত্যাগ-কালে অসহ্য মূত্র-বেগ; মূত্রাশয়ের প্রবল বেদনা।

মূত্র-ত্যাগ-কালে মূত্র-মার্গে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, প্রবল কুন্থন ও মূত্র-কৃচ্ছ্র।

মল —শুভ্র বা পাণ্ডুবর্ণ, আরক্ত, শ্লেষ্মা, রক্তের রেখা মিশ্রিত, অন্ত্রের চাঁচার ন্যায় পদার্থ বিশিষ্ট মল।

স্বপ্নে রক্তাক্ত শুক্রপাত (লেড, মার্ক, পেট্রো)

সম্ভোগ-লিপ্সা।—স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সঙ্গম-প্রবৃত্তির আতিশয্য; উহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত; অত্যন্ত বেদনাসহকারে উপস্থের প্রচণ্ড উত্থিতি (পিক-এসি)

বায়ু-পথে (aix passuges) শ্লেষ্মা-স্রাব (বোভি, কালী-বাই)।

ত্বক —ফোস্কাসংযুক্ত বিসর্প (oıysi|olus), সকল শরীরে ফোস্কা এবং উহাতে যাতনা ও পূযোৎপত্তি।

রৌদ্র লাগাতে এরিথিমা (অরণিকা)

সকল প্রকার প্রাদাহিক রোগে জ্বালাকর বেদনা ও অসহ্য মূত্র-বেগ, ক্যান্থেরিসের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

সম্বন্ধ।—এপিস, আর্স, ইকুই, মার্কের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

অগ্নি দাহে ফোস্কা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ও ফোস্কা উৎপন্ন হইলে ক্যান্থেরিস ব্যবহার্য্য যদি চর্ম্ম ছিন্ন না হইয়া থাকে তবে যে কোন ক্রমের ঔষধ এলকোহলে মিশ্রিত করিয়া দ্রব প্রস্তুত করিয়া লাগাইয়াদিয়া তুলাদিয়া ঢাকিয়া রাখিলে সত্বর বেদনার শান্তি জন্মে এবং অনেক সময় ফোস্কা পড়েনা চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া থাকিলে সুসিদ্ধ বা চোয়ানজলে দ্রব প্রস্তুত করিয়া লাগান উচিত উভয় স্থলেই সঙ্গে [illegible] শক্তীকৃত ঔষধ (৩x) আভ্যন্তরিক সেবন করা বিহিত।

ক্যাপ্সিকম।

(Capsicum)

পাতলা চুল, নীলবর্ণ চক্ষু, হৃষ্টপুষ্ট রক্ত-প্রধান অথচ স্নায়বীয় ব্যক্তি।

শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতু প্রতিক্রিয়োৎপাদন শক্তির অভাব (Lack of reactiveforce) বিশেষতঃ স্থূলকায়, সহজে শ্রান্ত ব্যক্তিদিগের; অলস প্রকৃতি, কোনপ্রকার পরিশ্রমেই প্রবৃত্তি জন্মেনা; পরিহাসপ্রিয়তা, অথচ সামান্য বিষয়েই ক্রোধের উদ্রেক।

. শিশুরা ,অনাবৃত বায়ুতে যাইতে চায়না; সর্ব্বদাই শীতশীত অনুভব করে; অবিমৃষ্যকারিতা দেখায়, আনাড়ি, মোটা, ময়লা, শিশু, কাজ বা চিন্তা করিতে অপ্রবৃত্তি

একাকী থাকিতে ইচ্ছা; শুইয়া নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা। আরক্ত গণ্ড, ও নিদ্রাহীনতাসহ অলস ও বিমর্ষ স্বভাব ব্যক্তিদিগের গৃহ-রোগ (home-sickness)

গল-কোষ (fauces); গল-মধ্য; নাস-রন্ধ্র বক্ষঃস্থল; মূত্রাশয়; মূত্রমার্গ; ও সরলান্ত্রের আকুঞ্চন।

গলার মধ্যে ও শরীরের অন্যান্য অংশে, উত্তাপে অনুপশমিত, লঙ্কামরীচের ঝালের ন্যায় জ্বালা ও যাতনা অনুভব।

জ্বালা, যাতনা; অতিশয় স্পর্শদ্বেষ; জ্বালা সংযুক্ত গলার আকুঞ্চন; প্রদাহিত,মলিন- আরক্ত ও স্ফীত তালুমূল বিশিষ্ট তালুমূল-প্রদাহ (tonsillitis)।

গলাধঃকরণ-ক্রিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে (ইহে) অংশাকর আক্ষেপিক আকুঞ্চন ও অন্যান্য বেদনার আধিক্য।

কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে বেদনাবিশিষ্ট স্ফীততা, উহাতে অত্যন্ত স্পর্শ-দ্বেষ।

প্রত্যেকবার মল-ত্যাগের পর পিপাসা ও প্রতিবার জল-পানের পর কম্পন।

জ্বরে প্রত্যেকবার শীতে পিপাসা, এবং প্রত্যেকবার জলপানে কম্পন।

যতই শরীরের শীতলতা বৃদ্ধি পায় ততই মেজাজ খারাপ হয়।

স্নায়বীয় আক্ষেপিক কাস; সহসা কাসের আবেগের উপস্থিতি; কাসিবার সময় মাথা যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া ছুটিয়া যাইবে এরূপ অনুভব।

অন্য সময়ে নয়, কিন্তু মলদ্বার হইতে ক্ষণকাল বাহির হইবার সময় মুখ হইতে কটু, দুর্গন্ধ, একেবারে কতকটা বায়ু নিঃসরণ।

কাশিলে (মূত্রাশয়, আঙ্গুল, জঙ্ঘা, কর্ণ প্রভৃতি) দূরবর্ত্তী স্থানে বেদনা।

সম্বন্ধ।—(১) এপিস, বেল, ব্রাই, ক্যান্থারিস, চেলিডোন সহিত ক্যাপ্সের তুলনা হয়। (২) সবিরাম জ্বরে ক্যাপ্সের পরে সিনা ভাল খাটে। (৩) আকুঞ্চনকর, জ্বালাকর, ও টাটানে বেদনা দ্বারা এপিস ও বেলেডোনা হইতে ক্যাপ্সিকমের প্রভেদ হয়।

ক্যামোমিলা।

(Chamomilla)

পাতলা-কপিশ কেশ, স্নায়বীয়, ও উত্তেজনশীল প্রকৃতির ব্যক্তি, বিশেষতঃ বালক-বালিকা; এবং কাফি বা মাদক সেবন বা উহার অপব্যবহার বশতঃ অতিরিক্ত অনুভূতিবিশিষ্ট ব্যক্তি।

নবজাত, ও দন্তোদ্গমকালীয় শিশু

ক্ষণরাগী, কোপন, যাতনায় অসহিষ্ণু (কফি); অশিষ্ট, শিষ্ট উত্তর দানে অসমর্থ, ব্যক্তি।

শিশুর অতিশয় কোপনতা, ও বিরক্তিপূর্ণতা; কেবল কোলে করিয়া বেড়াইলে প্রশান্ততা; অধীরতা, এদ্রব্য সেদ্রব্য চাওয়া, না দিলে রাগকরা, অথবা দিলে বিরক্তচিত্তে গ্রহণ না করা (ব্রাই, সিনা, ক্রিয়ো); ক্ষণরাগিতা, পরদ্রোহিতা (spiteful)।

শিশু যাহা চায় তাহা না পাইলে সকরুণ বিলাপ; গুণ্ গুণ্ করিয়া ক্রন্দন ও অস্থিরতা।

রোগী কাহাকেও কাছে থাকা সহ্য করিতে পারে না, বিরক্তচিত্ততা বশতঃ কাহারও কথা তাহার সহ্য হয় না (সিপি); সে কথা বলিতে ভালবাসেনা, অভদ্রভাবে উত্তর দেয়।

ক্রোধজনিত অসুখ, বিশেষতঃ শীত ও জ্বর।

বেদনা।—বেদনা অসহ্য বোধ হয়, ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে ; উত্তাপে বৃদ্ধিপায় ; দুইপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে সায়ংকালে বাড়ে ; বেদনার সহিত উত্তাপ, পিপাসা, ও মূর্চ্ছা থাকে ; আক্রান্ত স্থানে অবশতা অনুভূত হয় ; উত্তাপে উপচয় জন্মে।

এক গালের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা, অন্য গালের পাণ্ডুরতা ও শীতলতা।

বিমুক্ত বায়ুতে অতিরিক্ত অনুভূতি ; বাতাসে, বিশেষতঃ কানে বাতাস লাগিলে, অতিশয় অপ্রবৃত্তি।

উষ্ণ কিছু মুখে লইলে (বিস, ব্রাই, কফি); উষ্ণগৃহে প্রবেশ করিলে ; শয্যায় শয়ন করিলে ; কফি সেবনে এবং ঋতু অথবা গর্ভকালে ; দন্ত-বেদনা।

প্রসব-বেদনা।—আক্ষেপিক, যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা, উহা হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা ; জঙ্ঘার নিম্ন পর্য্যন্ত ছেদনকর বেদনা ; বেদনার উপরের দিকে প্রচাপন।

অতিসার।—শীতলতা, ক্রোধ ব বিরক্তিজনিত ; দন্তোদ্ভেদ কালে ; তামকূট সেবনের পর ; প্রসূতাবস্থায় ; নিম্নাভিমুখে গতি-জন্য ; অতিসার

সবুজবর্ণ, জলবৎ, বিদাহী, খণ্ডিত অণ্ড বা শাকের ন্যায় ; উত্তপ্ত, অতি দুর্গন্ধ, পচা ডিমের ন্যায় ; মল।

স্তন-বৃন্তের প্রদাহ, স্পর্শে উঠাতে বেদনা (হেপার, ফাইটো) ; শিশুর স্তনে স্পর্শ-দ্বেষ।

স্তন্যদায়িনী স্ত্রীদিগের আপনা আপনি স্তন-দুগ্ধ নিঃসরণ (সন্তানকে দুধ ছাড়াইবার পরে নিঃসরণ, (কোনা)।

মাতার ক্রোধাবেশের পর স্তনপান করিয়া শিশুর টঙ্কার (দণ্ডকা) (নক্স।—মাতার ভয়প্রাপ্তির পর, ওপি)।

প্রবল বাতের বেদনা বশতঃ রাত্রিতে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণের আবশ্যকতা (রসটক্স)।

নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারা যায় না (বেল, কষ্ট, ওপি)।

রাত্রিতে পদ-তল-দাহ, শয্যার বাহিরে পা বাহির করিয়া রাখিতে হয় (পল, মেড, সলফ)।

উপচয়।—উত্তাপে; ক্রোধে; সায়াহ্নে, মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে; অনাবৃত বায়ুতে; বাতাসে উদগারে; বৃদ্ধি।

উপশম। কোলে চড়িয়া বেড়াইলে; উপবাসে; ও উষ্ণ, আর্দ্র কালে; হ্রাস

সম্বন্ধ।—(১) বেলেডোনার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। শিশুদিগের রোগে, মস্তিষ্কের স্নায়ুর আক্রান্তিতে বেলেডোনা; ও উদরের স্নায়ুর আক্রমণে, ক্যামোমিলা উপযোগী। (২) শিশুদিগের রোগে ওপিয়ম অথবা মর্ফাইন ব্যবহারে অপকৃত রোগীদিগের পক্ষে, ক্যামো ব্যবস্থেয়। (৩) বেল, বোর ব্রাই, কফ, পল, সল, ক্যামমিলার সমগুণ। (৪) মানসিকস্থৈর্য্যস্থিরতা থাকিলে ক্যামোমিলা অব্যবস্থেয়।

ক্যাম্ফোরা।

(Camphora.)

বেদনার বিষয় ভাবিলে উহার উপশম (হেলি।—বৃদ্ধি, ক্যাল্‌-ফস, হেলোন, অক্স্যা-এসি)।

শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ও উপদাহিতা।

শীতল বায়ুতে অতিশয় অনুভূতি (হিপ, ক্যালী-মি, সোরি)।

উপধাতুপ্রাপ্তির মন্দফল; শরীরের উপরিভাগের শীতলতা, বদনের পাণ্ডুরতা ও নীলাক্ততা, ওষ্ঠের সীস-বর্ণ; গভীর অবসাদ (prostration) শরীরের উপরিভাগ, স্পর্শে শীতল অথচ গাত্র বস্ত্রাবৃত রাখা সহ্য করিতে পারা যায়না। রোগী সমস্ত গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয় (মেডো, সিকেল)।

যৎসামান্য স্পর্শে সমগ্র শরীরের বেদনাবিশিষ্ট অনুভূতি।

জিহ্বার শীতলতা, লোলিততা ও কম্পন

সহসা বমন-বিরেচনের আক্রমণ, নাসিকার শীতলতা ও সূক্ষ্মতা; উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা। ত্বক ও শ্বাসের শীতলতা (ভিরে, জ্যাট্রো)।

ওলাউঠার প্রথমাবস্থায় দীর্ঘকালস্থায়ী তীব্র শীত (ভিরে)।

জীবনীশক্তির আকস্মিক ও সম্যক অবসাদনসহ শরীরের অতিশয় শীতলতা ; রক্ত সঞ্চয়জনিত, শীতে ও দূষিত বিষম জ্বরে (ভিরে) অনেক সময় সুপ্রযুজ্য ঔষধ ; নাড়ীর দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত সূক্ষ্মতা, প্রায় অপ্রাপ্যতা।

হামে ও স্কার্লেটিনায় উদ্ভেদের অপ্রকাশ ; মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা বা শীতলতা, আকুঞ্চিততা, নীলাক্তা ও নিমগ্নতা (hippocratic); বালক আবৃত থাকিতে চায় না (সিকে)।

হামের সকল প্রকার পরিণাম।

উপশম।— বর্ত্তমান রোগের বিষয় চিন্তা-কালে ; উষ্ণ বায়ুতে ও শীতল জলপানে ; উপশম।

সম্বন্ধ।—(১) ক্যাম্ফর দ্বারা প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ ঔষধের ক্রিয়া বিনষ্ট হয় ; তামাক, ও যে সকল গলেপ্রাসিক এসিড আছে তাহার এবং বিষাক্ত ছত্রকের (mushrooms) ক্রিয়াও বিনষ্ট হয় (২) রোগীর গৃহে আদৌ ক্যাম্ফর রাখা উচিত নহে। কার্ব্বো-ভেজি, ওপিয়ম, ভিরেট্রাম, ও সিকেলির সহিত ক্যাম্ফরের তুলনা হয়।

(ডাঃ হেরিং বলেন ওপিয়ম ও ক্যাম্ফরের পরীক্ষায় প্রাপ্ত লক্ষণ গুলির যথাযথ জ্ঞানের উপরে স্ফুটরূপে হোমিওপ্যাথির ক্রমোন্নতি নির্ভর করে। কথাটী ভাবিয়া দেখিবার বিষয়)।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া।

(Kalmia Latifolia.)

তরুণ স্নায়ুশূল, বাত ও গাউট জনিত রোগ, বিশেষতঃ বাত ও গাউটের পরিণাম স্বরূপ হৃৎপিণ্ডের আক্রান্ততা।

বাত হইতে উৎপন্ন অথবা উহার সহিত সপর্য্যায়ে উপস্থিত হৃদ্রোগ।

ভেদন, চাপন, চিড়িক মারণের ন্যায়, বেদনার নিম্নাভিমুখে সঞ্চরণ (ক্যাক্টি।—ঊর্দ্ধদিকে, লিড); তৎসহকারে বা তৎপরে আক্রান্ত-স্থানের অবশতা (একন, ক্যাম, প্লাট)।

দক্ষিণ অক্ষিতে ও অক্ষি-গহ্বরে সুতীব্র সূচী বেধনবৎ বেদনা (বাম চক্ষে, (স্পিজি); পেশীতে গুরুতা, ও বেদনা, চক্ষু ঘুরাইলে উহার আধিক্য স্পিজি); সূর্য্যোদয়ে বেদনার উপস্থিতি, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি ও সূর্য্যাস্তে বিরতি (ন্যাট-মিউ)।

বাত।—তীব্র বেদনা, সহসা উহার স্থান-পরিবর্ত্তন, সন্ধিতে সন্ধিতে গতি; সন্ধির উত্তপ্ততা, আরক্ততা, ও স্ফীততা; অল্পমাত্র সঞ্চালনে আতিশয্য

মস্তক অবনত করিলে অথবা নীচের দিকে দৃষ্টি করিলে শিরোঘূর্ণন।

নাড়ীর ধীরগতি, প্রায় অপ্রাপ্যতা (প্রতি মিনিটে ৩৫ বা ৪০ বার স্পন্দন); পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল ও শীতল হস্ত পদ।

সম্বন্ধ—(১) বাত ও গাউট রোগে, লিড, স্পিজি, রোডের সমগুণ।
(২) হৃদ্রোগে স্পিজিলিয়ার পরে ভাল খাটে

ক্যালেডিয়ম।

(Caladium)

শব্দে অতিশয় অনুভূতি; যৎসামান্য শব্দে নিদ্রা হইতে চমকিত হইয়া উঠা (এসার, নক্স, টারেণ্ট)।

অত্যল্প বায়ু-নিঃসরণ সহকারে পুনঃপুনঃ উদ্গার, বোধহয় যেন আমাশয় শুষ্ক ভুক্তদ্রব্যে পূর্ণ রহিয়াছে।

ধ্বজভঙ্গ।—মানসিক অবসাদ; সম্ভোগ-লিপ্সা ও উত্তেজনা সহকারে শিথিলিত শিশ্ন (লাই, সেলে)।

আলিঙ্গনেও উপস্থের অনুদ্রেক; সংসর্গকালে কমোদ্দীপনা ও শুক্রপাতের অভাব (ক্যাল, সেলে)।

যোনি-কণ্ডূয়ন তজ্জন্য কৃত্রিম রমণ-ক্রিয়ার প্রবৃত্তি (অরিগে; জিঙ্ক); গর্ভাবস্থায়; শ্লেষ্মাস্রাব সহ কণ্ডূয়ন।

সায়াহ্নের জ্বরে নিদ্রা এবং জ্বরান্তে জাগরণ।

মিষ্ট ঘর্ম্মে মক্ষিকাকর্ষণ। (অর্থাৎ ঘর্ম মিষ্টলাগে বলিয়া মাছি আসে)।

মশক ও কীটের দংশনে অতিশয় জ্বালা ও বক্তৃমন।

নড়িতে চড়িতে অপ্রবৃত্তি; নড়িতে ভয় হয় (এই)।

ক্যালেডিয়মে তামাক খাওয়ার স্পৃহা বিনষ্ট হয়।

ক্যালেণ্ডুলা।

(Calendula)

আভিঘাতিক (Traumatic) রোগে পূযোৎপত্তি ব্যতীত ক্ষত-সংযোজনার্থে ব্যবস্থেয়।

কোমলাংশের বিনাশে এড্‌হিসিভ প্লাষ্টার দ্বারা সংযোগ সাধনে অসমর্থতায় প্রযুজ্য।

ছিন্ন-ভিন্ন অসমান বাহিক সত্ত্বণে (Wounds) এবং শস্ত্রোপচারের পরে, সুস্থ ক্ষতাঙ্কুর উৎপাদন ও অধিক পূযোৎপত্তি-নিবারণ এবং ক্ষত চিহ্নের প্রতিষেধার্থে ব্যবহার্য্য।

আভিঘাতিক ও স্বয়স্কৃত স্নায়ুর অর্ব্বুদ (Neuroma) (সেপা); বিদারিত ক্ষত হইতে স্নায়ুর প্রদাহ (হাইপেরি); রক্ত নাশ ও অতিশয় বেদনা বশতঃ অধরম্মতা।

পেশী বা কণ্ডরার (Tendons) ভগ্নাবস্থা; প্রসবকালে বিদারণ; অস্থির সংযোগস্থল পর্য্যন্ত সত্ত্বণের সম্প্রবেশ ও স্নেহময় তরল পদার্থের (Synovial fluids) অপচয়।

সত্ত-ক্ষত (Wounds) জ্বরের উত্তাপবস্থায় আকস্মিক বেদনা সংযুক্ত সত্তব্রণ; বিসর্পোৎপত্তির শারীরিক প্রকৃতি (সোরি); পুরাতন, উপেক্ষিত, দুর্গন্ধ, ক্ষত; গ্যাংগ্রীণ জন্মিবার আশঙ্কা (স্যাল-এসি)।

ক্ষত (Ulcers), উপদাহহীন, প্রবাহিত পচনাপাত (Sloughing) বিশিষ্ট শিরা-স্ফীতি (Varicose) সংযুক্ত; অঘাতিতবৎ বেদনা বিশিষ্ট; ক্ষত (আর্ণ) অতিশয় পুয-নিঃসরণ।

শস্ত্র-ক্রিয়ার পরিষ্কার কর্ত্তনে, ও বিদারিত অভিঘাতে, অধিক পূয-নিঃসরণ নিবারণে ক্যালেণ্ডুলা প্রায় অমোঘ।

সম্বন্ধ — (১) 'হিপ'র, ও আর্সি‍ভ্যা'র সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) কোমল বিধান-তন্তুর বিদারণ ব্যতীত, প্রবল আঘাতাদি জনিত শারীরিক অবস্থায় আর্ণিকার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (৩) স্নায়ুপ্রধান স্থানের উপঘাতে উপঘাতের পরিমাণাপেক্ষা বেদনার আধিক্যে হাইপারের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (৪) অস্থির অসংযোজনে সিম্ফা ও ক্যাল্ক ফসের সহিত; (৫) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পেশীর বাত-কণ্টকে (Strains) বা উপঘাতে রস, ও রুটার সহিত; সমগুণ সম্বন্ধ। (৬) স্যাল্‌-এসি অত্যধিক পুযোৎপত্তি; ও গ্যাংগ্রীণ নিবারণ করে (৭) সল-এসি, বেদনা বিশিষ্ট গ্যাংগ্রীণসংযুক্ত সম্ভ্রণে, রক্তের বিষদোষের বীজ (Septic-germs) নষ্ট করে বলিয়া উল্লেখ দেখাযায়। (৮) বাহ্য প্রয়োগে ক্যালেণ্ডুলা 'ক্রম''ও ‍মূল অরিষ্টের ন্যায় ক্রিয়া করে, এবং বাহ্য প্রয়োগ-কালে উহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগও করা যাইতে পারে

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা (ক্যাল্কেরিয়া অষ্ট্রীরাম)

(Calcarea Carbonia)

শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতু, সুন্দর কেশ, লঘু মুখাকৃতি, নীলনয়ন, সুন্দর ত্বক,; যৌবন-কালে স্থূলত্ব প্রবণতা।

সোরা ধাতুর; পাণ্ডুরতা, দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, বিচরণে সহজে শ্রান্তি।

স্থূলত্ব-প্রবণতা, স্থূল দেহ

আরক্ত মুখমণ্ডল ও লোহিত পেশীবিশিষ্ট বালক-বালিকা, যাহাদের সহজে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয় এবং ঘর্ম্মে সহজে সর্দ্দি লাগে।

বৃহৎ মস্তক ও বৃহৎ উদর; বিমুক্ত ব্রহ্মরন্ধ্র ও সেবনীসন্ধি, (Sutures) কোমল অস্থি, অস্থি অতি ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

অস্থির, বিশেষতঃ মেরুদণ্ড ও দাঁড়াশির বক্রতা প্রান্ত ভাগের কুটিলতা ও বিকলতা ; অনিয়মিতরূপে অস্থির বিকাশ।

নিদ্রাকালে মস্তকে প্রচুর ঘর্ম, উহাতে মাথার চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বালিশ ভিজিয়া যায় (সিলি, স্যানি)।

প্রধানতঃ মস্তকের পশ্চাৎভাগে ও ঘাড়ে ; অথবা বক্ষঃস্থলে ও শরীরের উর্দ্ধাংশে প্রচুর ঘর্ম (সিলি)।

ক্যালকেরিয়া জ্ঞাপক বিশেষ শিরোঘর্ম ও বিযুক্ত ব্রহ্মরন্ধ্র সহ আয়াসে ও বিলম্বে দন্তোদ্গম

রোগ বা আরোগ্যোন্মুখকালে, অণ্ডাহারের অতিশয় স্পৃহা, অপাচ্য দ্রব্য ভোজনের আকাঙ্ক্ষা (এলাম) ; মাংসে অপ্রবৃত্তি

পরিপাক-পথের অম্লতা।— অম্ল উদ্গার, অম্ল বমন, অম্ল মল ; সমস্ত শরীরের অম্ল গন্ধ (হিপ, রিউম)

মাংসলা, রক্ত-প্রধান এবং শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধনশীলা, বালিকা।

অতি শীঘ্র শীঘ্র, অধিক পরিমাণ, ও অধিককাল স্থায়ী, ঋতু ; তৎপরে স্বল্পরজ বা রজোবিলোপ সহকারে ক্লোরোসিস ও এমেনোরিয়া।

নারী —অতি শীঘ্র শীঘ্র, অত্যন্ত অধিক পরিমাণ রক্ত-স্রাব ; শীতল আর্দ্র মোজায়, পা থাকার ন্যায় পায়ের শীতলতা ও আর্দ্রতা, এবং শয্যায় ক্রমাগত শীতলতা

অত্যল্প মানসিক উত্তেজনায়, প্রচুর রক্ত-প্রবাহের প্রত্যাবৃত্তি (সল, টিউব)

রোগিণী আশঙ্কা করে যে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ জন্মিবে অথবা লোকে তাহার মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাইবে (এক্টিয়া)

দীর্ঘ, শীর্ণ, দ্রুত বর্দ্ধনশীল যুবকদিগের ফুসফুসের রোগ ; দক্ষিণ ফুসফুসের উপরের তৃতীয়াংশের আক্রান্ততা (আর্স।—বাম ফুসফুসের উপরের তৃতীয়াংশ, মাইরি, সলফ) ; ধাতুগত রোগে অনেক সময় ফসফরাস অপেক্ষা ক্যালকেরিয়া অধিকতর উপযোগী (টিউবের সহিত তুলনা করুন)।

অসম্যক পরিপোষণ ; ও অসম্পূর্ণ অস্থি নির্ম্মাণ জনিত রোগ ;

হাটিতে বা দাঁড়াইতে শিখিতে কষ্ট, শিশুদিগের হাঁটিতে প্রবৃত্তি হয় না এবং চেষ্টাও করিতে চায় না ; ঘর্ম বিলোপ।

ঘর্মবশতঃ পদতলের অবদরণ (ঠাণ্ডা পোন) ফোস্কা ও দুর্গন্ধি পাদ-ঘর্ম।

(গন্ধে থাকিলে) বিমুক্ত বায়ু সেবনের আকাঙ্ক্ষা, উহাতে উৎসাহ উপকার ও বল জন্মায় (পল, সল)।

শীতলতা। সর্বাঙ্গীন শীতলতা ; একাঙ্গীন শীতলতা (কালী বাই), মস্তক, আমাশয়, উদর, পদদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়ের শীতলতা, বিমুক্ত বায়ুতে অপ্রবৃত্তি, উহা যেন গায় বিন্ধে ; শীতল আর্দ্র বায়ুতে অনুভবাধিক্য ; প্রায়ই শর্দ্দি লাগে (সলফারের বিপরীত)

ঘর্ম।—একাঙ্গীন ঘর্ম ; মস্তক, ও মস্তকের কেশাবৃত ভাগ আর্দ্র ও শীতল, গ্রীবা-পৃষ্ঠ ; বক্ষঃস্থল ; কক্ষতল (armpit) জননাঙ্গ ; এবং হস্ত ও পদদ্বয়ের ঘর্ম (সিপি)।

আমাশয়-গহ্বর বিপর্য্যস্ত রেকাবের ন্যায় স্ফীত, চাপ দিলে উহাতে বেদনা।

শীতল ভিজা স্থানে দাঁড়াইয়া থাকাতে, অথবা জলে দাঁড়াইয়া কাজ করাতে ; ও শীতল কাদা লইয়া কার্য্যকারীদিগের ইউরিমিয়া জনিত কিংবা অন্যান্য রোগ।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সকল প্রকারেই ভাল বোধ

কৃত্রিম উপায়ে মল নিঃসারণের আবশ্যকতা (এলো, সেলে, সিপি, সিলি)।

বেদনাশূন্য স্বরভঙ্গ, প্রাতে উহার আধিক্য

আয়স্কান্ত-শক্তি (magnetism) গ্রহণের ইচ্ছা (ফস্)

উপচয়।—শীতল বায়ুতে ; আর্দ্রকালে ; শীতল জলে ; প্রক্ষালনে (এণ্টি-ক্রুড) ; প্রাতে ; ও পূর্ণিমার সময়ে ; বৃদ্ধি

উপশম।—শুষ্ককালে, ও ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে ; হ্রাস (নাই, পলস)

সম্বন্ধ।—(১) বেলেডোনার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ ; বেলেডোনা ক্যাল-কেরিয়া প্রযুজ্য তরুণ অবস্থায় উপযোগী (২) লাইকো, নক্স, ফস, সিলির পূর্ব্বে ক্যালকেরিয়ার ভাল ক্রিয়া দর্শে। (৩) নাই-এসি, পলস, সলফের পরে (বিশেষতঃ কনীনিকা প্রসারিত থাকিলে) ক্যালকেরিয়া ; এবং নাসিকার শর্দ্দিতে ক্যালকেরিয়ার পরে কালী-বাই ; ভাল খাটে। (৪) হানিম্যানের মতে নাইট-

এসি, ও সলফের পূর্ব্বে ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হওয়া নিষেধ নহে ; উহাতে অনাবশ্যক উপসর্গের উৎপত্তি হয়। (৫) শিশুদিগের পক্ষে ক্যালকেরিয়া বারংবার প্রযোজিত হইতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার পুনঃপুনঃ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ ইহার প্রথম মাত্রায় উপকার দর্শিলে পুনঃ প্রয়োগে অপকার হয়।

ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা।

(Calcarea Arsenica)

অতিশয় মানসিক অবসাদ।

যৎসামান্য মনোভাবে হৃৎকম্পের উৎপত্তি (লিথিকা)

মস্তকে ও বাম বক্ষে রক্তের প্রধাবন (এমিল, গ্লন)।

হৃদ্কপাটের পীড়া বশতঃ অণ্ডলালার রোগ

মদ্যপায়ীদিগের মদ্যপান পরিত্যাগে অসুখ, মদিরাপানের আকাঙ্ক্ষা (এসার, সল-এসি)।

রজোনিবৃত্তিকাল সমীপবর্ত্তী হইবার সময় স্থূলাঙ্গীদিগের অসুখ।

সম্বন্ধ।—(১) কোনা, গ্লন, বিল-বার্ব্বি, পলস, নক্সের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) লসিকা-প্রধান (lymphatic) ধাতু গোদা-ধাতু, ও গুটিক-ধাতুতে (tuberculosis) কোনায়মের পরে ভাল খাটে।

ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকা

(Calcarea Phosphorica)

নীলচক্ষু ও ময়লা মুখাকৃতি, কাল চুল ও চক্ষু ; স্থূল নহে কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে ; এই ঔষধ উপযোগী।

গণ্ডমালা ধাতু-দুষ্ট বালক-বালিকাদিগের প্রথম ও দ্বিতীয়বার দন্তোদ্ভেদকালে ; অতিসার অতিশয় আধ্মান।

শিশুর শীর্ণতা, দাঁড়াইতে অসমর্থতা ; হাঁটিতে শিখিতে বিলম্ব (ক্যাল, সিলি) ; শিথিল, ঝোলা উদর।

শিশুর নাভী হইতে রক্তাক্ত তরল পদার্থ স্রাব (ক্যাল-ফস, ক্যাল-কার্ব) ।

রেকাইটিস —করোটীর অস্থি সূক্ষ্মতা ও ভঙ্গপ্রবণতা ; ব্রহ্মরন্ধ্র ও সেবনী-সন্ধির অনেকদিন পর্য্যন্ত অসংযোজন, অথবা রুদ্ধতা ও পুনরায় বিমুক্ততা ; বিলম্বিত কিংবা উপসর্গ-সমন্বিত দন্তোদ্ভেদ।

পৃষ্ঠবংশের দুর্ব্বলত, বিশেষতঃ বামদিকে বক্রতার প্রবণতা, শরীর ধারণে অসমর্থতা ; ঘাড়ের দুর্ব্বলতা, মস্তক ধারণে অক্ষমতা (এব্রো) ।

যৌবনাগমে কুমারীদিগের দীর্ঘতা, ও সত্বর পুষ্টতা প্রাপ্তি ; অস্থির কোমলত্ব বা মেরুদণ্ডের বক্রত্বপ্রবণতা।

যৌবনাগমে নীরক্তা কুমারীদিগের বয়ঃবৃদ্ধি, তৎসহ মূর্দ্ধাদেশে শিরঃপীড়া ও আধ্মান সংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য, আহারে উহার উপশম

শোক বা হতাশ প্রেমজনিত অসুখ (অর, ইগে, ফস এসি)

রোগের কথা ভাবিলে উহার আধিক্য অনুভব (হেলন, অক্সা-এসি)

অনৈচ্ছিক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ (ইগে) ।

অস্থির অসংযোজন ; এতদ্দ্বারা নূতন অস্থিনির্ম্মাণকর পদার্থের বিবর্দ্ধন উৎপন্ন হয়।

শীতকালের বাত ; বসন্তকালে উহা ভাল হয় এবং শরৎকালে পুনরায় উপস্থিত হইয়া থাকে

বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের শিরঃপীড়া (ন্যাট-মি, সোরি), অতিসার প্রত্যেকবার আহারের চেষ্টায়, উদরে বেদনা।

ভগন্দরের (fistula in ano) সহিত পর্য্যায়ক্রমে বক্ষোলক্ষণ (বার্ক) ; শারীরিক উত্তাপের অভাব, শীতল ঘর্ম্ম ও সর্ব্বশরীরের শীতলতা।

উপচয় ।—আর্দ্র, শীতল, পরিবর্ত্তনশীল কালে, পূর্ব্বদিকের বাতাসে ; দ্রবীভূত বরফে ; ও মানসিক পরিশ্রমে ; বৃদ্ধি।

উপশম ।—গ্রীষ্মকালে ; ও উষ্ণ, শুষ্ক বায়ুতে ; হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) ব্যাপ্টিশিয়া, ব্যারাইটা, ব্রায়ো, কোনার গাস, ও বালা দলের সহিত এই ঔষধের সম্বন্ধ আছে, তবে বোরাক্স 'গর্ভস্রাব' ক্লাশকাশীয় গোরিংমের সহিত সম্বন্ধ; সাইলিশিয়ারও সম্বন্ধ আছে কিন্তু ইহাতে মস্তকের ঘর্ম-লক্ষণ নাই (২) ক্লটাস সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (৩) আইওড, সোরি, সেলি, সলফ-এর পরে; এবং আর্স আইওড, টিউবের পরে; এই ঔষধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়া দর্শে।

ক্রিয়োজোটম।

(Kreosotum)

মলিনবর্ণ মুখ কান্তি অসম্যক বিকশিত, ক্ষীণ, কদাকার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়; বয়ঃক্রম অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ বালিকা (ফস)

বৃদ্ধবৎ দৃষ্ট, কুঞ্চিত মুখ কান্তি (আর্জ), শুষ্ক বালকের 'মেরা-দোষ' দুষ্ট, জাত শিশুদের (আইওড) ...; ও নিবৃত্তরজস্কা নারীদিগের রোগ (ল্যাক)

রক্তস্রাব প্রবণ শারীরিক প্রকৃতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিঘাত হইতে বিস্তৃত রক্তপাত (ক্রোট, ল্যাক, ফস); নাসিকার রক্তপাতে, ঋতুস্রাবে ও রক্তমূত্রে অপ্রবল প্রবাহ; টাইফয়েড জ্বরে রক্তস্রাবের পর অতিশয় অবসন্নতা, রক্ত উদ্গমনের পর মলিন রক্তরং (হেমে)।

ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতু-কালে কর্ণে গর্জ্জন ও গুণ্ গুণ্ ধ্বনি।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে বিদাহী, দুর্গন্ধ, রসানী স্রাব; জীবনীশক্তির অতিশয় অবসাদ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে এপ্রকার প্রবল কণ্ডূয়ন যে উহাতে রোগীকে ক্ষিপ্তবৎ করিয়া তোলে (উদ্ভেদ-পরিশূন্য কণ্ডূয়ন, ডলিকোস)

দন্তোদ্গমে যাতনা দাঁত উঠিয়াই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে; নীলাভ আরক্ত, কোমল, স্পঞ্জ (Spongy) রক্তস্রাবী প্রদাহিত, ক্ষতসংযুক্ত দন্ত-মূল।

বমন—গর্ভাবস্থায় লালাস্রাব সহকারে এবং মিষ্ট জল বমন; ওলাউঠার বমন, দন্তোদ্গম-কালে বমন, অতিজীর্ণ সংশাব সহকারে অত্যধিক বমন, আমাশয়ের দূষিত রোগে বমন

ঋতুর পূর্বে ও ঋতু কালে উগ্র শিরোবেদনা (সিপি)।

ঋতু।—নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত পূর্বে প্রচুর পরিমাণে দীর্ঘকালস্থায়ী, ঋতু, ঋতুকালে বেদনা, ঋতুর পরে উহার আতিশয্য; শয়ন করিলে ঋতু প্রবাহিত হয়, বসিলে বা হাঁটিলে উহার বিরতি জন্মে; শীতল পানীয় দ্রব্য পান করিলে ঋতুর বেদনার শান্তি জন্মে ঋতুর রক্তের সবিরাম-প্রবাহ, কখন কখন উহা প্রায় স্থগিত থাকে, অনন্তর আবার পতিত হয় (সলফ)।

অনিচ্ছায় মূত্র-পাত; কেবল শয়ন করিয়া মূত্রত্যাগ করিতে পারা যায়; পাণ্ডুবর্ণ (pale) প্রভূত মূত্র; মূত্রবেগ, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া না যাইতে না যাইতেই কাপড় নষ্ট হয় (এপিস, পেট্রোল); প্রথম নিদ্রাকালে মূত্রস্রাব (সিপি), শিশুকে উহা হইতে সহজে জাগরিত করিতে পারা যায় না।

মূত্র-কালে ও তৎপরে জ্বালা ও টাটানি (সলফ)।

শ্বেতপ্রদর।—বিদাহী (acrid, corrosive), দুর্গন্ধি স্রাব; ঋতুদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ে, উহার আতিশয্য (বোভ, বোর); স্রাবে কাঁচা শস্যের ন্যায় গন্ধ; উহাতে বস্ত্র শ্বেতসারের ন্যায় শক্ত হয়, ও বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণ দাগ লাগে

[illegible]ত্তিক স্রাব।—মলিনবর্ণ, কপিশ দলা দলা, দুর্গন্ধ, বিদাহী স্রাব, এক এক বার প্রায় থামিয়া যায়, আবার নূতন হইয়া উঠে (কোনি, সল)।

ভগ (Vulva) ও যোনির প্রবল বিদাহী কণ্ডূয়ন।

উপচয়।— বিমুক্ত বায়ুতে, শীত ঋতুতে; শীতল হইবার সময়; শীতল জলে গা ধুইলে বা স্নান করিলে, বিশ্রামে বিশেষতঃ শয়নকালে; বৃদ্ধি।

উপশম।— সাধারণতঃ উষ্ণতায় উপশম

সম্বন্ধ।—(১) ক্যান্সার ও অন্যান্য দূষিত রোগে ক্রিয়োজোটের পরে, আর্স, ফস, সলফ, ভাল খাটে (২) কার্বোভেজি ও ক্রিয়োজোটে প্রতিকূল শত্রু।

ক্রোকাস সেটাইভাস।

(Crocus Sativus).

পুনঃ পুনঃ অনুভূতির পরিবর্ত্তন ; হর্ষ অত্যন্ত প্রফুল্লতা হইতে গভীর নৈরাশ্যে পরিণতি (ইগ্নে নক্স-ম)

অত্যন্ত আহ্লাদ ও প্রীতিপূর্ণতা, সকলকেই চুম্বন করিতে প্রবৃত্তি ; পরক্ষণেই আবার ক্রোধের আবেশ

শরীরের যে কোন স্থান হইতে কাল, আঠা আঠা, সংযুক্ত, রক্তপাত-স্থান হইতে লম্বা কৃষ্ণ কাল দড়ির ন্যায় ঝুলায়মান (ইলাপ্স) রক্তস্রাব।

রজোনিবৃত্তি-কালে, দপদপকর, স্পন্দনকর, নিয়মিত ঋতু-কালের দুই তিন দিন বিবর্দ্ধিত ; শিরঃপীড়া ; স্নায়বীয় অথবা ঋতু-সংসৃষ্ট, ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে, তৎকালে, বা তৎপরে উপস্থিত (ল্যাক, লিলি, সিপি) শিরঃপীড়া।

চক্ষু।—গৃহ যেন ধূমপূর্ণ যেন অশ্রুপাত করা হইয়াছে ; ও চক্ষুর অন্তপ্রান্তে (across the eyes) যেন শীতল বাতাস বহিতেছে, এরূপ অনুভব ; চক্ষুর পাতা দৃঢ়রূপে বন্ধ করিলে উপশম শান্তি।

নাসিকায় রক্তপাত ; কাল, দুশ্ছেদ্য, রজ্জুবৎ রক্ত, প্রত্যেক বিন্দু টানিয়া সূত্রে পরিণত করিতে পারা যায় ; তৎসহ কপালে বড় বড় শীতল ঘর্ম্মবিন্দু (শীতল ঘর্ম্ম, কিন্তু পাখার বাতাস প্রাপ্তির ইচ্ছা, উজ্জ্বল লোহিত রক্তপাত, কার্ব্বো-ভেজি), অতিবিকাশশীল শিশুদিগের নাসিকায় রক্তপাত (ক্যাল্ক, ফস)।

কাল, রজ্জুবৎ, সংযুক্ত রক্তবিশিষ্ট রক্ত-কৃচ্ছ্র (অষ্ট, ।

আমাশয়, উদর, জরায়ু, বাহু অথবা শরীরের অন্যান্য স্থানে যেন সজীব কিছু নড়িতেছে এরূপ অনুভব (স্যাবি, থুজা, সলফ) ; তৎসহ বিবমিষা ও শ্রান্তি।

অতিশয় হর্ষ সংযুক্ত কোরিয়া ও হিষ্টিরিয়া, একবার গান ও নৃত্যকরা (ট্যারা) আবার বিষাদ ও রোষ

স্বতঃ স্বতঃ পোনঃপুনীন আক্ষেপ ও আকুঞ্চন ও স্পন্দন (নগান হইতে নষ্ট)

সম্বন্ধ — (১) ক্রোটনের পর পীড়া বেগের ন্যায় লাগে, বা মন লাগে (২) রক্ত-সংক্রান্ত রোগে অস্থিবেষ্টের সহিত কোকজের না হয়।

ক্রোটন টিগ্লিয়ম।

(Croton Tiglium)

এতদ্দ্বারা অন্ত্র-পথের (intestinal tract) শৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া তেজস্বী নিঃসৃত হয় ও প্রভৃত, জলবৎ অতিসার জন্মে (ভিরে), এবং সর্ব্বশরীরে এক প্রকার তরুণ পামার উৎপত্তি হয় (হ্রংস)।

যেন আক্ষেপিক উৎক্ষেপে, (Spasmodic jerk) বন্দুকের গোলার ন্যায় বেগে (গ্যান্ধ) মল নিঃসৃত হয়, রোগী পান বা আহার করিবামাত্র, অথবা আহার করিবার সময়েও মলস্রাব; হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ মল।

হঠাৎ মল প্রবৃত্তি অনন্তর সহসা মল নিঃসরণ, যেন সরলান্ত্র হইতে তীরের ন্যায় ছোটে (গ্যান্ধ, এ্যাট, ফ্যাড, ন্যূডা)।

মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে জলের আন্দোলনের ন্যায় গতি (মলত্যাগের পূর্ব্বে কুন্থন, এলো)।

বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর দিয়া স্তন হইতে স্কন্ধাস্থি (Scapula) পর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা, যতবার সন্তান স্তন পান করে ততবার একই স্থানে বেদনা উপস্থিত হয়; স্তন বৃন্তে অতিশয় স্পর্শ দ্বেষ অনুভূত হয়।

সর্ব্বশরীরের দারুণ কণ্ডূয়ন, কিন্তু চুলকাইতে পারা যায় না, বেদনা লাগে কিন্তু আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিলে উপশম জন্মে, সর্ব্বশরীরে পামা (eczema)।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই জননাঙ্গের নিদারুণ কণ্ডূয়ন (হ্রংস) পুরুষের জননাঙ্গে ফুস্কুড়ির ন্যায় উদ্ভেদ; এতই অনুভূতি ও স্পর্শ-দ্বেষ যে চুলকাইতে পারা যায় না

কাস; মাথা বালিশে [illegible] করিবামাত্র [illegible] কাসের উপস্থিত, তাহাতে [illegible], [illegible] উঠিয়া [illegible] হয়। ঘুমাইতে হয়।

উপচয়।— শীত সময়ে; [illegible], [illegible] বা [illegible] কালে (আগুন, আগুন), [illegible] (নাখ), এবং অত্যুষ্ণ আহার ও পান করিলে; [illegible]

সম্বন্ধ।— (১) [illegible] পুরাতন প্রাতসারে, [illegible] সহিত; জল-পান [illegible] সহিত; কোটেলের তুলনা হয়।

ক্রোটেলাস হরিডস।

(Crotalus Horridus)

[illegible], [illegible], রক্তস্রাব-[illegible] অবস্থায়; জাইমোটিক রোগকালে; (বিষ বিশেষ দ্বারা দূষিত (Intoxicated) হওয়া যে ব্যাপক, অব্যাপক বা সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে জাইমোটিক রোগ বলে); [illegible] পায়ীদিগের মধ্যে; এবং [illegible] রক্তের অতিরিক্ততায় ([illegible]) এই ঔষধ উপযোগী হয়।

[illegible] নিস্তেজ অবস্থাপন্ন রোগ, সেপ্টিক, টাইফয়েড অথবা [illegible] জ্বর; মদিরাপানের পরবর্তী ফল; প্রকৃত অবসন্নতা (Collapse)।

[illegible]; অপরিমিত মাদকসেবী, এবং রক্তস্রাবী ও ভগ্নদেহ ব্যক্তিদিগের [illegible] টিকার।

রক্ত-স্রাবপ্রবণ শারীরিক প্রকৃতি; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও শরীরের প্রত্যেক দ্বার হইতে রক্তস্রাব; রক্ত-ঘর্ম।

চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের, পীতবর্ণ; কণীনিকার প্রদাহ (Keratitis), কিংবা কর্ণীনিকা ও উপতারার (iris) প্রদাহের পর এই ঔষধে দৃষ্টির পরিষ্কারতা জন্মে

[illegible] বা উৎকট পাণ্ডু, যকৃৎ অপেক্ষা রক্ত অধিকতর আক্রান্ত।

রক্তস্রাবী পার্পুরা; সহজে সকল দ্বার হইতে, এবং মুখ, নাক, ও মাড়ী হইতে রক্তস্রাব হয়।

জিহ্বার অতিশয় আরক্ততা, মসৃণতা ও চকচকে ভাব (পাইরো); দাঁতে শীতলতা।

সাংঘাতিক ডিফথিরিয়া বা গ্যাংগ্রীনা, গলক্ষত বা তালুর কোমলতা বা গ্যাংগ্রীণ, শক্ত ঢোক গিলিতে বেদনার আধিক্য; বমন বা অতিসারের আক্রমণ

জীবনী-শক্তির অবসন্নতা; নাড়ী পাওয়া যায় না; রক্তের বিষাক্ততা (পাইরো)।

বমন।—উৎকণ্ঠা ও দুর্বল নাড়ী সহকারে পৈত্তিক বমন; প্রাতঃকালে খাদ্যের পরে বমন; দক্ষিণ পার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শয়ন করিলে তখনই মলিন, সবুজবর্ণ পদার্থ বমন; পীতজ্বরের কৃষ্ণবর্ণ বা কফি-চূর্ণের ন্যায় বমন।

অতিসার; কাল, পাতলা, কফি-চূর্ণের মত মল; দুর্গন্ধ মল, আহার্য্য বা পেয়দ্রব্যে দূষিত বাষ্প বা পচনজনক দ্রব্যের সংস্পর্শে উৎপন্ন অতিসার; পীতজ্বর, ওলাউঠা, টাইফয়েড, ও টাইফাস জ্বরের অতিসার

সেপ্টিক বা জাইমোটিক রোগাদিতে উৎপন্ন অন্ত্রের রক্তস্রাব; মলিন, তরল, অসংযত রক্ত।

শবচ্ছেদ জনিত আঘাত ও কীটের দংশ-দোষ; গো বীজের টীকা-গ্রহণের কুফল

দুর্বলী-ভূত দেহে গুটিকম্প (vaccination) রোগ (ডিপ্থি, ক্ষত)।

নিবৃত্ত-রজঃস্রাবদিগের তাপ তরঙ্গ বেগ (flushes of heat) ও শিক্তাজনক ঘর্ম; শ্রান্তি ও জরায়ুতে শূন্যতানুভব, মলিন, তরল দুর্গন্ধ রক্ত বিশিষ্ট, ক্রমাগত অনেকদিন স্থায়ী জরায়ুর রক্তস্রাব

জরায়ুর দূষিত রোগ, রক্তের দ্রবতা, মলিন, তরল, দুর্গন্ধ রক্ত।

সম্বন্ধ।—(১) ল্যাক, ব্যাপ, নাজা, ও পাইরোজেন সহিত ক্রোটালাসের তুলনা হয়। (২) ল্যাকেসিসে ত্বক্ শীতল ও আঠা আঠা ঘর্ম্মাক্ত থাকে; ক্রোটেলাসের ত্বক্ শীতল ও শুষ্ক থাকে; ইলাপ্স দক্ষিণ ফুসফুসের রোগে, কাল রক্ত নিষ্ঠীবনে ব্যবহৃত হয়

গ্রাফাইটিস।

(Graphites)

যে সকল নারীদিগের স্থূলত্ব-প্রবণতা, অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধতা, এবং বিলম্বিত ঋতু থাকে তাহাদের পক্ষে গ্রাফাইটিস উপযোগী।

প্রাপ্ত-যৌবনাদিগের পক্ষে পলসেটিলার যেরূপ অধিকার, নিবৃত্ত-রজস্কাদিগের পক্ষে গ্রাফাইটিসের সেইরূপ অধিকার।

অতিশয় সতর্কতা, ভীরুতা, ইতস্ততঃতা, কোন বিষয় স্থির-নিশ্চয় করিতে অসমর্থতা।

কার্য্য করিতে বসিয়া অস্থিরতা (জিঙ্ক)।

বিমর্ষতা, হতাশতা; গীত-বাদ্যে অশ্রুস্রাব; মৃত্যু-চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা না করা (গীত-বাদ্যে অসহ্যতা, ন্যাট-কা, সোব)।

অক্ষি-পুটের পামা; আর্দ্র ও বিদারিত উদ্ভেদ, অক্ষি-পুটের আরক্ততা ও উহার প্রান্তদেশে শল্ক বা চিপিটিকা (সোরিন)

সঙ্গমেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার বশতঃ উহার দৌর্ব্বল্য

অতিরিক্ত স্বল্প, পাণ্ডুবর্ণ; প্রবল উদর-বেদনা সংযুক্ত বিলম্বিত, ও পদদ্বয় আর্দ্র করাতে বিলম্বিত (পলস), ঋতু।

ঋতু-কালে প্রাতঃকালীন বিবমিষা; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা (এলম, কার্ব্বো-এন, কক)

বিদাহী, অধিক পরিমাণে; দিবসে ও রাত্রিতে দমকে দমকে নির্গত; এবং ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে উপস্থিত (পূর্ব্বে সিপি, পরে ক্রিয়ো); শ্বেতপ্রদর।

স্তন-রোগের পর অবশিষ্ট শক্ত ক্ষত-চিহ্ন, তজ্জন্য স্তন-দুগ্ধের প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা; পুরাতন ক্ষত-চিহ্ন ও পুনঃ পুনঃ রোগের উৎপত্তি হইতে স্তনের কর্কটিকা (cancer)।

ত্বকের অসুস্থতা; প্রতি উপঘাতেই পূযোৎপন্ন হয় (হিপার), পুরাতন ক্ষত-চিহ্ন পুনরায় কাঁচা হইয়া উঠে; কাণের উপরে উদ্ভেদ; হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলের ব্যবধান স্থানে এবং শরীরের নানাস্থানে উদ্ভেদ,

এবং সেই সকল উদ্ভেদ হইতে একপ্রকার জলবৎ, স্বচ্ছ, আঠা আঠা রস ক্ষরণ।

নখের ভঙ্গুরতা ও বিকৃতিলাভ (এন্টি ক্রু) নখ পুরু হইয়াছে এবং বেদনা, স্থূলতা ও খর্ব্বতা।

সন্ধিস্থলে বিদারণ দোষের উপরিভাগে বা শরীরের ভাঁজ স্থানে (কান্ধ, গলদেশ —শীতল স্থান ... পি, ভিরে)।

নিষ্পন্দ-বায়ু রোগের (catalepsy) ন্যায় অবস্থা, চৈতন্যের বিদ্যমানতা, অথচ নড়িতে চড়িতে বা কথাবর্ত্তিতে অক্ষমতা

সহজে ঠাণ্ডা লাগে, বায়ু-প্রবাহে অনুভবাধিক্য (বোর, ক্যাল, হিপ, নক্স) কপালের শীর্ণতাপ্রাপ্তি।

গোলমালে ভাল শুনিতে পাওয়া যায়, ঘোড়ার গাড়ীতে বা রেলের গাড়ীতে, এবং গুড় গুড় শব্দ কালেও ভাল শুনা যায় (নাই-এসি)।

অতিসার।—কপিশ, তরল, অজীর্ণ পদার্থ বিমিশ্রিত, ও অসহ্য দুর্গন্ধ মল; প্রায়শঃ উদ্ভেদ বিলোপ হওয়ায় উহার উৎপত্তি (সোরি)

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতা, আয়াসে নিঃসারিত বৃহৎ শক্ত, গ্রন্থিল, শ্লেষ্মার সূত্রধারা সংযোজিত মলের ঢেলা, অতিরিক্ত বৃহৎ (গোল) মল, মলত্যাগান্তে মলদ্বারের টাটানি ও বেদনা।

নির্লজ্জ, বিরক্তিকর, তিরস্কারে হাস্যকর বালক।

কপালে মাকড়সার জালের সূতা থাকার ন্যায় অনুভব, উহা দূর করিয়া ফেলিবার অতিশয় চেষ্টা (বোরা, ব্যারা, ব্রোম, র‍্যাণ স)।

ফ্লেগমোনস এরিসিপেলাস জ্বালা ও হুল-বেধনবৎ বেদনা সংযুক্ত, মুখমণ্ডলের বিসর্প; দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম দিকে গতি; আইওডিন প্রয়োগের পর

স্ত্রী-পুরুষ উভয়জাতিরই রতি-ক্রিয়ায় নিশ্চিত অপ্রবৃত্তি।

উপচয়।—রাত্রিতে, ঋতু-কালে ও ঋতুর পরে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—(১) কষ্টি, হিপ, ও লাইকোর সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) লাই, ও পলসের পরে গ্রাফ ভাল খাটে; যুবতীদিগের মেদ-রোগে (obesity) ক্যালকেরিয়ার পরে ইহা উপযোগী হয়; চর্ম্ম-রোগে, সলফারের পরে; এবং দমকে

দমকে দমকে প্রদাহ-স্রাব ; চিকিৎসা করে স্রাব নাও হলে (৩) মধু মেশা
গ্রাফ, কাষ্ট ও পলের সমতুল

গ্লনয়েন।

(Glonoin)

স্নায়বীয় ধাতু ; রক্ত-প্রধান, অতিশয় উত্তেজনাবিশিষ্ট স্ত্রীলোক ; সহজে আক্রান্ত হয় এরূপ ব্যক্তি

মানসিক উত্তেজন, ভয়প্রাপ্তি, ভীতি, উপঘাত-প্রাপ্তি ও উহার দোষ এবং জনিত অপকার, চুল-ছাটার মন্দ ফল (একন, বেল)।

গ্যাসের আলোতে কাজ করাতে, ও মস্তকে উত্তাপ পড়িলে তাহাতে মস্তকের উপদ্রব ; মস্তকে উত্তাপ-তাপ সহ্য হয় না ; সৌর উত্তাপে এবং রৌদ্রে হাঁটিলে আরম্ভ হয় (ল্যাক ন্যাট্রাম)।

মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয় অথবা পর্য্যায়ক্রমে মস্তক ও হৃৎপিণ্ডের রক্ত-সঞ্চয় ; মস্তক অত্যন্ত বড় বোধ হয় ; যেন মস্তক অপেক্ষা করোটী (skull) ছোট এপ্রকার অনুভূত হয় ; আতপাঘাত ও সূর্য্যাবর্ত্ত শিরঃপীড়া (Sun stroke and Sun-headache) ; সূর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত উহার হ্রাস-বৃদ্ধি (ক্যাল্ম, ষ্টানা)

নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে ধপধপ ধাক্কা লাগে। দপদপকর বা স্পন্দনকর শিরঃপীড়া ; দুই হাত দিয়া মাথা ধরিয়া রাখিতে হয় ; শয়ন করিয়ে থাকা যায় না, মাথায় বালিশের যেন আঘাত লাগে।

মস্তিষ্ক অতিরিক্ত বৃহৎ, পূর্ণ ও ফাটিয়া পড়ার ন্যায় অনুভূত হয়, রক্ত উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয় ; প্রতি পদ-বিক্ষেপে, নাড়ীর স্পন্দনে ও সংঘর্ষণে মস্তিষ্ক দপদপ করে।

বিলম্বিত বা বিলুপ্ত ঋতু স্থানতঃ মস্তিষ্কের তীব্র রক্ত-সঞ্চয় ; ঋতুর পরিবর্ত্তে শিরঃ-পীড়া।

জরায়ুর প্রভূত রক্ত-স্রাবের পর শিরঃপীড়া ; গর্ভবতী স্ত্রীদিগের মস্তকে রক্তের প্রধাবন।

ক্যারটিড ধমনীর দপ দপ শব্দ ও বল হওয়ায়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আয়াসিত ও ভারাক্রান্ত (bloated & oppressed), রক্ত জমিতেছে, এবং তথা হইতে দ্রুতবেগে মস্তকে প্রধাবিত হয় বলিয়া বোধ হয়

মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয় বশতঃ শিশুদিগের উদরাময় রোগ (মড়কা); দন্তোদ্ভেদ-কালে মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ (meningitis), বিষ রোগী দেখিয়া বেলেডোনা উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।

সন্ধ্যাকালে কয়লার আগুনের নিকট বসিলে অথবা সেখানে ঘুমাইয়া পড়িলে বালক-বালিকাদিগের পীড়া জন্মে

নিযুক্ত-মজুরদিগের তাপাবেশ (flushing of heat) (এমিল, বেল, ল্যাক); রজকাদিগের তাপাবেশ (ফির, ক্যাম্প)।

উপচয় —সূর্য্যোত্তাপে, রৌদ্র-ভোগে ; গ্যাসের আলোতে ; অতিরিক্ত উত্তাপ গ্রহণে সংঘর্ষণে, অবশীর্ষ হইলে ; ঊর্দ্ধে আরোহণে টুপির স্পর্শে ; ও কেশ ছেদনে ; বৃদ্ধি

সম্বন্ধ।—(১) এমিল, বেল, ফির, ক্যাম্প, মেলিল, ষ্ট্রামোন সহিত ইহার সম গুণ সম্পন্ন।

চায়না বা সিঙ্কোনা।

(China—Cinchona)

বলবান, শ্যামবর্ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে; ও পূর্ব্বে সবল, পরে দৌর্ব্বল্যকর স্রাবাদি নিঃসরণ বশতঃ দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী

ঔদাস্য, বৈরাগ্য, নীরবতা (ফস-এসি); নিরাশতা, বিমর্ষতা, বাঁচিয়া থাকিতে অনিচ্ছা, কিন্তু আত্মহত্যা করিবার সাহসের অভাব।

শরীরের তরল বিধানের অপচয় (loss of vital fluids), বিশেষতঃ রক্তস্রাব, এবং অতিরিক্ত স্তন্য-দান, অতিসার, পূয স্রাব (চিনি-সল) হইতে উৎপন্ন ; অথবা, ম্যালেরিয়া-সম্ভূত নির্দ্ধারিত সময়ে প্রত্যাগত, একদিন পর এক দিন উপনীত ; রোগ।

প্রভূত রক্তস্রাব বিশিষ্ট নিরুত্ত-রক্তাদিগের রোগ; তরুণ রোগের শেষে পরিণতি।

বেদনা।—চিড়িকমারা অথবা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার মত বেদনা; প্রতি পর্ব্বস্থানে সকল অস্থিতে, ও অস্থি-বেষ্টে (periosteum) বেদনা; উহাতে মনে হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে হয়, বেদনা, সঞ্চালনে উপশম জন্মে (রুস, ফেরাম) স্পর্শে বেদনা প্রারম্ভ হয় এবং অনন্তর ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, অতিসামান্য স্পর্শে বাড়ে, শক্ত চাপ দিলে কম পড়ে

অতিশয় দুর্বলতা, শারীরিক শ্রমে অপ্রবৃত্তি, স্নায়বীয়তা; স্পর্শে অত্যনুভূতি, বেদনায়, ও বায়ুপ্রবাহে অতিরিক্ত অনুভূতি; সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত অনুভূতি। অতৃপ্তিকর নিদ্রা, অথবা অবিরত নিদ্রা, রাত্রি তিনটার পরে উহার বৃদ্ধি, প্রত্যূষে জাগরণ

এক হাতের বরফের ন্যায় শীতলতা, অন্য হাতের উষ্ণতা (ডিজি, ইপি, পালস)।

শিরঃপীড়া—বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে; মস্তকের ও গ্রীবার বৃহৎ ধমনীদ্বয়ের তীব্র দপ দপ, বদনের প্রদাহতা, মস্তকের পৃষ্ঠভাগ হইতে সমগ্র মস্তকের উপর বেদনা, বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিলে বাড়ে, তখন দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে হয়; রক্তস্রাবের পরে বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবার পরে উহার উৎপত্তি

মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, নিমগ্নতা ও আকুঞ্চিততা, চক্ষু নিমগ্ন ও নীলবর্ণ পাশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। অতিশয় চর্মের পরবর্তী মুখাকৃতির ন্যায় পাণ্ডুর ও বসা মুখাকৃতি; সন্তানকে স্তন্যদান কালে দন্ত-বেদনা।

আমাশয় ও উদরের অতিশয় আধ্মান, উদ্গারে উপশম জন্মে না (কার্ব্ব, লাইকো।—উদ্গারে উপশম কার্ব্বো-ভেজি); ফল আহারের পরে বৃদ্ধি পায় (পালস)।

প্রত্যহ কোন এক নির্দিষ্ট ঘণ্টায় উদর বেদনা; পিত্ত-শিলা (gallstones) বশতঃ নির্দ্ধারিত সময়ে প্রত্যাবৃত্ত উদর-বেদনা (কার্ড-মে) রাত্রিতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি; এবং অবনত হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে (bending double) উপশম (কলো)।

রক্ত-স্রাব বশতঃ প্রসব-বেদনার বিরতি, রোগিণীর কাহারও স্পর্শ সহ্য হয় না, তাহার হাত দুখানি পর্য্যন্ত ছুঁইতে পারা যায় না।

মুখ, নাসিকা, জরায়ু বা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; ক্রমাগত অনেকক্ষণ রক্তপাত, অম্ল দ্রব্যে স্পৃহা; মল রক্ত অথবা কফাদি সহকারে দিনে সংযত রক্তপাত, মূর্চ্ছা, দৃষ্টিহীনতা, সর্ব্বাঙ্গের শীতলতা এবং খখন কখন উদ্গার (চিন, ফস)।

সবিরাম জ্বর — প্রতি আক্রমণে জ্বরের আবেশ দুই তিন ঘণ্টা অগ্রবর্ত্তী হইয়া আইসে (চিনি-সল্ফ); সাত দিন বা চৌদ্দ দিন পর পর জ্বর প্রত্যাবৃত্ত হয়; কখনও রাত্রিতে জ্বর আইসে না; আবৃত অঙ্গে বা নিদ্রাকালে প্রভূত ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয় (কোনা)।

উপচয়।— অত্যল্পমাত্র স্পর্শে; একদিন পর একদিন; বায়ু-প্রবাহে; চিত্ত-বিকারে; ও রস-রক্তাদির অপচয়ে; বৃদ্ধি।

উপশম।— প্রচাপনে ও অবনত হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে হ্রাস।

সম্বন্ধ।— (১) ফিরমের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) অগ্রবর্ত্তী প্রকারের সবিরাম জ্বরে চিনি-সল্ফের সহিত তুলনীয়। (৩) ডিজি, ও সেলেনের পরে চায়না প্রতিকূল। (৪) অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে, রক্তস্রাব হইতে পারিলে চায়না ফলপ্রদ।

চেলিডোনিয়ম মেজস।

(Chelidonium Majus)

সুন্দর, পাতলা মুখাকৃতি, ক্ষীণদেহ, উত্তেজনশীল, যকৃৎ, আমাশয় ও উদরের রোগ-প্রবণ (পড); সকল বয়স, সকল ধাতু ও সকল লিঙ্গের রোগীদিগের পক্ষেই এই ঔষধ উপযোগী।

দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির (Scapula) নীচের ও অভ্যন্তরের কোণের নিম্নে অবিরত বেদনা (কালী-কা, মার্ক;—বাম স্কন্ধাস্থির, চিনোপ, সাঙ্গু)।

ঋতু-পরিবর্ত্তনে উপস্থিত বা পর্য্যায়ক্রমে অসুস্থতা (মাক); আহারান্তে সমস্ত অসুখের হ্রাসপ্রাপ্তি।

জিহ্বায় পুরু পীতবর্ণ লেপ ও প্রান্তদেশের অরক্ততা, দন্তের চিহ্ন (গাঢ়—বৃহৎ লোহিত জিহ্বা ও দন্তাঙ্ক, মাক)

যে পর্য্যন্ত না দগ্ধপ্রায় আমাশয় তাহা উদ্গীরণ করে, সে পর্য্যন্ত অতিশয় উত্তপ্ত পানীয় দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা, (আর্স, ক্যাস)।

নির্দ্ধারিত সময়ে সংঘটিত অক্ষি-কোটরের স্নায়ুশূল (দক্ষিণ পার্শ্বের), ও অতিশয় অশ্রুপাত; অশ্রুজল প্রবল বেগে নির্গত হয় (নম)।

কোষ্ঠরোধ, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় গোল গোল শক্ত শক্ত গোলার আকার মল (ওপি, প্লম্ব), পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও অতিসার।

অতিসার—রাত্রিতে, শ্বেতবর্ণ শ্বেতবর্ণ, পাতলা ধূসর; উজ্জ্বল পীতাভ; কপিশ বা শুভ্র, জলবৎ, লেইকার; অনিচ্ছায় নিঃসৃত; মল।

বদন, কপাল, নাসিকা ও গণ্ডদ্বয়ের বিশেষ পীতবর্ণ

ত্বকের পীতমিশ্রিত ধূসর বর্ণ, পরিশুষ্ক কুঞ্চিত ত্বক্। হস্তের তালুকার ঐরূপ বর্ণ ও আকৃতি (সিপি)।

যকৃদ্রোগ, কামলা (jaundice) দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা।

দক্ষিণ ফুসফুসের প্রদাহ, যকৃতের উপসর্গ (মার্ক)।

আক্ষেপিক কাস; কাসিবার সময় মুখ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মাখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে (ব্যাডি, কালি-কা)।

দক্ষিণ পার্শ্বের সমধিক আক্রান্তি, দক্ষিণ চক্ষু, দক্ষিণ ফুসফুস, দক্ষিণ কুক্ষি ও উদর, দক্ষিণ বক্ষ ( ) ও জঙ্ঘা আক্রান্ত; দক্ষিণ পদ বরফের ন্যায় শীতল; বাম পদ স্বাভাবিক (লাই)

তাহাদের তন্দ্রালুতা ও আলস্য, শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা; যকৃদ্রোগের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত সংযুক্ত অথবা পিত্ত-প্রবণ-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পুরাতন, পচা প্রসারণশীল ক্ষত

পিত্ত-শিলা, দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নীচে বেদনা (পিত্ত-শিলাজনিত উদর-বেদনার ভয়ানক আক্রমণ, কার্ড)

সম্বন্ধ —(১) যকৃতের পীড়ায় ব্রাইওনিয়ার অপব্যবহারের মন্দফল চেলি-ডোনিয়ম দ্বারা নিবারিত হয় (২) চেলিডোনিয়মের সহিত একন, ব্রাই, ল্যাই, সাল্ফ, নক্স, ক্যাল্ক, সিপি, ও সল্ফরের তুলনা হয় (৩) চেলিডোনিয়মের পরে আর্স, ল্যাই ও সল্ফ ভাল খাটে, এবং আরোগ্য সম্পূর্ণার্থে প্রায়ই আবশ্যক হয়

জিঙ্কম মেট্যালিকম।

(Zincum Metallicum)

মস্তিষ্কের ও স্নায়ুর অবসন্নতা; জীবনীশক্তির অপ্রাচুরতা, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর শক্তির অসদ্ভাব; এত দুর্ব্বলতা যে হামাদি উদ্ভেদ অথবা ঋতু প্রকাশিত হইতে পারে না, নিষ্ঠীবন, ও মূত্র ত্যাগ করিতে; এবং বুঝিতে বা মনে রাখিতে পারা যায় না।

পদদ্বয়ে ও নিম্নাঙ্গের অবিরত ও উৎকট অস্থিরতা অনুভব; সর্ব্বদা উহা সঞ্চালন করিতে হয়।

যেই ঋতু রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে সেই সকল প্রকার অসুখের নিবৃত্তি জন্যে, সর্ব্ব প্রকারেই ভাল বোধ হয় কিন্তু ঋতু বন্ধ হইলেই তখনই আবার সকল অসুখ প্রত্যাবৃত্ত হয়

মস্তিষ্কের রোগে, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত-সম্ভাবনায়; স্বাভাবিক আরোগ্য-শক্তির অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ উদ্ভেদের অবিকাশ (ক্রুপ, হাম, টিউব); মস্তিষ্ক-জ্বরে রস ক্ষরণের লক্ষণ।

শিশুকে যাহা বলা যায় সে তাহাই পুনরাবৃত্ত করে

শিশু নিদ্রায় কাঁদিয়া উঠে; নিদ্রাকালে সর্ব্বশরীরে উৎক্ষেপণ জন্মে; ভীত হইয়া জাগরিত হয়, এক-দৃষ্টে চাহিয়া থাকে, মস্তক অবলুণ্ঠন করে; তাহার মুখমণ্ডল একবার পাণ্ডুর একবার আরক্ত হয়

দন্তোদ্গম কালে, পাণ্ডুবর্ণবদন ও অল্পতাপ সহকারে

টঙ্কার (মৃগেকা), কেবল মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে উত্তাপ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু গাত্র-তাপের বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় না (বেলেডোনার বিপরীত) ; চক্ষু ঘূর্ণন ; দন্তেদন্তে সংঘর্ষণ।

হস্তদ্বয় ও মস্তকের, অথবা এক হস্ত ও মস্তকের অনৈচ্ছিক গতি। (এপেস, ব্রাই, হেলি)

উদ্ভেদ-বিলোপ ; বা ভয়প্রাপ্তি বশতঃ কোরিয়া (তাণ্ডব রোগ)।

পূর্ব্বাহ্ন ১১ টা বা ১২ টার সময় ভয়ানক ক্ষুধা (সল) ; আহারকালে অতিশয় পেটুকতা ; শীঘ্র শীঘ্র খাইতে পারা যায় না (শিশুদিগের প্রচ্ছন্ন মস্তিষ্ক-রোগ)।

শয্যায় শয়ন করিবার পরে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত, এমন কি নিদ্রাকালেও পদদ্বয়ের অতিশয় স্নায়বীয় সঞ্চালন

পদদ্বয়ের ঘর্ম্মাক্ততা, ও অঙ্গুলির নিকটে ক্ষত ; ও পাদ-ঘর্ম্মের বিলুপ্তি ; অতিশয় স্নায়বীয়তা।

বেদনাপূর্ণ নিতম্ব-বেষ্ট ([illegible]), পরে উহার বৃদ্ধি

পৃষ্ঠ-বংশের পীড়া ; সমগ্র পৃষ্ঠবংশের দীর্ঘাদাঘি জ্বালা ; পৃষ্ঠবেদনা, উপবেশনে উহার অতিশয় আধিক্য, বিচরণে হ্রাস (কোবাল্ট, পলস, রসটক্স)

পৃষ্ঠবংশের উপদাহ ; শক্তির অতিশয় অবসন্নতা।

পৃষ্ঠে স্পর্শ সহ্য হয়না (চিন-সল, টারাণ, থেরি)

কেবল পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া বসিয়া স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে পারা যায়

এক একটা পেশীর স্পন্দন ও উৎক্ষেপ (এগার, ইগ্নে)।

শরীর-সাধারণ দুর্ব্বলতা ও কম্পন ; লিখিবার সময় হস্ত কম্পন ; ঋতু-কালে হস্ত-পদের কম্প।

ঋতু-কালে কোন প্রকার গাত্রাবরণ সহ্য করিতে পারা যায় না।

উপচয় — সুরা-পানে, অল্পমাত্র পানেও অনেকগুলি লক্ষণের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি (এলম, কোন)।

উপশম — নিষ্ঠীবন ত্যাগে বক্ষোলক্ষণের ; মূত্র-ত্যাগে মূত্রাশয়ের লক্ষ-

পের; শুক্রস্রাবে পৃষ্ঠ—পশ্চাতের (মুষ্কি-কোমাট) এবং ঋতু-স্রাবে সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণের, উপশম

সম্বন্ধ — (১) উদ্ভেদ বিলোপ জনিত পেজ্জম মস্তিষ্ক-রোগে, হেলি ও টিউব জিঙ্কের সমগুণ (২) জিঙ্কের পরে ইহা ভাল খাটে, কিন্তু নক্স ভাল খাটে না (৩) জিঙ্কের সহিত ক্যাম ও নক্সের প্রতিকূল সম্বন্ধ ; জিঙ্কের পরে বা পূর্ব্বে এই দুই ঔষধ ব্যাবহৃত হয় না।

জেলসিমিয়ংম।

(Gelsemium)

বালক, বালিকা, ও যুবক-যুবতীদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ স্নায়বীয় ও স্নায়ুবাহু-প্রকৃতির নারীদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

গতিজনন-স্নায়ুর (Motor nerves) সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত সহকারে সমস্ত পেশী-মণ্ডলীর সম্যক্ শিথিলতা ও অবসন্নতা

উত্তেজনা, উৎদাহ, ও অনুভূতি শীতল ; স্ত্রী-পুরুষ উভয়জাতিরই কৃত্রিম মৈথুনজনিত স্নায়বীয় রোগ

ভয়- উত্তেজক সংবাদ ও আকস্মিক মনোভাবের মন্দফল (ইগে। আকস্মিক, আনন্দ জন্য, কফি)

মৃত্যু-ভয় (আর্স) ; সম্পূর্ণ সাহসহীনতা।

ভজনালয়ে, নাট্যালয়ে, অথবা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইলে অতিসার উপস্থিত হয় ; সাধারণের নিকট উপস্থিত হইতে বা রঙ্গমঞ্চ দর্শনে ভয় জন্মে (আর্জ্জ-না ।

সূর্য্যের উত্তাপ বা গ্রীষ্মকালের উত্তাপজনিত সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ।

– জিহ্বা, হাত, জঙ্ঘা ; ও সমস্ত শরীরের দুর্ব্বলতা ও কম্পন।

নীরবে, ও একাকী থাকিতে ইচ্ছা ; কাহারও সহিত কথা বলিতে অথবা কাহাকে নিকটে আসিতে দিতে (সে চুপ করিয়া থাকিলেও) অনিচ্ছা (ইগে)।

শিরোঘূর্ণন, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ হইতে উহার প্রসারণ (সিলি) ; শিরোঘূর্ণন সহকারে দ্বিত-দৃষ্টি (এক বস্তু দুইটী দেখা), ঝাপসা দৃষ্টি ; দৃষ্টি-বিলোপ। ও নড়িতে চাড়তে চেষ্টা করিলে মত্তবৎ অনুভব।

শিশুদিগের পতনের ভয়, ভয় বশতঃ শিশু ধাত্রীকে বা অন্য কিছু ধরিয়া থাকে (বোরা, স্যানি)

দৃষ্টি-হীনতা-পূর্ব্বক শিরঃপীড়া (কালী-বাই), ও শুভ্র মূত্রস্রাবে উহার শান্তি।

<u>পেশীর সামঞ্জস্যের বা সম-নিয়োগতার (co-ordination)</u>

<u>অসদ্ভাব</u> ; পেশীগুলি ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করে না

শিরঃপীড়া —মেরুদণ্ডের গ্রীবাদেশীয় অংশে উহার আরম্ভ ; মস্তকের উপর দিয়া বেদনার প্রসারণ কপালে ও অক্ষি-গোলকে বিদারণবৎ অনুভব (গ্লোন, সিলি, এইরূপে আরম্ভ, কিন্তু এক পার্শ্বে) ; মানসিক পরিশ্রমে। ধূম-পানে, সূর্য্যোত্তাপে ; ও মস্তক নিম্ন করিয়া শয়নে ; বেদনার বৃদ্ধি

চক্ষুর ঊর্দ্ধে মস্তকের চারিদিকে বন্ধনের ন্যায় অনুভব (কার্ব্বল-এসি, সনাফ)। মস্তকের উপরিভাগে স্পর্শ দ্বেষ

না নড়িলে চাড়লে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবে এরূপ আশঙ্কা, (নড়িলে চড়িলে রোগিণীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবে এরূপ আশঙ্কা, ডিজি)

বৃদ্ধ বয়সের ধীর (মন্দগতি) নাড়ী।

চক্ষুর পাতার অতিশয় গুরুত্ব ; উহা উন্মীলিত করিতে পারা যায় না (কষ্টি, গ্রাফ, সিপি)

জ্বরে পিপাসা-পরিশূন্য শীত, বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের উপর দিয়া শীত, ত্রিকাস্থি হইতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত দ্রুত-গতি তরঙ্গের ন্যায় পরস্পর পৃষ্ঠের উপরে ও নীচে শীতের প্রধাবন।

উপচয় —আর্দ্রকালে ঝড়-বজ্রের পূর্ব্বে ; মনোভাব বা মানসিক উত্তেজনায় ; কুসংবাদে ; তামাকের ধূমপানে ; রোগের বিষয় ভাবিলে ; এবং কাহারও মুখে নিজের অতির কথা শুনিলে ; বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—আশঙ্কিত টাইফয়েড্ জ্বরে ব্যাপ্টিসিয়ার সহিত ; এবং কুইনাইন দ্বারা প্রতিরুদ্ধ সবিরাম জ্বরে ইপিকাকের সহিত জেলসের তুলনা হয়।

টিউবারকিউলাইনম্ ব্যাসিলাইনম্। *

(Tuberculinum—Bacillinum)

যে সকল ব্যক্তির মুখাকৃতি পাতলা, নয়ন নীলবর্ণ, গৌর; যাহাদের বক্ষঃস্থল দীর্ঘ, ক্ষীণ, চেপ্টা ও অপ্রসারিত; মানসিক শক্তি অকাল পক্ক, শরীর দুর্ব্বল, এবং যাহাদের গুটিকা-ধাতু (tubercular-diathesis); তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

যখন কোন রোগীর কুল দোষে গুটিকা-রোগের (টিউবারকিউলার ডিজিজ) বিবরণ জানা যায়, এবং অত্যন্ত সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শে, তখন রোগের নাম যাহা কেন না হউক, এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রোগের লক্ষণের অবিরত পরিবর্ত্তন; ফুসফুস, মস্তিষ্ক, বৃক্ক (kidneys), যকৃৎ, আমাশয়, স্নায়ুমণ্ডল প্রভৃতি যন্ত্রের একটীর পর আর একটীর আক্রান্ততা — সহসা উহার আরম্ভ এবং সহসা বিরতি

সহজে শর্দ্দি লাগে, কি প্রকারে কোথায় শর্দ্দি লাগে তাহা জানা যায় না; "বিমল বায়ুর প্রতি নিশ্বাস গ্রহণেই" যেন শর্দ্দি লাগে এরূপ বোধ হয় (হিগ)

দ্রুত ও সুস্পষ্ট শীর্ণতা; ভালরূপে আহার করিলেও মাংসের ক্ষয়প্রাপ্তি (এব্রেট, ক্যাল্ক, কোনা, আইও, স্যাট)

বিমর্ষতা, আশাশূন্যতা, বিমর্ষতা, কোপনতা, বিরক্ত-চিত্ততা, অসন্তোষিতা; নীরবতা, নিরানন্দতা; স্বভাবতঃ মধুর প্রকৃতি কিন্তু এক্ষণে প্রায় উন্মত্ততা

গৃহের সমস্ত বস্তুই অপরিচিত বোধ হয়, যেন কোন অপরিচিত স্থানে অবস্থিতি করা যাইতেছে।

শিরঃপীড়া।—পুরাতন, ও গুটিকাজনিত শিরঃপীড়া; দারুণ তীব্র, কর্ত্তনবৎ, দক্ষিণ চক্ষু হইতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত বেদনা; বোধ হয়

* ডাঃ ফিঙ্ক ও সোয়ান ফুসফুসের পূযময় নিষ্ঠীবন হইতে এবং ডাঃ হিগ অণুবিক্ষণদৃষ্ট, ব্যাসিলাস টিউবারকিউলোসিস বিশিষ্ট, টিউবারকিউলার ফুসফুস হইতে

যেন মাথার চারিদিকে একটা লোহার পটি (iron band—লৌহবন্ধনী, লোহার আংটা) রহিয়াছে (এনাক, স্পঞ্জ); অতিশয় সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও বেদনা কেবল চাপা থাকে মাত্র।

বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের শিরঃবেদনা—অধ্যয়নে বা সমস্ত মানসিক শ্রমে বেদনার আতিশয্য, নিকটে চক্ষু রাখিয়া কার্য্য করিতে বৃদ্ধি, চশমা চোখে থাকিলেও অনুপশম; গুটিকা দোষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর বা উহার ভূমিদেশের প্রদাহ, তৎসহ রস-নিঃসরণের আশঙ্কা, রাত্রিতে ভ্রান্তদৃষ্টি (ভূত দেখা) নিদ্রা হইতে ভীত হইয়া চিৎকার পূর্ব্বক জাগরণ; যখন এপিস, হেলি বা সল্ফ সুনির্ব্বাচিত হইলেও ফলোপধায়ক হয় না।

নাসিকার জন্মগত দারুণ বেদনা বিশিষ্ট স্ফোটক সমূহের উৎপত্তি, হরিদ্বর্ণ দুর্গন্ধি পূয (সিলে)।

প্লাইকাটকোলিকা (কেশরোগ বিশেষ), বোর ও গোরি বিফল্ডে এতদ্বারা কয়েকজন রোগীর চির আরোগ্য লাভ হইয়াছিল।

অতিসার—আকস্মিক, অনিবার্য্য, ও প্রাতঃ কালে অতিবেগ (সল্ফ) ভোজনকালে আহার গ্রহণেও শরীরের শীর্ণতা প্রাপ্তি (আইও, ন্যাট); পাংশু, কটা, জলবৎ, দুর্গন্ধ মল, অতিবেগে নিঃসরণ; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম।

ঋতু—নির্দ্ধারিত সময়ের অধিক পূর্ব্বে; অতি প্রচুর; অতিরিক্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী, প্রবাহ ধীর-গতি; অথবা রক্তস্রাব সংযুক্ত; গুটিকা-দোষের ইতিবৃত্ত বিশিষ্ট; ক্যাল্ক।

ফুসফুসের, বিশেষতঃ বাম ফুসফুসের শিখর-দেশে গুটিকা সঞ্চয় (সল্ফ, সালফ থেরে)।

পামা (Eczema)—সমস্ত শরীরের উপর গুটিকাজনিত পামা; দারুণ কণ্ডুয়ন, রাত্রিতে গাত্র-বস্ত্র উন্মোচনে, ও স্নানে উহার আধিক্য; অধিক পরিমাণে সাদা সাদা ভূষির ন্যায় শল্ক পাত; কর্ণের পশ্চাতে, চুলে, চর্ম্মের বলিতে অবদরণ ও স্পর্শদ্বেষ সহ রস স্রবণ; চর্ম্মের অতিশয় আরক্ততা। দ্রষ্ট।

এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এজন্য ফিঙ্ক ও সোয়ানের ঔষধ টিউবারকিউ-লাইনম এবং হিথের ঔষধ ব্যাসিলাইনম্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে কিন্তু উভয় প্রস্তুতিই নির্ভরযোগ্য ও ফলপ্রদ।

সম্বন্ধ —(১) সলফার ও সোরিণমের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) যখন সোরি বা সলফ, অথবা অন্য কোন সুনির্বাচিত ঔষধে উপশম বা স্থায়ী উপকার দর্শেনা তখন টিউবার ব্যবহৃত হয়; হেক্টিক ও ম্যারাস্মা রোগে ধাতু-দোষ সংশোধনার্থে সোরিণমের পরে টিউবার প্রয়োজিত হয়। (৩) গুটিকা-জনিত রোগে রক্ত সঞ্চয় বা প্রদাহের তরুণ আক্রমণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। (৪) টিউবার-প্রয়োগে আরোগ্য প্রাপ্ত রোগের পুষ্টি জন্মাইবার জন্য হাইড্রাষ্টিস প্রয়োজিত হয়

টেরেবিন্থ।

(Terebinth)

মূত্রে ভায়োলেট ফুলের গন্ধ

জিহ্বার মসৃণতা, চিক্কণতা (glossy) ও আরক্ততা, যেন জিহ্বা-কণ্টক (papillæ) বিনষ্ট হইয়াছে, উন্নত জিহ্বা-কণ্টক, জিহ্বার লেপ খণ্ডে খণ্ডে উঠিয়া পড়ে; উহার নীচে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান দৃষ্ট হয়, অথবা সমগ্র লেপ সহসা পরিষ্কার হইয়া পড়ে। (সংস্ফোট জ্বরে); জিহ্বার শুষ্কতা ও আরক্ততা অগ্রভাগ জ্বালা (মিউর-এসিড সহিত তুলনা করুন)।

উদর —পেটে অত্যন্ত অনুভূতি; স্ফীততা, আধ্মান, অতিশয় আধ্মান, কূজন (কলচি)

অতিসার। জলবৎ, ঈষৎ, হরিদ্বর্ণ, আমসংযুক্ত, প্রভূত, দুর্গন্ধ, রক্তাক্ত, পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত মল; মলদ্বারে ও মলনালে জ্বালা; মল ত্যাগান্তে মূর্চ্ছা ও অবসন্নতা (আর্স)।

কৃমি শ্বাসে দুর্গন্ধ, গল রোধ (সিনা, স্পাইজি), শুষ্ক, খক্ খক্ কাস; মলদ্বারে সুড়সুড়ি; সূত্র-কৃমি, মহীলতার ন্যায় কৃমি, পটি-কৃমির (tape worms) অংশ নিঃসরণ।

রক্তমূত্র।—মূত্রের সহিত সম্যকরূপে মিশ্রিত রক্ত, কফি-চূর্ণের

ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ সরাবৃত (cloudy), ধূমল, সাগুলাল (albuminous) মূত্র ; প্রভূত, মলিন অথবা কাল, বেদনাশূন্য, মূত্র।

বৃক্কক, মূত্রাশয় (bladder), ফুসফুস, অন্ত্র (intestines), জরায়ু প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্রের রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ ; তৎসহ রক্তস্রাব এবং সাংঘাতিকতার প্রবলতা।

পার্পুরা হিমোরেজিকা ; দিন দিন নূতন নূতন বহুসংখ্যক কালশিরা (ecchymoses) (সালফ-এসি)।

বৃক্ককের বিধান-বিকারে সর্বাঙ্গীন শোথ সহ উদরী, স্কার্লেটিনার পরে শোথ (এপিস, হেলি, ল্যাক)

ক্ষতসহ অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ; গাঢ় অথবা উষ্ণ রক্তের অপকৃষ্টতা সহকারে মলিন, অপ্রাধ্য রক্তপাত।

বৃক্কক, মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গে প্রবল জ্বালাকর ও আকর্ষণবৎ বেদনা (বার্ব, ক্যান, ক্যান্থ)

মূত্রাশয়ে প্রবল জ্বালা ও কর্তনবৎ যাতনা, কুন্থন ; উদরের নিম্নভাগে অসহ্যবাধিকা ; মূত্রাশয়ের মূলদেশের স্ফীততা বশতঃ মূত্রাশয়-প্রদাহ ও মূত্ররোধ।

সাগুলাল মূত্র ; উহার তরুণ ও প্রথমাবস্থা, ছাঁচ ও উপত্বক (casts and epithelium) অপেক্ষা রক্ত ও অণ্ডলালের আধিক্য ; ডিফথিরিয়া, স্কার্লেটিনা ও টাইফয়েড জ্বরের পরবর্তী এলবুমিনুরিয়া (সাগুলাল-মূত্র)।

মূত্রে অণ্ডলাল ও রক্তের আধিক্য, কিন্তু ছাঁচের অতিশয় অল্পতা ; আর্দ্র গৃহে বাসে বৃদ্ধি।

মূত্র-কৃচ্ছ্র ; আক্ষেপিক মূত্র-রোধ।

সম্বন্ধ।—এলুমেন, আর্ম, আর্স, ক্যান্থ, ল্যাক, নাইট-এসিড সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

ম্যালেরিয়া ও আফ্রিকার জ্বরে প্রতিষেধক ঔষধ স্বরূপ ব্যবহারের বিধি আছে।

ট্যাবেকংম।

(Tabacum)

মস্তিষ্কের উপদাহ (cerebral irrita ion) হইতে উৎপন্ন রোগ, ও তৎপরে ফুসফুস পাকাশয়িক স্নায়ুর (vagi) ক্রিয়ার সুস্পষ্ট উপদাহ।

গালের ও পৃষ্ঠের শীর্ণতা

সমগ্র পেশীমণ্ডলের সম্পূর্ণ অবসন্নতা

গাত্রের বরফের ন্যায় শীতলতা ; শীতল ঘর্ম্মে আচ্ছন্নতা।

শ্বাস-কাস, সবমন শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, হাঁচি প্রভৃতি লক্ষণের আবেশে আবেশে অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিতি।

অজীর্ণ, হৃৎকম্প, ও সবিরাম নাড়ী সহকারে অতিশয় নিরাশতা

শিরোঘূর্ণন।—মৃত্যুবৎ পাণ্ডুবর্ণ, উহা বর্দ্ধিত হইয়া সংজ্ঞাশূন্যতা, বিমুক্ত বায়ুতে ও বমনে, উত্থানে অথবা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাতে ; এবং চক্ষুর উন্মীলনে, উপশম প্রাপ্তি।

প্রত্যূষে সবমন শিরঃপীড়ার উপস্থিতি, মধ্যাহ্নে উহার অসহ্যতা, নিদারুণ বিবমিষা, প্রবল বমন, শব্দ ও আলোকে বৃদ্ধি ; নির্দ্ধারিত সময়ে প্রত্যাবৃত্তি, এক বা দুই দিন স্থায়িত্ব

মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের উপর হাতুড়ি বা গদার আঘাতের ন্যায় আকস্মিক বেদনা।

ঝাপসা দৃষ্টি, যেন অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে ; মস্তিষ্কের উপদ্রব জনিত তির্য্যক্‌দৃষ্টি (trabismus)।

রেটিনা অথবা দর্শন-স্নায়ুর শীর্ণতা জনিত দৃষ্টিহীনতা।

পাণ্ডুবর্ণ, নীলবর্ণ, কুঞ্চিত, নিমগ্ন, পতনাবস্থাপন্ন, শীতল ঘর্ম্মাচ্ছন্ন ; মুখমণ্ডল (কপালে শীতল ঘর্ম্ম, ভিরে)।

বিবমিষা ; সামুদ্রিক বিবমিষার ন্যায় অবিরত বিবমিষা ; অল্পমাত্র নড়িলে চড়িলেই বমন ; তৎসহ শ্রান্তি ; বিমুক্ত বায়ুতে উপশম।

বমন।—শীতল ঘর্ম্মসহ, প্রবল বমন ; নড়িতে চড়িতে আরম্ভ

করিলেই বমন ; গর্ভাবস্থায় বমন, কার্বলিক এসিড বিফল হইলে ব্যবস্থেয় (সোরি)।

সামুদ্রিক বিবমিষা ; নিদারুণ বিবমিষা ; পাণ্ডুবর্ণ ও শীতলতা, যৎসামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং জাহাজের <u>ডেকের উপরে বিমল শীতল বায়ু সেবনে</u> উপশম।

আমাশয়-গহ্বরে ভয়ঙ্কর শ্রান্তি ও নিমগ্নতা (sinking) অনুভব।

বিবমিষা সহকারে আমাশয়ের শিথিলতা অনুভব (ইপি, ষ্টাফ)।

শিশু উদর অনাবৃত রাখিতে চায় ; উহাতে বিবমিষা ও বমনের শান্তি জন্মে ; উদরে শীতলতা (কলচি, ইলাপ্স, ল্যাক)।

কোষ্ঠ কাঠিন্য।— অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা অথবা সরলান্ত্রের পক্ষাঘাত ; মলদ্বারের মুখাবরক পেশীর আক্ষেপ ; অনেক বৎসর স্থায়ী গুহ্যভ্রংশ (Prolapsus ani) মলদ্বারের দদ্রু (herpes)।

অতিসার।—সহসা, ঈষৎ পাতলা, ঈষৎ হরিদ্রা, আঠা আঠা, সবেগ জলবৎ মলস্রাব ; তৎসহকারে বিবমিষা, বমন, অবসন্নতা ও শীতল ঘর্ম্ম (ভিরে) অত্যন্ত ক্লান্তি ; তামাক ধূমপান বশতঃ রোগের উৎপত্তি।

বৃক্কশূল।—বামদিকের মূত্র নালীর মাঝামাঝি প্রবল আক্ষেপিক বেদনা (বার্ব্ব), নিদারুণ বিবমিষা ও শীতল ঘর্ম্ম।

হৃৎকম্প।—বাম পার্শ্বে শয়নে প্রাবল্য, ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বিরতি।

নাড়ী।—দ্রুত, পূর্ণ, বৃহৎ ; ক্ষুদ্র, সবিরাম, অতিশয় মন্দ ; ক্ষীণ, অনিয়মিত, প্রায় অপ্রাপ্য ; নাড়ী।

হস্তদ্বয় বরফের ন্যায় শীতল, শরীর উষ্ণ।

জানু হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত অধঃপাদ বরফের ন্যায় শীতল ; অঙ্গের কম্পন।

উপশম।—বিমুক্ত, বিমল, শীতল বায়ু সেবনে ; ও গাত্রাবরণ উন্মোচনে উপশম।

সম্বন্ধ—তামাকের অপব্যবহারের মন্দ ফলের প্রতিকারার্থে নিম্নোক্ত ঔষধ সকল ব্যবহৃত হয়। (১) ইপি,—অত্যন্ত বিবমিষা ও বমন।

(২) আর্স,—তামাক চর্ব্বণের কুফল। (৩) নক্স—ধূমপানান্তে পরদিন প্রাতে আমাশয়িক লক্ষণ। (৪) ফস,—হৃৎকম্প, তাম্রকূট-সূচক হৃৎপিণ্ড, সঙ্গমেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য। (৫) ইগ্নে,—তাম্রকূট চর্ব্বণ জনিত বিরক্তিকর হিক্কা। (৬) ক্রিম অর, প্ল্যান্ট,—তাম্রকূট জনিত দন্ত বেদনা। (৭) সিপি,—বদনের দক্ষিণ পার্শ্বে স্নায়ু-শূল জনিত পীড়া, অগ্নিমান্দ্য পুরাতন স্নায়বীয়তা, বিশেষতঃ অব্যায়ামীদিগের। (৮) ট্যাবেকো,—অতিশয় ধূমপানজনিত ধ্বজভঙ্গ, আক্ষেপ, শীতল ঘর্ম্ম। (৯) জেলস,—অতিরিক্ত তামাকের ব্যবহার, বিশেষতঃ ধূমপান জন্য মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন। (১০) তামাক খাওয়া ছাড়িয়া দিলে যে উহা সেবনের জন্য দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে ট্যাবেকমের ২০০ শত বা সহস্র ক্রম সেবনে উহার শান্তি হয়।

ট্যারাক্সিকম।

(Tarsxacum)

আমাশয়িক ও পৈত্তিক আক্রমণ, বিশেষতঃ আমাশয়িক শিরঃপীড়া।

মানচিত্রের ন্যায় চিত্রিত জিহ্বা (ন্যাক, মার্ক, ন্যাট-মিউ); জিহ্বার উপরে শাদা শাদা পুরু পুরু পর্দা তৎসহ অবদরণ অনুভব। এই পর্দা খণ্ডে খণ্ডে উঠিয়া আইসে, তৎপরে গাঢ় লোহিত, অতিশয় স্পর্শদ্বেষ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান (Spots স্পট্‌স) অবশিষ্ট থাকে।

যকৃতের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য সংযুক্ত পাণ্ডু (মানচিত্রের ন্যায় চিত্রিত জিহ্বা)।

দুর্ব্বলতা, ক্ষুধাহীনতা, প্রভৃতি নৈশ ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ পৈত্তিক জ্বর অথবা টাইফয়েড জ্বর হইতে আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায়।

টাইফয়েড জ্বরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্থিরতা (রস, জিঙ্ক)।

উপচয় — উপবেশন; শয়ন; ও বিশ্রামকালে প্রায় সমস্ত লক্ষণের প্রকাশ,

সম্বন্ধ — আমাশয়িক ও পৈত্তিক রোগে ব্রাই, চেলি, হাইড্রাষ্ট, ও নক্সের সহিত এই ঔষধের তুলনা হয়।

ট্যারান্টিউলা।

(Tarantula)

অত্যন্ত স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ কোরিয়া রোগে সমগ্র শরীর, অথবা দক্ষিণ বাহু ও বাম জঙ্ঘা আক্রান্ত হইলে, এই ঔষধ উপযোগী (বামবাহু ও দক্ষিণ জঙ্ঘা আক্রান্ত হইলে, এগার)।

জঙ্ঘা, বাহু এবং দেহ-কাণ্ডের অবিরত সঞ্চালন, ও কোন কার্য্য করিতে অসামর্থ্য ; পেশীর স্পন্দন ও উৎক্ষেপণ।

অস্থিরতা, কোন প্রকার অবস্থানেই স্থির থাকিতে পারা যায় না ; অবশ্য নড়িতে চড়িতে হয়, যদিও হাঁটা যায় তথাপি সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি হয় (রস ও রুটার বিপরীত)।

স্পর্শাধিক্য।—অঙ্গ-সঞ্চালন উত্তেজনায় উপদাহ জন্মে, তৎপরে বিমর্ষতা উপস্থিত হয় ; হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে উহার অত্যন্ত আধিক্য থাকে।

মেরুদণ্ডের দীর্ঘাদীর্ঘ সংস্থানাস্থ স্পর্শে বক্ষঃস্থলে ও হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে আক্ষেপিক বেদনা উপস্থিত হয়

দারুণ শিরঃপীড়া ; মস্তিষ্কে যেন সহস্র সহস্র সূচীবিদ্ধ হইতেছে এপ্রকার অনুভব

ব্রণশোথ, (abscess) স্ফোটক (boils) ও আঙ্গুলহাড়া (felons) আক্রান্ত স্থানের, একপ্রকার ঈষৎ নীলবর্ণ (ল্যাক), এবং নিদারুণ জ্বালাকর বেদনা (এন্থ্রা, আর্স) ; আঙ্গুল-হাড়ার যাতনায় রোগীকে রাত্রে উঠিয়া হাঁটিতে হয়।

দূষিত ক্ষত ; কার্ব্বঙ্কল ; গ্যাংগ্রিণ

নির্দ্ধারিত সময়ে লক্ষণের প্রকাশ।

স্নায়বীয় শিরঃপীড়া গোলমাল, স্পর্শ ও উগ্র আলোকে উহার বৃদ্ধি, বালিশে মাথা ঘষিলে উপশম।

প্রতি ঋতুকালে শিরঃপীড়া, মুখ-মধ্য ও জিহ্বায় অসহ্য পরিশুষ্কতা, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় (নক্স-ম)।

উন্মাদবৎ কামোত্তেজনা ; জরায়ুর আক্ষেপ ; ভগকণ্ডূয়নে অসহ্যতা প্রাপ্তি।

উপচয়।— নড়িলে চড়িলে; ধরিলে, আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে। গোলমালে ও ঋতু-পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি।

উপশম।— অনাবৃত বায়ুতে; শীতবাষ্পে ও আক্রান্ত স্থান ঘর্ষণে হ্রাস।

সম্বন্ধ।— এপিস, ক্রোটি, ল্যাক, প্লাট, মইগেল, প্যাভা, থেরের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

স্নায়ুর শেষ প্রান্ত এতই উপদাহিত এবং অনুভূতিবিশিষ্ট হইয়া উঠে যে শান্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত কোন প্রকার ঘর্ষণের আবশ্যকতা জন্মে।

ট্রিলিয়ম পেণ্ডিউলম।

(Trillium Pendulum)

রক্তস্রাব।—প্রভূত ধামনিক ও শৈরিক রক্তস্রাব, সাধারণতঃ উজ্জ্বল, লোহিত রক্ত, নাসিকা ফুসফুস, বৃক্ক, ও জরায়ু হইতে রক্তপাত (ইপি, মিলি)

শরীরের তরল পদার্থের পচনোপক্রম

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব প্রভূত, অপ্রবল, উজ্জ্বল লোহিত রক্ত।

দন্তোৎপাটনের পর দন্ত-গহ্বর হইতে রক্তস্রাব (হেমে, ক্রিয়ো)।

ঋতু।—প্রভূত, প্রতিপক্ষে একবার, এক সপ্তাহ অথবা ততোধিক কাল অবিস্থিত, ধাতু (ব্যাপ-ফস) ; অতিরিক্ত পরিশ্রম, অথবা অনেক দূর পর্য্যন্ত অশ্বারোহণের পর উৎপাত

মূর্চ্ছাসহ প্রসবান্তিক রক্তস্রাব।

অতিরজোরোগ —প্রভূত, সবেগে নিঃসৃত উজ্জ্বল-লোহিত, রক্তপ্রবাহ ; একটু মাত্র নড়িলে চড়িলেই রজঃ নিঃসরণ (স্যাবি) ; জরায়ুর স্থান-চ্যুতি হইতে ; বিরজ কালে (Climacteric) প্রতিপক্ষে, মলিন সংযত রক্ত (প্ল্যাস, অষ্ট) ; স্রাব

রক্তকাস।—শ্লেষ্মা পূয ও রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন পরিমিত আহার, পচন, পূয়ময় নিষ্ঠীবন ও বিরক্তিকর কাস।

কুচকি ও কটি যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে এরূপ অনুভব; ত্রিকাস্থি (Sacrum) ও অনামাস্থি সংযোজক বন্ধনীগুলি (Sacro-iliac Synchondroses) বিচ্ছিন্ন হইয়া পতনের ন্যায় অনুভব, উহা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিবার ইচ্ছা; বস্তি কোটরের (pelvis) অস্থিগুলি যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ অনুভব (ইস্কিউ); তৎসহ রক্তস্রাব

বিরজাদিগের জরায়ু হইতে প্রভূত রক্তস্রাব; প্রতিপক্ষে রক্তপাত; পাণ্ডুবর্ণ;

ক্ষীণ ঝাপসা দৃষ্টি; হৃৎকম্প; কর্ণে অবরোধ ও শব্দ (চিন); আমাশয়-গহ্বরে মৃত্যুজনক নিমগ্নতা (Sinking)

সম্বন্ধ।—(১) রক্ত ও রক্তস্রাব সংক্রান্ত পীড়ায় [illegible] অনুপূরক ঔষধ (২) চিন, বেল, ক্যামোমিলা, ফিক, [illegible] ও অষ্টের সহিত সমগুণ ঔষধ।

ডল্কেমেরা।

(Dulcamara)

শ্লেষ্মা প্রধান, গণ্ডমালা-ধাতু, অস্থির, কোমল-স্বভাব ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

প্রতিশ্যায় অর্থাৎ আমবাত অথবা চর্মরোগ, শীতলতা, আর্দ্রতা, বর্ষাকাল, অথবা গ্রীষ্মকালে বাতাতপের আকস্মিক পরিবর্তন বশতঃ উহার উপস্থিতি বা বৃদ্ধি (ব্রাই)।

শীতলতা বশতঃ ঘর্মের নিরোধ হইয়া শৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে বর্দ্ধিত শ্লেষ্মা-নিঃসরণ।

আর্দ্র, শীতল, নিম্ন গৃহে বাস করা বা কার্য্য করা বশতঃ রোগ (এরাণ, আর্স, ন্যাট-স)।

মানসিক বিশৃঙ্খলা, কোন বস্তুর প্রকৃত নাম মনে করিতে পারা যায় না।

চর্ম্মের কোমলতা, শীতলতায় অতিশয় অনুভূতি, উদ্ভেদ, বিশেষতঃ শীতপিত্তের (urticaria) প্রবণতা ; রোগীর সর্দ্দি লাগিলে অথবা অনেকক্ষণ শীতলতা ভোগ করিলে শীতপিত্তাদি উৎপন্ন হয়।

কম্পজ্বর (ague), আমবাত, ও আরক্তজ্বরের (scarlet fever) পর শোথ

শোথ।—ঘর্ম্ম-লোপ, উদ্ভেদ-বিলোপ ও শীত-ভোগের পর শোথ

অতিসার।—আর্দ্রস্থানে সর্দ্দিলাগা বশতঃ, অথবা আর্দ্র কুজ্ঝটিকা-কালে ; ও উষ্ণকালের শীতলকালে, পরিবর্ত্তনে (ব্রাই) ; অতিসার।

বয়স্ক বালকদিগের সর্দ্দিজনিত মূত্রাভাব ; তৎসহ দুগ্ধবৎ মূত্র ; **খালি পায় ঠাণ্ডাজলে হাঁটায় উহার উৎপত্তি ; অনিচ্ছায় মূত্রে নিঃসরণ।**

ঋতুর পূর্ব্বে গাত্রে উদ্ভেদের উৎপত্তি (কোনা)।—অধিক ঋতুস্রাব কালে, (বেল গ্রাফ)।

সকল শরীরে শীতপিত্ত, জ্বরহীনতা ; কণ্ডুয়ন চুলকাইলে পরে জ্বালা ; উষ্ণতায় বৃদ্ধি ; শীতলতায় হ্রাস।

মস্তকের কেশাবৃত অংশে, মুখমণ্ডলে, কপালে, শঙ্খস্থলে, (temple) চিবুকে, (chin) স্থূল, কপিশ মিশ্রিত পীতবর্ণ চিপিটিকা (crusts) ; উহার ঈষৎ লোহিত বর্ণ প্রান্তভাগ, কণ্ডুয়ন করিলে রক্তপাত।

মুখ-মণ্ডলে অথবা হাতের পিঠে ও আঙ্গুলে, মাংসল, বৃহৎ, মসৃণ আঁচিল।

উপচয়।—সাধারণতঃ শীতলতায় ; শীতল বায়ুতে ; শীতল আর্দ্রকালে ; এবং ঋতু, উদ্ভেদ, ও ঘর্ম্ম বিলোপে ; বৃদ্ধি।

উপশম।—নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে উপশম (ফি র, রস)।

সম্বন্ধ।—(১) ব্যারা কার্ব্ব, ও ক্যালি সল্ফের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) এসিটিক-এসি, বেল, ল্যাকের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ। (৩) ক্যাল, ব্রাই, লাই, রস, সিপির পরে ভাল খাটে। (৪) লালা-স্রাব, গ্রন্থির স্ফীততা, বায়ুনলীভুজপ্রদাহ, অতিসার ; ঋতু-পরিবর্ত্তনে অনুভূতি, ও রাত্রিকালীন বেদনা লক্ষণে মার্কের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ ; ক্যালী সল রাসায়নিক সমগুণ। (৫) পারদের কুফলে, অথবা অপব্যবহারে ডলকেমেরা ব্যবহৃত হয়।

ডাইওস্কোরিয়া ভিলোসা।

(Dioscorea Villosa)

বৃদ্ধ বা যুবকদিগের জীর্ণশক্তির শান্ততা।

আহারান্তে আধ্মান, বিশেষতঃ চা-পায়ীদিগের, মধ্যে মধ্যে প্রবল উদরবেদনার আক্রমণ।

নাভীর নিকটে উদরে কামড়ানির ন্যায় বেদনা।

প্রবল মোচড়ান উদর বেদনা, নিয়মিত বেগে উপস্থিতি, যেন অন্ত্রগুলি সবল হস্তে ধৃত ও মোচড়ান হইতেছে

শূল-বেদনা।—সম্মুখদিকে অবনত হইলে ও শয়ন করিলে বৃদ্ধি; সোজা হইয়া দাঁড়াইলে অথবা পশ্চাদ্দিকে বক্র হইলে উপশম (কলোসিন্থের বিপরীত)।

নিদ্রাবস্থায় শুক্রস্রাব, সমস্ত রাত্রি কামিনী বিষয়ক সুস্পষ্ট স্বপ্ন (ষ্টাফি); জানুর দুর্ব্বলতা; জননাঙ্গের শীতলতা, অতিশয় নিরাশা (ষ্টাফি)।

আঙ্গুল-হাড়া, প্রথমাবস্থায় যখন তীব্র ও দারুণ বেদনা থাকে, যখন কণ্টক-ভেদবৎ বেদনা প্রথম অনুভূত হয়, নখের ভঙ্গুরতা।

প্রথম অঙ্গুলী-সন্ধির পর্য্যায়-প্রবণতা (হি·)।

উপচয়।—শয়নে; উপবেশনে; দ্বিভাঁজ হইয়া অবনত হইলে; বৃদ্ধি

উপশম।—নড়িলে চড়িলে, হাঁটা কষ্টজনক হইলেও হাঁটিলে; উপশম।

সম্বন্ধ।—কলোসি, নক্স, পড, রস, ও সিপিয়ার সহিত তুলনা হয়।

ডিজিটেলিস পার্পিউরিয়া।

(Digitalis Purpurea)

নিবৃত্ত-রজস্কাদিগের আকস্মিক উত্তাপাবেশ, তৎপরে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অনিয়মিত সবিরাম নাড়ী; অল্পমাত্র সঞ্চালনে বৃদ্ধি।

হৃৎকপাটের উপসর্গপরিশূন্য দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড।

নড়িলে চড়িলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবে রোগিণীর এপ্রকার অনুভব (কোরেন—সর্বদা না নড়িলে চড়িলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবার এপ্রকার অনুভব, জেল্‌স)

আমাশয়ে শ্রান্তি অথবা নিমগ্নত (Sinking) অনুভব ; দুর্বলতা ; অত্যন্ত অবসন্নতা ; রোগীর বোধ হয় যেন সে মরিতেছে।

সংসর্গের পর সঙ্গমাদির অতিশয় দুর্বলতা সংযুক্ত, রাত্রিকালীন শুক্রস্রাব

বক্ষঃস্থলের অতিশয় দুর্বলতা, কথাবলিতে কষ্ট হয় (ষ্টান)।

মল —অতি লঘু ভস্মবর্ণ ; বিলম্বে নিঃসৃত খটিক কার (চেলি পড) ; প্রায় শুভ্র (ক্যাল্ক, সিঙ্ক,) অনিচ্ছায় নিঃসৃত, মল

পূর্ণ, অনিয়মিত নাড়ী অতি ধীর ও দুর্বল নাড়ী ; প্রতি তৃতীয়, পঞ্চম ব সপ্তম স্পন্দনের বিরাম।

মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, মৃতকল্প অকৃতি ও নীলাভ লোহিত বর্ণ।

ত্বকের নীলাক্তত অধিকাংশ। ওষ্ঠাধর ও জিহ্বার নীলবর্ণ, নীলরোগ (Cymnosis)

চক্ষুর পাতায়, কানে, ওষ্ঠে ও জিহ্বায় শিরার স্ফীতত

বিষম, আয়াস সাধ্য, গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাস

হস্তাঙ্গুলিতে সহজে ও বরাবর ঝিঁজিলাগ।

শোথ —স্কার্লেটিনার পরবর্ত্তী ; ও ব্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ নামক রোগের শোথ ; তৎসহ মূত্রনাশ ; আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক শরীরাংশের শোথ ; হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার জনিত রোগ থাকিলে শোথ সহ মূর্চ্ছা (জরায়ুর স্পার্শ-দ্বেষ সংযুক্ত লেখে, কনভেলে)

রোগীকে সোজা বাবয়া বসাইলে বা দাড় কর ইলে মূর্চ্ছার সম্ভাবনা

উপচয়।— বসিলে, বিশেষতঃ সোজা হইয়া বসিলে, এবং নড়িলে চড়িলে, বৃদ্ধি।

*সম্বন্ধ।— সিঙ্কোনা ডিজিটেলিসের মুখ্য ক্রিয়া নষ্ট ও উৎকণ্ঠা বিবর্দ্ধিত করে।

ডিপথিরিনম্।

(Diphtherinum)

গণ্ডমাল-ধাতু-দুষ্ট এবং সোরা বা টিউবারকিউলার অর্থাৎ কফজ বা গুটিক দোষগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে গলমধ্য ও শ্বাসযন্ত্রের শৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিক্রিয়া জনিত রোগের প্রবণতায় এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

দুর্ব্বল বা অবসন্ন জীবনীশক্তিসম্পন্ন সুতরাং ডিপথিরিয়ার বিষে অত্যন্ত অনুভূতিবিশিষ্ট রোগী, প্রারম্ভ হইতেই রোগের আক্রমণের সাংঘাতিকতা (ল্যাক-ক্যান, মার্ক-সায়ে)

যাতনাহীন ডিপথিরিয়া; রোগের সম্যকরূপে কেবল বিষয়নিষ্ঠ (Objective) লক্ষণ প্রকাশ, রোগী অতই দুর্ব্বল, উদাসীন, ও অবসন্ন যে যে কোন বিষয়ের অভিযোগ করেনা; নিদ্রা বা সুপ্তি, কিন্তু ডাকিলে সহজেই জাগরিত হয় (ব্যাপ্ট, সংক্ষ) (তালুমূল ও তালুতোরণের ([illegible]) রক্তিম লোহিত বর্ণতা, কণ্ঠমূল ও জীবগ্রন্থির অতিশয় স্ফীততা, শ্বাস ও গলা, নাসিকা ও মুখ হইতে নিঃসৃত স্রাবের অতি দুর্গন্ধ; জিহ্বার অতিশয় আরক্ততা ও স্বল্প লেপাচ্ছন্নতা

ডিপথিরিয়ায় [illegible] পূর্ণ, গলিতগন্ধ বা ঈষৎ কালশিরাযুক্ত ক্ষত; গাত্রতাপ ন্যূন বা স্বাভাবিক অপেক্ষা নিম্ন, নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল, হস্তপদ শীতল; এবং রোগীর সুস্পষ্ট দুর্ব্বলতা; রোগীর চক্ষু বুজিয়া [illegible] (stupid) অবস্থায় পড়িয়া থাকা; চক্ষুর নিষ্প্রভতা ও নিস্তেজতা (ল্যাক, ব্যাপ্ট)

আক্রমণের প্রারম্ভ হইতেই নাসিকা হইতে রক্তপাত অথবা গভীর অবসন্নতা (এইল, এপিস, কার্ব-এসি); রোগের প্রায় সূচনা হইতেই হিমাঙ্গ (ক্রোটে, মার্ক-সায়ে); নাড়ীর দুর্ব্বলতা, দ্রুততা এবং জীবনী-শক্তির প্রতিক্রিয়ার অতিশয় নিম্নগতা।

বেদনা ব্যতীত গলাধঃকরণ করা যায় বটে, কিন্তু তরল পদার্থ বমন বা নাকদিয়া নিঃসরণ হইয়া পড়ে, শ্বাসের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ

স্বরযন্ত্রের ডিপথিরিয়ায় ক্রোট, কালী-বাই, বা ল্যাক-ক্যান বিফল হইলে; এবং ডিপথিরিয়ার পরবর্তী পক্ষাঘাতে, কষ্টি, জেল, বিফল হইলে; ডিপথিরিণ ফলপ্রদ

যখন প্রথম হইতেই রোগীর বিশুদ্ধির সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, এবং অত্যন্ত সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শে, তখন এই ঔষধের প্রয়োগ হয়

ডাঃ এলেন পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত উপরোক্ত লক্ষণ গুলি এই ঔষধের নির্ভর যোগ্য পরিচালক লক্ষণস্বরূপ অবলম্বন করিয়া উহাদের আরোগ্য সাধন করিয়াছেন।

সকল রোগজ-ঔষধের ন্যায় ইহাও ত্রিংশ শক্তির নীচে চিকিৎসায় কার্য্যকর নহে। শক্তির আধিক্যে ইহার আরোগ্য-কারিতা বিবর্দ্ধিত হয় দুইশত শক্তি হইতে সহস্র ■ লক্ষ শক্তিতে ইহার ব্যবহার হয় এই ঔষধের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন ও অবিধেয় আদত এন্টিটক্সিনের ন্যায় হোমিওপ্যাথিক ক্রমে ইহা হইতে কোন প্রকার বিপজ্জনক পরিণাম জন্মে না।

পঁচিশবৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে ডাঃ এলেন বলেন যে প্রতিষেধক ঔষধস্বরূপও ডিপথিরিণ সুন্দর কাজ করে। এক পরিবারের একজনের ডিপথিরিয়া হইলে অন্যেরা এই ঔষধ ব্যবহারে রোগ-মুক্ত থাকে।

ড্রোসেরা রোটণ্ডিফোলিয়া।

(Drosera Rotandifolia)

হুপশব্দক-কাস; প্রবল আবেশ, একটির পর ■ পরটির শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিতি, প্রায় শ্বাস ছাড়িতে পারা যায় না (পূর্ব্বাহ্ণ ৬ ৭ টার সময় জাগরণ, যে পর্য্যন্ত না খানিকটা দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা উত্থিত হয় সে পর্য্যন্ত কাসের অবিরতি, —কক-ক্যাক্ট; প্রতি কাসের আবেশকালে নাকদিয়া অধিক রক্তপাত, ইও; দিবাভাগে শুষ্ক, ক্লান্ত ও ঝনঝনে কাস, রাত্রিতে সুনিশ্চিত হুপ শব্দক কাসের আবেশ, কোরে-রুব)।

গভীর-শব্দ, স্বরভঙ্গ সংযুক্ত কুকুর-রববৎ কাস (বার্ব্ব), দুইপ্রহর রাত্রির পর হামের আক্রমণ-কালে বা তৎপরে বৃদ্ধি; আক্ষেপিক গলরোধকর, এবং বমনোদ্যম ও বমন বিশিষ্ট কাস (ব্রাই, কালী কা)।

বালক-বালিকাদিগের অবিরত, গল-কণ্ডূয়নকর কাস, রাত্রিতে বালিশে মাথা রাখিবামাত্র উহার আরম্ভ (বেল, হাইওস, রুম)।

যক্ষ্মা রোগে যুবক-যুবতীদিগের প্রাতঃকালীন কাস এবং সবুজবর্ণ অথবা পুযময় নিষ্ঠীবন।

কাস; উষ্ণতায়, শয়নে, পানে, হাস্যে, কথনে, <u>শয়নে,</u> ও আহারাদির পরে কাসের বৃদ্ধি।

কাশিতে কাশিতে জল ও শ্লেষ্মা বমন এবং অনেক সময় নাক মুখ দিয়া রক্ত পতন (কুপ্র)।

স্বরযন্ত্রে পালক থাকার ন্যায় অনুভব; উহাতে কাসের উদ্রেক।

বহুব্যাপক হুপিং-কাসের সময়ে অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব।

ধর্ম্মাচার্য্যদিগের গলাবেদনা; গলগহ্বরের গভীর স্থানে খস্‌খসে-স্পর্শতা (rough) অবস্থান ও শুষ্কতা অনুভব; ভগ্ন, গভীর, শক্তিশূন্য স্বর, কথা বলিতে পরিশ্রমের আবশ্যকতা (ড্রস)।

স্বরযন্ত্রে আকুঞ্চন ও সুড়সুড়ি অনুভব, স্বরভঙ্গ, পীতবর্ণ, অথবা হরিদ্বর্ণ নিষ্ঠীবন।

হুপিং-কাসের পরে স্বরনালীর যক্ষ্মা (Laryngeal phthisis) (বায়ুকোষ-ভুজের প্রতিক্রিয়ায়, কার্ব ভ্যাজ)

সম্বন্ধ —(১) সাত্ত্বিক ও শক্তিত অনুপানক দ্রব্য। (২) ক্যাম্ফর সেবনের পরে ড্রোসেরা ভাল খাটে (৩) ড্রোসেরার পরে ক্যাল্ক, পাল্স, সল্ফ ব্যবহৃত হয় (৪) আলোপ্যাথি মতে চিনি, কোনাইন, কুপ্রম, হিং, এগুলির সহিত ড্রোসেরার তুলনা হয়। যক্ষ্মা রোগের আবরাম, দম্ভাতাদাম, দুর্বলতা অনেক সময়ে এই ঔষধে উপশমিত হয়।

হানিম্যান তাঁহার মেটিরিয়ামেডিকা পিউরা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে ৩০ শক্তির একমাত্রা মাত্র ড্রোসেরা সেবনে বহুব্যাপী হুপ খক্‌-কাস সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। সাত আটদিনের মধ্যে নিশ্চিতরূপে আরোগ্য জন্মে। প্রথম মাত্রার অব্যবহিত পরে দ্বিতীয়মাত্রা কখনও দিতে নাই; উহাতে যে কেবল প্রথম মাত্রার সুফল রহিত হয় এমন নহে, অধিকন্তু রোগীর অপকার হইয়া থাকে।

থুজা অক্সিডেণ্ট্যালিস।

(Thuja Occidentalis)

রস-প্রধান-ধাতুতে অর্থাৎ যাহাদের শরীরে সাইকোসিস-বিষ (প্রমেহ দোষ) আছে তাহাদের পক্ষেই থুজা বিশেষ উপযোগী।

সলফারের সহিত "সোরা দোষের" অথবা মারকিউরির সহিত উপদংশবিষের যে সম্বন্ধ সাইকোসিস-দোষের সহিত থুজারও সেই সম্বন্ধ।

ত্বকে বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে আঁচিল, উপমাংস প্রভৃতি উৎপন্ন হইলেই বীজে সাইকোসিস-দোষ আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

লসিকা-প্রধান (Lymphatic) ধাতুতে, অতিশয় মাংসল দেহে, ও মলিনবর্ণ মুখাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ কেশ, এবং অসুস্থ ত্বক বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শরীরে থুজার ভাল ক্রিয়া দর্শে।

গো-বীজেটিকা গ্রহণের কুফল (এণ্ট-টার্ট, সিলি); এবং বিলুপ্ত কিংবা কুচিকিৎসিত প্রমেহের মন্দ ফল (মেড)।

যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি পার্শ্বে রহিয়াছে, আত্মা ও দেহ যেন পৃথক্ হইয়াছে; উদরে যেন কোন জীবন্ত প্রাণী রহিয়াছে যেন কোন দৈবশক্তির প্রভাব জন্মিয়াছে; এই প্রকার স্থায়ী মনোভাব।

উন্মাদিনী নারীরা স্পর্শ করিতে বা নিকটে যাইতে দেয়না

চক্ষু নিমীলন করিবার সময় শিরোঘূর্ণন

শিরঃপীড়া —মস্তক-প্রাচীরের অস্থিতে (parietal bone) যেন পেরেক বিদ্ধ হইতেছে (কফি, ইগ্নে); অথবা যেন ব্যথিত স্থানে একটা ব্যুব্জ (convex) বুতাম প্রচাপিত হইতেছে; এরূপ শিরঃপীড়া অধিক ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগে; অতিরিক্ত উত্তাপ লাগাতে; ও চা-পানে (সেলে), উহার বৃদ্ধি মাযব-দোষ বা উপদংশ-দোষ হইতে উৎপন্ন পুরাতন শিরঃপীড়া

শাদা সশল্ক খুস্কি (dandruff), কেশের শুষ্কতা ও পতন।

চক্ষু —নবজাত শিশুদিগের মাযব-দোষ বা উপদংশ-দোষ জনিত চক্ষু-প্রদাহ; আঁচিল বা ফোস্কার ন্যায় বড় বড় উৎসাদন (granulations) উষ্ণতায় ও আচ্ছাদনে মন্দাবস্থাপ্রাপ্তি ; অনাবৃত রাখিলে বোধ হয় যেন শীতল বায়ুর স্রোত উহার অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

অক্ষি-পুট —রাত্রিতে চক্ষুর পাতার সংযোজন; উহার প্রান্তদেশের শুষ্কতা ও সশল্কতা; অঞ্জনি ও পক্ষার্ব্বুদ (tarsal tumors); স্থূল, শক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপমাংসের ন্যায় গ্রন্থিবৎ, কঠিন আঁচিল; ষ্টাফিসেগ্রিয়া প্রয়োগে আংশিক উপশম, কিন্তু অনারোগ্য।

কর্ণ —পুরাতন কর্ণ প্রদাহ পচা মাংসের ন্যায় পূযস্রাব; উৎসাদন, অঙ্কুরজ্জ্ বাড়, কোষাময়, সহজে রক্তস্রাবী বহুপাদ (polypus)

পুরাতন প্রতিশ্যায় (catarrh) —সস্ফোট জ্বরের পরবর্ত্তী, গাঢ় সবুজবর্ণ শ্লেষ্মা, পূয ও রক্তস্রাবী (পলস), প্রতিশ্যায়

দন্তের মূলদেশের ক্ষয়প্রাপ্তি কিন্তু শিখরদেশের সুস্থতা (মেজ —প্রান্তভাগের ক্ষয়প্রাপ্তি, ষ্টাফ); দন্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, পীতবর্ণ ধারণ করে (সিফি)

রাণুলা। জিহ্বার নিম্নস্থ আর্ব্বুদের ঈষৎ নীলবর্ণ অথবা জিহ্বার উপরের ও মুখ-বিবরের শিরার স্ফীততা (এম্ব)

চা-পান জনিত দন্ত বেদনা।

"নাকে ফোঁৎ করিলে ক্ষয়-প্রাপ্ত দন্তের গহ্বরে বা উহার পার্শ্বে (কিউরেণ) প্রাচপনবৎ বেদনা" —বিভিন বোয়েণ

উদর।—উদরে যেন কোন জন্তু ডাকিতেছে; সজীব কিছু যেন নড়িতেছে / বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে (left ovarian region), হাঁটিবার বা ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইবার সময় যন্ত্রণাপ্রদ, জ্বালাকর বেদনা, তজ্জন্য অবশ্য বসিয়া বা শুইয়া পড়িতে হয় (ক্রোক, অষ্ট); প্রতি শ্বাস-কালে আধিক্য।

কোষ্ঠবদ্ধতা —সরলান্ত্রে প্রবল বেদনা বশতঃ মল-ত্যাগ চেষ্টায় স্থগিত হইতে হয়; মল খানিকটা বাহির হইয়া পুনর্ব্বার ভিতরে প্রবেশ করে (স্যানি সিলি)

অর্শ-বলির স্ফীততা, বসিবার সময় বেদনার অত্যন্ত তীব্রতা।

অতিসার —প্রত্যূষে উপস্থিত, অধিক বায়ুসহকারে সবেগে নিঃসৃত (এলো); ও পিপা হইতে জলপতনের ন্যায় গলগল শব্দবিশিষ্ট, অতিসার; প্রাতরাশ, কফিপান, বসাক্ত দ্রব্য আহার, গো-বীজে টীকা-গ্রহণ, ও পলাণ্ড ভোজনে উহার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি।

মল-দ্বারের বিদারণ (fissured), স্পর্শে বেদনাযুক্ততা, চারিদিকে চেপ্টা আঁচিল, বা আর্দ্র শৈল্মিক উপমাংস (condylomata)।

অপত্য-পথের (vagina) অত্যন্ত অনুভূতি বশতঃ সংসর্গের প্রতিবন্ধকতা (প্লাট)। – পরিশুষ্কতা বশতঃ প্রতিবন্ধকতা লাইকো, লাইসিন)।

চর্ম — চর্মের মলিন দৃশ্য, স্থানে স্থানে কপিশ বা কপিশমিশ্রিত শ্বেত চিহ্ন; বৃহৎ, সবৃন্ত, বীজাল (seedy), আঁচিল (ষ্ট্যাফ); কেবল আবৃত স্থানে উদ্ভেদ, চুলকাইলে জ্বালা।

মাংস, অস্থি হইতে আঘাতিতবৎ অনুভূত হয় (ব্রাইও। টানিয়া তোলাবৎ অনুভূত হয়-রাস্,)

মূত্র-ত্যাগান্তে মূত্র মার্গে যেন মূত্র ফুড় ফুড় করিয়া ঝরিতেছে এপ্রকার অনুভব, মূত্রত্যাগের শেষ ভাগে তীক্ষ্ণ কর্তনবৎ যাতনা (সার্সা)।

উরুদ্বয়ে জ্বরের শীতের আরম্ভ।

ঘর্ম।—কেবল অনাবৃতস্থানে, অথবা মস্তকব্যতীত সর্বশরীরে (সিলিশিয়ার বিপরীত) ঘর্ম; নিদ্রাকালে ঘর্ম, জাগ্রৎ হইলে উহার বিরতি (স্যাম্বুক বিপরীত), রজনীতে প্রচুর অম্ল গন্ধ ও দুর্গন্ধ ঘর্ম।

জননাঙ্গে মধুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম। হাঁটিবার সময় অঙ্গগুলি কাষ্ঠনির্মিতবৎ বোধ হয়। শরীর, বিশেষতঃ অঙ্গগুলি যেন কাচনির্মিত এবং সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইবে, এপ্রকার অনুভব।

বিলুপ্ত প্রমেহ - প্রমেহের স্রাব অবরুদ্ধ হইয়া সংবাত, প্রষ্টেটের প্রদাহ; সায়ক দোষ, ধ্বজভঙ্গ উপমাংস ও অন্যবিধ বহুল সংস্থানীন উপসর্গের উৎপত্তি নখের বিকৃতি ও ভঙ্গুরতা (এন্টি-ক্রুড)

উপচয় — রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে; পূর্বাহ্ণ ৩টা ও অপরাহ্ণ ৩টার সময়; শীতলতায়, আর্দ্রবায়ুতে ও মাদক দ্রব্যে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—(১) মেড, স্যাব, ও সাইলির সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) ক্যান-স্যাট, ক্যান্থ, কোপে, ষ্ট্যাফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (৩) উপস্থের মুণ্ডাবরক ত্বকের (prepuce) আঁচিলে সিনাব, থুজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) মেড, মার্ক, ও নাই-এসিড পরে থুজা ভাল খাটে।

থেরিডিয়ন।

(Theridion Curassavicum)

সময় অতিশয় শীঘ্র শীঘ্র অতীত হয় এরূপ অনুভব (অতি ধীরে ধীরে, আর্জ্জ-নাই, ক্যান-ইণ্ড, নক্স ম)

শিরোঘূর্ণন —চক্ষু বুজিলে (ল্যাক ভুজা, চক্ষু মেলিলে, ট্যাব; উপরের দিকে চাহিলে, পল, সিপি) যে কোন মৎসামান্য শব্দ হইতে; শিরো ঘূর্ণন কর্ণ রোগ সংক্রান্ত শিরো ঘূর্ণন

বিবমিষা —অত্যল্প মাত্র সঞ্চলনে বিশেষতঃ চক্ষু বুজিলে; ও দ্রুতবেগে গাড়ীতে চড়িলে। বিবমিষা

শিরঃপীড়া।—নড়িতে আরম্ভ করিলে চক্ষুর পশ্চাতে গুরুভার সদৃশ; মস্তিষ্কের গভীর স্থানে প্রবল; শয়নে বর্দ্ধিত (ল্যাক); এবং অন্যেরা গৃহে হাঁটিলে অথবা অল্পমাত্র মস্তক নাড়িলে অতিশয় বর্দ্ধিত; শিরঃপীড়া।

প্রত্যেক শব্দ যেন সমগ্র শরীরের অভ্যন্তর দিয়া প্রবিষ্ট হয় এপ্রকার অনুভব এবং উহাতে বিবমিষা ও শিরোঘূর্ণনের উৎপত্তি।

নাসিকার পুরাতন প্রতিশ্যায়; গাঢ়, পীতাভ, হরিতাভ, দুর্গন্ধ স্রাব (পলস, থুজা)।

দন্ত বেদন; প্রত্যেক তীব্র শব্দ দন্তে প্রবিষ্ট হয়।

স্নায়বীয়া রমণীদিগের সামুদ্রিক বিবমিষা; জাহাজের গতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত উহারা চক্ষু রুদ্ধ করিয়া রাখে, এবং নিদারুণ বিবমিষায় আক্রান্ত হয়

বক্ষাস্থির নীচে, ঘাড় পর্য্যন্ত প্রসারিত, বাম বক্ষের উর্দ্ধভাগে প্রবল সূচীবেধন (এসিস, মাইরি, পিক্স, সল্ফ)

সমুদয় অস্থির উপর ভগ্নবৎ বেদনা।

কশেরুকা (vertebræ) ব্যবধান স্থানে অতিশয় অনুভূতি, মেরুদণ্ডে চাপ না লাগে এজন্য হেলান না দিয়া এক পার্শ্বে বসা (চিন-সল); অল্পমাত্র শব্দে ও ঘরের মেজেতে পায়ের সংঘর্ষণে উহার বৃদ্ধি

বয়স্থাবস্থায়, গর্ভাবস্থায় এবং বিবজাবস্থায় (climacteric years) অত্যন্ত স্নায়বীয় অনুভূতি।

রেকাইটিস, কেরিজ, ও নিক্রোসিস রোগে পেরিরিওষ্টম রোগের মূলদেশে প্রবিষ্ট হইয়া উহার কারণ বিনষ্ট করে।

থাইসিস ফ্লোরিডা রোগে প্রাবস্থাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে অনেক সময় এতদ্দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়।

গণ্ডমালা রোগে, সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও উপকার না দর্শিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

সম্বন্ধ।—ক্যাল্ক এবং লাইকোপডের পরে এই ঔষধ ভাল খাটে।

থ্ল্যাস্পি বার্সা পেষ্টোরিস।

(Thlaspi Bursa Pastoris)

শরীরের প্রত্যেক দ্বার হইতে প্রভূত শৈথিক রক্তস্রাব, রক্ত মলিন ও সংযত।

জরায়ুর রক্তস্রাব—সংযত খণ্ড ও জরায়ুজ উদর-বেদনা সহ, হরিৎপাণ্ডু (chlorosis) রোগে, গর্ভপাত, গর্ভস্রাব বা প্রসবের পরে; নিরজ কালে জরায়ুর ক্যানসার সহকারে রক্তস্রাব (ক্রম, অষ্ট)

ঋতু।—নিয়মিত কালের অনেক পূর্ব্বে, অতিশয় অধিক পরিমাণে, অধিক দিন পর্য্যন্ত (আট, দশ, পনর দিন), আস্তে আস্তে আরম্ভ, প্রথম দিন কেবল চিহ্ন মাত্র; দ্বিতীয় দিন উদর বেদনা, বমন ও বড় বড় খণ্ড সংযুক্ত, রক্তস্রাব, এক পর্য্যায়ের পর অপর পর্য্যায়ে অধিকতর রক্তপাত।

জরায়ুর নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ রক্তস্রাব অথবা ঋতুর বিলম্ব, উহাতে অবসন্নতা জন্মায়, ঋতুর এক পর্য্যায় না যাইতে যাইতেই অপর পর্য্যায় উপস্থিত হয়।

প্রদর।—রক্তাক্ত, মলিন বর্ণ, দুর্গন্ধ স্রাব; ঋতুর কয়েক দিন পূর্ব্বে ও পরে উহার উপস্থিতি।

সম্বন্ধ — সিনাপিস, ট্রিফিয়ম, ভাইবারনম ও অষ্টিলেগোর সহিত এই ঔষধের তুলনা হয়।

নক্সভমিকা।

(Nux Vomica)

কৃশদেহ, কোপনস্বভাব, কৃষ্ণকেশ, পিত্ত-প্রধান, বা রক্ত-প্রধান ধাতু, বিবাদ প্রিয়, হিংসা দ্বেষ প্রবণ, বিমর্ষ ব্যক্তিদিগের পক্ষে নক্সভমিকা বিশেষ উপযোগী।

সূক্ষ্মকায়, কোপন-স্বভাব, স্নায়বীয় প্রকৃতির মদ্যপায়ীদিগের অগ্নিমান্দ্য ও অর্শ-প্রবণতা থাকিলে, (লঘুকেশ, লাবণ্যময় ব্যক্তিদিগের পক্ষে লোবে)

হানিমান বলেন যে অধীরতা কোপনতা, হিংসা দ্বেষ, অথবা প্রতারণতা প্রবণতা ও ব্যগ্রতা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে নক্সভমিকা ভাল খাটে।

কোপনতা সংযুক্ত উৎকণ্ঠা ও আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি, কিন্তু মরিতে ভয়।

বিষাদবায়ু : অধ্যয়নশীল, সাহিত্যিক, যাঁহারা অধিক সময় বাড়ীতে থাকেন, অব্যায়াম বশতঃ পীড়িত হন যাঁহাদের আমাশয়িক ও উদরের উপসর্গ এবং কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে ; বিশেষতঃ মদ্যপায়ীদিগের পীড়ায় এই ঔষধ কার্য্যকরী।

বাহ্য সংস্কারে ; গোলমালে ; গন্ধে ; আলোকে বা গীতবাদ্যে (নক্স-ম); অতিরিক্ত অনুভূতি ; সামান্য অসুখেরও অসহ্যতা (ক্যাম ; প্রত্যেকটি নির্দ্দোষ কথায় বিরক্তি (ইগ্নে)।

বিশিষ্ট ও সাবধান ব্যক্তি, যাঁহারা অতি সহজেই উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন; খিটখিটে ও নাছোড়বান্দা লোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কফি, তামাক, উত্তেজক পানীয় দ্রব্য, অধিক মসলাযুক্ত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ ; অপরিমিত আহার (এন্ট-ক্রু) ; অধিক দিন ব্যাপী অতিরিক্ত মানসিক-

শ্রম, বসিয়া বসিয়া থাকিবার অভ্যাস, নিদ্রাহীনতা (কফ, কলচি, নাই-এসি), সুগন্ধি দ্রব্য বা পেটেন্ট ঔষধ ব্যবহার, বিশেষতঃ উষ্ণকালে শীতল প্রস্তরের উপরে উপবেশনের মন্দফল

এলোপ্যাথি বা কবিরাজী চিকিৎসায় উগ্রবীর্য্য ঔষধাদি সেবনের পর কোন রোগীর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে অনেক সময় প্রথমেই নক্স ভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকিলে ব্যবহার করা বিধেয় নহে।

চৈতন্য সংযুক্ত টঙ্কার (ষ্ট্রীক); ক্রোধ, চিত্ত-বিকার, স্পর্শ, ও সঞ্চলনে উহার বৃদ্ধি।

খাঁখি লাগার মত, ও পাড় মাবার মত, অবিরাম বেদনা, নাড়লে চড়িলে ও স্পর্শ করিলে উহার আধিক্য

গন্ধে, প্রাতঃকালে, আহারান্তে, প্রত্যেক প্রসব বেদনার পরে, মূর্চ্ছার প্রবণতা (নক্স ম, সলফ)।

সময়ে শয়নের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে, যখন বসিয়া থাকা যায় তখন ঘুমাইয়া পড়া যায় না, এবং রাত্রি ৩টা বা ৪টার সময় জাগরিত হয়; শেষে প্রভাত হইবার কালে আবার এক প্রকার স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা জন্মে উহা হইতে রোগীকে সহজে জাগরিত করিতে পারা যায় না, তৎপরে তাহার ক্লান্তি ও দুর্বলতা জন্মে (পলসেটিলার বিপরীত)

প্রতিশ্যায়:—শিশুদিগের নাসারব (এম-ক, স্যাম্ব); রাত্রিতে শুষ্ক, দিবাভাগে তরল প্রতিশ্যায় (co y২১), উষ্ণ ঘরে বিবর্দ্ধিত, শীতল বায়ুতে উপশমিত, শীতল স্থানে ও প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়িতে বসিয়া উৎপন্ন; প্রতিশ্যায়।

উদ্গার -অম্ল, তিক্ত উদ্গার, ওপ্রকুন্তাসহ প্রতিদিন প্রাতে বিবমিষা ও বমন; আহারান্তে উদ্গার

বিবমিষা —আহারান্তে; প্রাতে; ও ধুম-পানান্তে; অবিরাম বিবমিষা; রোগী বলে যে বমন করিতে পারিলেই সে ভাল থাকিতে পারে।

আমাশয়।—আহারের এক বা দুই ঘণ্টা পরে আমাশয়ে প্রস্তর-চাপার ন্যায় চাপ অনুভব (আহারের অব্যবহিত পরে, কালী-বাই নক্স-ম); মুখে জল-উঠা, আমাশয়ের অশিথিলতা, কাপড় ঢিলা করিয়া দিতে হয়; আহারের

পরে দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিতে পারা যায় না, আহারান্তে নিদ্রালুতা, উৎকণ্ঠা। বিরক্তি, [illegible] সেবন, কফি পান, উগ্র ঔষধ সেবন, রাত্রি জাগরণ, ভোজন-বিলাস প্রভৃতি কারণে এই সকল লক্ষণের উৎপত্তি।

কোষ্ঠবদ্ধতা; বারবার নিষ্ফল মল-প্রবৃত্তি, অল্প অল্প মল-নিঃসরণ, (উদরোর্দ্ধে—উপরে দিকে) যেন মলত্যাগ শেষ হইল না এরূপ অনুভব।

বারবার মল প্রবৃত্তি; উৎকণ্ঠা ও নিষ্ফলতা, মলক্রিয়ার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত উহার আতিশয্য; প্রাতে উত্থানের পর; ও মানসিক পরিশ্রমের পর উহার উপস্থিতি (নিশ্চেষ্টত ও অপর্য্যাপ্ত, [illegible], সলফ)।

যাঁহারা চিরজীবন বিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া থাকেন তাঁহাদের পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠ কাঠিন্য ও অতিসার (সল, ভিরে)।

ঋতু।—নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, অতি রক্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী ঋতু; অথবা প্রারম্ভে [illegible] অধিক দিন স্থায়ী ঋতু; প্রতি পক্ষে পক্ষে ঋতু, ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে কখনও ঋতু উপস্থিত হয় না; ঋতু একবার থামে আবার উপস্থিত হয় [illegible]

প্রসব-বেদনা।—প্রবল, [illegible] প্রসব-বেদনা; উহাতে মল-বেগ বা মূত্র-বেগের উৎপত্তি; পৃষ্ঠে বেদনার আধিক্য; শুইয়া থাকার ইচ্ছা।

আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি ( ), বিশেষতঃ নাভী দেশীয় অন্ত্র-বৃদ্ধি।

পৃষ্ঠ-বেদনা।—হীনাঙ্গ বোধ বা ক্লান্তি হইতে উৎপন্ন কটিবেদনা; ও পৃষ্ঠ-বেদনা, শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে উঠিয়া বসিয়া পার্শ্ব ফিরাইতে হয়।

শীতলতায় বা শীতল বায়ুতে অত্যবৃদ্ধি; অত্যল্পমাত্র নড়িলে চড়িলেই শীতানুভব; অনাবৃত হইলেই শীত, জ্বরের শীতোত্তাপ ও ঘর্ম্ম প্রত্যেক অবস্থায়ই আবৃত থাকিবার আবশ্যকতা।

জ্বর।—অতিশয় উত্তাপ, সর্ব্ব শরীরের জ্বালাকর উত্তপ্ততা (একন), মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা (বেল), কিন্তু তথাপি রোগী নড়িলে চড়িলে বা অনাবৃত হইলে শীত অনুভব করে।

উপচয়—প্রাতে; রাত্রি ৪টার সময় নিদ্রা হইতে জাগিয়া, মানসিক পরিশ্রমে; আহারান্তে বা অতিরিক্ত আহারে; মদ্য। তামাকে; মাদক দ্রব্য সেবনে; স্পর্শে, শব্দে ও ক্রোধে এবং শুষ্ককালে বৃদ্ধি।

উপশম।—সায়াহ্নে; বিশ্রামে শয়নে এবং আর্দ্রকালে; কাস (কষ্ট)।

সম্বন্ধ।—(১) প্রায় সকল রোগেই সলফারের সহিত নক্সভমিকার অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) জিঙ্কের সহিত নক্সের প্রতিকূল সম্বন্ধ; জিঙ্কের পূর্ব্বে বা পরে নক্স ব্যবহৃত হয়না। (৩) আর্স, ইপি কক, সিপি, সলফের পরে নক্স ভাল খাটে। (৪) নক্সের পরে ব্রাই; পলস সলফ ভাল খাটে। (৫) শরীর ও মনের বিশ্রাম-সময়েই নক্সভমিকার ভাল ক্রিয়া দর্শে, এজন্য শয়ন করিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহা সেবন করা উচিত

নক্স-মস্কেটা।

(Nux moschata)

স্নায়বীয়, শুষ্কধাতু প্রকৃতির ([illegible]) নারী, ও বালক-বালিকাদিগের পক্ষে যাহাদের শুষ্ক ত্বক অর্থাৎ যাহাদের কদাচিৎ ঘর্ম্মস্রাব হয়, তাহাদের পক্ষে এবং গর্ভাবস্থার অসুখে, নক্সমস্কেটা বিশেষ উপযোগী

বৃদ্ধ বয়সের দুর্ব্বলতা, বৃদ্ধদিগের অগ্নিমান্দ্য

আলোক; শ্রবণ; গন্ধ; ও স্পর্শে অতিশয় অনুভূতি

সকল রোগের সহিতই তন্দ্রালুতা ও নিদ্রালুতা (এন্ট-টাট, ওপি) অথবা সামান্য বেদনায়ও মূর্চ্ছার প্রবণতা (হিপ); রোগে নিদ্রালুতার উৎপত্তি করা।

সুপ্তি ও অচৈতন্য; অদম্য নিদ্রা

বিমনস্কতা চিন্তা করিতে পারা যায় না সকল বিষয়েই অতিশয় ঔদাস্য।

স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা বা বিলোপ (এনাক, ল্যাক-ক্যান, লাই)।

পঠন, লিখন, ও আলাপনে চিন্তার বিলোপ প্রাপ্তি, ভুল কথার ব্যবহার; সুপরিচিত পথ চিনিতে না পারা (ক্যান-ইণ্ড, গ্ল্যাক)।

পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি, একবার হাস্য, পরক্ষণেই ক্রন্দন (ক্রোক, ইগে)। গাম্ভীর্য্য হইতে প্রফুল্লতা, প্রফুল্লতা হইতে গাম্ভীর্য্যে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন (প্লাটি)।

চক্ষুর শুষ্কতা, এত শুষ্কতা যে অক্ষিপুট বন্ধ করা যায় না।

মুখ-বিবরের অতিশয় পরিশুষ্কতা (এপিস ব্যতীত) জিহ্বার এত শুষ্কতা যে উহা তালুকায় সংলগ্ন হইয়া থাকে; যেন তুলার ন্যায় বোধ হয়, গলার শুষ্কতা; তৃষ্ণা, পিপাসাভাব (পল্স)।

প্রকৃত পিপাসা ও জিহ্বার শুষ্কতা ব্যতীতও জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা অনুভব

যে সকল অঙ্গে ভর দিয়া শয়ন করা যায় তাহার অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ (ব্যাপ্ট পাইরো ;) শয্যাক্ষত জন্মিবার সম্ভাবনা।

অল্প কিছু অতিরিক্ত আহার করিলেই শিরঃপীড়া জন্মে। আহার-কালে অথবা আহারের অব্যবহিত পরে আমাশয়ে বেদনা, পূর্ণতা ও যাতনা (কালী-বাই)

প্রত্যেকবার আহারের পরে উদরের অতিশয় স্ফীততা।

অতিসার গ্রীষ্মকালে শীতল পানীয় দ্রব্য সেবন করাতে; শরৎকালের এপিডেমিকে শাদা মল নিঃসৃত (কং চি); আমদেওয়া দুগ্ধপান বশতঃ; দন্তোদগম-কালে; গর্ভ-কালে অতিসার, তৎসহ নিদ্রালুতা ও মূর্চ্ছা। শরৎকালে শুভ্রবর্ণ, দুর্গন্ধ ব্যাপক অতিসার (কলচি)

প্রতি ঋতু কালে, বিশেষতঃ নিদ্রার সময় মুখমধ্য, গলমধ্য, ও জিহ্বার অসহ্য শুষ্কতা।

ঋতুর পরিবর্ত্তে প্রদর স্রাব (কক); শুষ্ক জিহ্বা সহকারে নিদ্রা হইতে জাগরণ (ল্যাক), বায়ু বা বাষ্প সঞ্চয় বশতঃ জরায়ুর স্ফীততা (ল্যাক-ক্যান, ল্যাং)

বায়ুর প্রতিকূল দিকে হাঁটাতে সহসা স্বর-ভঙ্গ (ইউফ, হিপ)।

কাস। শয্যায় উষ্ণ হইলে; অতিরিক্ত উত্তপ্ততা জন্মিলে; গর্ভ-কালে (কোন), গানে; জলে দাঁড়াইলে; ও শীতল অন্ধকার স্থানে বাসে (হ্যাট-সল) কাসের উৎপত্তি; আহারান্তে উহার তরলতা, পানান্তে শুষ্কতা।

নিদ্রা—দুর্নিবার তন্দ্রালুতা; স্বভাব শূন্য জড়তা, বেহুঁস (তন্দ্রা-দোষ); নীরব ও অচল ভাবে পড়িয়া থাকা; সতত নিমুদ্রিত চক্ষু (সমধর্ম্ম শাস শহ, ওপি)।

পা ভিজাতে, ও উত্তপ্ত অবস্থায় বায়ু-প্রবাহ লাগাতে (একন, ব্রাই) বাতের পীড়া; শীতল আর্দ্র ঋতুতে, অথবা শীতল আর্দ্র বস্ত্রে (রস) উহার বৃদ্ধি; বাম স্কন্ধের বাত (ফির। দক্ষিণ স্কন্ধের, স্যাঙ্গ, ট্রং)

গাড়ীতে বিচরণ কালে পৃষ্ঠ-বেদনা।

শ্রান্তি, অতি অল্পমাত্র পরিশ্রম করিলেও শয়নের আবশ্যকতা

উপচয়।—শীতল, আর্দ্র, বজ্রবাত বিশিষ্ট সময়ে (রোড); ঋতুর পরিবর্ত্তনে শীতল আহার, জল, ও শীতল স্নানে, শকটারোহণে (কক্কু), সঞ্চালনে; এবং ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে, বৃদ্ধি (অব্যথিত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, পলস)

উপশম—শুষ্ক, উষ্ণকালে; উষ্ণগৃহে ও উষ্ণবস্ত্রে আবৃত হইলে, হ্রাস।

সম্বন্ধ—পারদের ধূম নিশ্বসন, সীস-শূল, তার্পিন তৈল, এবং মদিরা, বিশেষতঃ মদবিয়া বসাদিবার দোষ দ্বারা বিনষ্ট হয়

নাইট্রিক এসিড।

(Nitric Acid)

দৃঢ় পেশীতন্তু, মলিনবর্ণ মুখাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ চুল ও চক্ষু স্নায়বীয় প্রকৃতি এবং গৌরাঙ্গ অপেক্ষা শ্যামাঙ্গ কৃশ ব্যক্তিদিগের পক্ষেই নাইট্রিক এসিড বিশেষ উপযোগী।

পুরাতন রোগগ্রস্ত যে সকল ব্যক্তিদিগের সহজে সর্দ্দি লাগে, ও সহজে অতিসার জন্মে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী; যাহারা কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্টপায় তাহাদের পক্ষে ইহা কদাচিৎ উপযোগী হয়।

অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অতিসার সংযুক্ত বৃদ্ধদিগের পক্ষেও নাইট্রিক এসিড উপযোগী

অত্যধিক শারীরিক উপদাহিতা

বেদনা। চোঁচফুটার ন্যায় ভেদন ও বেধনবৎ বেদনা; সহসা আবির্ভূত ও সহসা তিরোভূত, বাতাস বা ঋতুর পরিবর্তনে উপস্থিত, নিদ্রাকালে প্রকাশিত, এবং স্থানে স্থানে ক্ষতোৎপাদনসদৃশ দংশনবৎ যাতনাবিশিষ্ট, বেদনা

অনুভূতি —মুখের চারিদিকে, ও হাড়ের চারিদিকে ফিতার বন্ধনের ন্যায় (কার্ব এসি, সল); গ্রন্থিস্থানে, ক্ষতস্থানে, অর্শে, গল-মধ্যে ও পদ-নখের কুনীতে চোঁচফুটার ন্যায় অনুভব, সংসামান্য স্পর্শে উহার বৃদ্ধি।

পুরাতন রোগ।—কোন তীব্র বিষজনিত; পারদ, উপদংশ ও গণ্ডমালা হইতে উৎপন্ন, এবং জীর্ণ শীর্ণ শরীরে প্রকাশিত; পুরাতন রোগ।

ক্রমাগত নিদ্রাশূন্যতা, দীর্ঘকালস্থায়ী উৎকণ্ঠা; রোগীর শুশ্রূষায় মন ও শরীরের অতিরিক্ত শ্রম (কক); প্রিয়তম বন্ধুর বিয়োগে মানসিক যাতনা; ঔদাস্য; জীবনে বিতৃষ্ণা; ঋতুর পূর্বে বিমর্ষতা।

স্বীয় রোগের বিষয়ে অতিশয় উৎকণ্ঠা, বিগত উপদ্রব সম্বন্ধে অবিরত ভাবনা, ওলাউঠার অতিরিক্ত ভয় (আর্স), সায়াহ্নে অপ্রফুল্লতা ও আকুলতা।

কোপনতা অবিমৃষ্যকারিতা; বৈরসাধনতৎপরতা, ঘৃণাপূর্ণতা; দুর্দম্যতা, বিদ্বেষিতা ক্ষমা প্রার্থনাও অবিচলিততা।

শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা, ঘোড়ার গাড়ীতে বা রেলের গাড়ীতে চড়িলে উহার আধিক্য (গ্রাফ)।

পাকা রাস্তায়, গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দে অতিশয় অনুভূতি; টুপীর চাপে মাথাধরা (কার্ব, ফস, বাকো, ন্যাট)।

ওজিনা প্রত্যহ প্রাতঃকালে সবুজবর্ণ ছাঁচ (green casts) নিঃসরণ।

অতিসার —অতিশয় প্রবাহ (কুন্থন) কিন্তু অল্প নিঃসরণ, বোধ হয় যেন মল সঞ্চিত রহিয়াছে নিঃসরণ করিতে পারা যায় না (এলুম), সরলান্ত্র অথবা মলদ্বার যেন ছিন্ন বা বিদীর্ণ হইয়াছে এরূপ বেদনা (ন্যাট-মি); মল ত্যাগান্তে প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি (র‍্যাট, সলফ।—মলত্যাগ-কালে ও ত্যাগান্তে বেদনা মার্ক)।

সরলান্ত্রের বিদারণ, মলত্যাগ কালে ছেদনবৎ আক্ষেপিক বেদনা, কোমল মলত্যাগের পরেও ছুঁচ বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় যাতনা (এসামেন ন্যাট, ন্যাট)

মূত্র।—স্বল্প, মলিন-কপিশ, উগ্রগন্ধ 'অশ্বমূত্র সদৃশ"; ত্যাগকালে শীতল; ঘোলা মূত্র

ক্ষত —সহজে রক্তস্রাবী ক্ষত, মুখের কোণে ক্ষত (ন্যাট); চোঁচফুটার ন্যায় যাতনা, বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে (হিপ) প্রান্তদেশ কুটিল ও অসম, ভূমিদেশ দেখিতে কাঁচা মাংসের অনুরূপ, সংতাপন বহুল; পারদ বা উপদংশ অথবা উভয়ের পরে গণ্ডমালাগ্রস্ত ভূমিতে উৎপন্ন ক্ষত

স্রাব —পাতলা; দুর্গন্ধ বিদাহী, কপিশ বা মলিন পীতাভ হরিদ্বর্ণ স্রাব; কদাচিৎ ভাল পুয।

রক্তস্রাব —টাইফয়েড বা টাইফাস জ্বরে অন্ত্র হইতে (ক্রোট, মিউর-এসি); গর্ভস্রাব বা প্রসবান্তে; অতিরিক্ত শরীর-চেষ্টায়; উজ্জ্বল, প্রভূত অথবা মলিন বর্ণ রক্তস্রাব।

চর্ব্বণকালে কর্ণে চড় চড় শব্দ, নাড়িলে চড়িলে সন্ধিস্থলে চড় চড় শব্দ (কক, গ্রাফ)।

আঁচিল —পারদ-দোষ বা উপদংশজ; বৃহৎ, অসম, সবৃন্ত, প্রক্ষালনে সহজে রক্তস্রাবী; আর্দ্র, বসন্তক্ষতবৎ; ছেদনবৎ যাতনা বিশিষ্ট; আঁচিল ও উপমাংস (ষ্টাফ, থুজা)

যে যে স্থলে ত্বক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সংযুক্ত সেই সেই স্থলে অর্থাৎ মুখ-বিবর, নাসিকা, সরলান্ত্র, মলদ্বার, মূত্রমার্গ, অপত্য-পথ প্রভৃতি শরীরের শ্লেষ্মা-স্রাবী দ্বার এই ঔষধে সবিশেষরূপে আক্রান্ত হয় (মিউর-এসি)

উপচয়।—সায়াহ্নে ও রাত্রিতে; দুইপ্রহর রাত্রির পরে; স্পর্শে; বাতাতপ বা ঋতুর পরিবর্ত্তনে; ঘর্ম্মকালে; নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে ও বিচরণ কালে; বৃদ্ধি

উপশম —গাড়িতে চড়িয়া বেড়াইবার সময় হ্রাস (ককুলাসের বিপরীত)।

সম্বন্ধ —(১) আর্স ও ক্যাল্কের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) ল্যাকেসিসের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ। (৩) ওলাউঠার অতিরিক্ত ভয়ে

আর্সেনিকের সহিত সমস্তুং ... (৪) ন্যাটেট্র ... অনেক সময় প্রভেদ করা কঠিন; ন্যাটেক ... ও মারকিউরি অধুকেশ ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী। (৫) ... ব্যবহারের পরবর্তী রোগে বিশেষতঃ ভাবনা ক্রিয়ার বিবৃদ্ধি থাকিলে; ... পুনঃ পুনঃ ডিজিটেলিস প্রয়োগের ... (৬) ক্যাক্, হিপ্, ম্যাক, ম্যাটকা ... ভাল থাটে, কিন্তু ক্যাক্‌টো-ক্যাক্টোর পরেও ... অনুচিত ...

ন্যাজা ট্রিপিউডিয়ান্স।

(Naja Tripudians)

আত্মহত্যার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট ... ভাবনা (অবস)।

হৃৎপিণ্ডের উপসর্গশূন্য বিবৃদ্ধি।

তরুণ ... দ্বারা ... হৃৎপিণ্ডের পুরাতন বিবৃদ্ধি ও হৃৎকপাটের বিকৃতি ... ঔষধ উপযোগী।

আমবাতিক হৃৎপিণ্ড পদার্থের ... বিকৃতি-বশতঃ উৎপন্ন ... (...)।

ডিপথিরিয়ার পরবর্তী হৃৎপিণ্ডের ... ।

বক্ষে আক্রমিত ... (...) ... ।

শ্বাস-রোধকর, আক্ষেপ, ... কথা বলিতে অসমর্থতা; ... বৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ড প্রদেশে তীব্র সূচি বেধনবৎ বেদনা।

সম্বন্ধ।—আর্স, ক্যাক্, ল্যাক, ... হয়

ন্যাট্রাম কার্ব্বনিকাম

(Natrum Carbonicum)

বিমুক্ত বায়ুতে অপ্রবৃত্তি এবং শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা বিশিষ্ট শারীরিক প্রকৃতি জড়বুদ্ধিতা।

অতিশয় দুর্ব্বলতা। — গ্রীষ্মকালের উত্তাপে উহার উৎপত্তি (এন্টক্রুড), শারীরিক বা মানসিক অত্যল্প চেষ্টায় অবসন্নতা; হাঁটিবার পর বসিয়া পড়িতে হয়; অর্কাঘাত অর্থাৎ শর্দ্দিগর্ম্মির পুরাতন ফল।

শর্দ্দি গর্ম্মির পুরাতন ফলে, গ্রীষ্মকালপেতা বৃদ্ধ হইলে শিরঃপীড়া।

পাণ্ডুর বদন ও চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডল, এবং প্রসারিত অক্ষিতারা (dilated pupils) সহ শীর্ণতা; মলিন বর্ণ মূত্র; নীরক্ততা; দুধের মত বর্ণ, আর্দ্র ত্বক ও অতিশয় দুর্ব্বলতা।

চিন্তা করিতে অক্ষমতা অথবা কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রমে অসামর্থ্য, উহাতে শিরোবেদনার উৎপত্তি, মানসিক পরিশ্রমের চেষ্টা করিলে হতবুদ্ধিবৎ বোধ হয়; আস্তে আস্তে আয়াসে বুঝিতে পারা যায়।

অসহ্য বিমর্ষতা ও আশঙ্কাপূর্ণতা, চিত্তে কেবলই বিষণ্ণ চিন্তা।

শিরঃপীড়া — অত্যল্পমাত্র মানসিক চেষ্টায়, সূর্য্যোত্তাপে বা গ্যাসের আলোতে কাজ করাতে (গ্লন, ল্যাক)। ও খতুর পূর্ব্বে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অথবা ঘাড়ে শিথিলতা সংযুক্ত, শিরঃপীড়া, মস্তক অতিরিক্ত বৃহৎ অনুভূত হয় বোধ হয় যেন ফাটিয়া যাইবে।

পাণ্ডুর বদন নীলমণ্ডল-পরিবেষ্টিত চক্ষু চক্ষুর পাতার স্ফীততা; প্রতিশ্যায়; গল-মধ্যে ও নাসিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী রন্ধ্রে শ্লেষ্মা গল পরিষ্কার রাখিবার জন্য অনবরত খক্ খক্ করিয়া কাস; নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্র হইতে গলায় শ্লেষ্মার পতন

প্রতিশ্যায় —নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্র ও গল-মধ্য পর্য্যন্ত উহার সংপ্রসারণ, কাসিয়া কাসিয়া গলা হইতে অধিক গাঢ় শ্লেষ্মা উত্তোলন; দিবাভাগে প্রভূত শ্লেষ্মা স্রাব, রাত্রিতে উহার বিরতি (নক্স)

নাসিকা হইতে গাঢ়, পীতবর্ণ হরিদ্বর্ণ, দুর্গন্ধ ভাপসা-গন্ধ, কঠিন, স্রাব-নিঃসরণ প্রায়শঃ আহারান্তে উহার বিরত

দুগ্ধে অপ্রবৃত্তি ; দুগ্ধ হইতে অতিসারের উৎপত্তি

জরায়ু হইতে যেন সকলই বাহির হইয়া আসিবে একপ্রকার আবেগ (এগার, লিলি, মিউর, সিপি) ; শুকন্য, বসিলে উহার বৃদ্ধি নড়িলে চড়িলে হ্রাস।

সংসর্গের পর অপত্য-পথ হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ, তজ্জন্য অপত্যতা (সন্তান না হওয়া)।

গুল্‌ফ-সন্ধির (ankle) সহজে বিচ্যুতি বা মচ্‌কিয়া যাওয়া (লিড) ; উহার এত দুর্ব্বলতা যে হাঁটিবার সময় উহা ভাঙ্গিয়া আইসে, ও পা নিম্নে অবনত হয় (কার্ব্বো-এন, ন্যাট-মিউ)।

উপচয়।—শীত বায়ো ; সূর্য্যের তাপে ; গ্রীষ্মের অত্যধিক উত্তাপে ; মানসিক পরিশ্রমে ; ও ঋতু-বন্ধ কালে বৃদ্ধি

সম্বন্ধ।—(১) শিরঃপীড়ায় ন্যাট-কার্ব্বের ন্যাট-মিউর সহিত তুলনা হয় ; ক্যাল্ক, সিপিও সমগুণ। (২) অধঃস্থান প্রসারণে (bearing down) সিপিয়ার পরে ভাল খাটে।

ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম।

(Natrum Muriaticum)

অদ্ভুত রক্ত বা তরলাদি নিঃসরণ বশতঃ শরীরের তরল পদার্থের অপচয় জনিত অথবা মানসিক রোগ গ্রস্ত দুর্ব্বল ও বিকৃত-ধাতু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

অতিশয় শীর্ণতা, উত্তম আহারাদি করিলেও শরীরের মাংসের ক্ষয় প্রাপ্তি (এব্রেট, আইওড) ; এবং গ্রীষ্মকালীয় অতিসারে শিশুদিগের গলা ও ঘাড়ের শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণতা প্রাপ্তি (স্যানি)

ঘন ঘন শর্দ্দি লাগা (ক্যাল্ক, ক্যালী বা)।

কোপনতা ; কিছু বলিলে শিশু বিরক্ত হয় ; যৎসামান্য কারণে কাঁদে ; সামান্যবিষয়ে, বিশেষতঃ সান্ত্বনা প্রদানে রাগান্বিত হইয়া উঠে।

হস্ত-সমস্ততা, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ হাত হইতে দ্রব্যাদির পতন (এপিস, বোভ)।

বিলাপ-প্রবৃত্তি ; অকারণে অশ্রুস্রাব (পলস), শিশু স্তন্য-প্রদানে রোগিণীর কষ্টের আধিক্য।

শিরঃপীড়া।—বিদ্যাভ্যাসে ব্যাপৃত বালিকাদিগের শিরোবেদনা (ক্যাল্ক ফস); সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি ; দৃষ্টিহীনতা সহ উহার আরম্ভ (আইরিস, কালী বাই); চক্ষুর অতিরিক্ত চেষ্টায় উহার উৎপত্তি ; হিষ্টিরিয়া জনিত বামপার্শ্বের শিরঃপীড়া ; বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইতেছে ; তৎসহ ঋতু-কালে এবং ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে আরক্ত বদন ; বিবমিষা ও বমন ; যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ি দ্বারা মস্তিষ্ক আঘাতিত হইতেছে এপ্রকার অনুভব ; জ্বরের উত্তাপাবস্থায় শিরোবেদনা, ঘর্ম্মারম্ভে উহার উপশম।

অশ্রুপাত, যখনই রোগী কাসে তখনই তাহার গাল বাহিয়া অশ্রুধারা পতিত হয় (ইউফ্রে;)

উত্তপ্ত সূর্য্যের তাপ অথবা দারুণ গ্রীষ্মকালের উত্তাপ বশতঃ ওষ্ঠ-গ্রন্থি জ্বর (হে-ফিভার) নাসা-রন্ধ্রে ক্ষুদ্র কৃমির ন্যায় অনুভব

জিহ্বায় চুল থাকার ন্যায় অনুভব (সিলি)।

জিহ্বা —জিহ্বায় রক্তবর্ণ দ্বীপাকার খণ্ড খণ্ড চিত্র ; পার্শ্বে দন্তের ন্যায় আকৃতি, (আর্স, র‍্যাষ, মার্ক, নাই-এসি, ট্যারাক্স) ; ভারী, কষ্টসাধ্য কথা, শিশুদিগের হাঁটিতে শিখিতে বিলম্ব।

কোষ্ঠবদ্ধতা —মলদ্বারের আকুঞ্চন অনুভব, পরে উহার বিদারণ রক্তপাত ও টাটানি, কষ্টে নিঃসারিত, শক্ত, খণ্ড খণ্ড মল (এম-কা ম্যাগ-মি) মলদ্বারে সূচী-বেধ (নাই-এসি দ্রষ্টব্য) ; অনিচ্ছায় নিঃসৃত মল বায়ু কি মল বাহির হইবে জানা যায় না (এলো, মিউর-এসি, আইও, ওলিন, পড)

মূত্র —হাঁটিবার, কাসিবার, ও হাসিবার সময় অনিচ্ছায় মূত্র-নিঃসরণ ; (কষ্ট, পলস, সিপি,) অন্যেরা উপস্থিত থাকিলে অনেকক্ষণ মূত্র-পাত হয় না (হিপার, মিউ-এসি) মূত্র ত্যাগান্তে কর্ত্তনবৎ যাতনা (সার্সা)

শুক্রস্রাব।—সংসর্গের অনেক পরে, বিবর্দ্ধিত লিঙ্গ সংকারে শুক্রপাত; সংসর্গ-কালে অতি বিলম্বে শুক্রস্রাব হওয়ায় জননাঙ্গের দুর্বলতা; অত্যধিক ইন্দ্রিয়-সেবার পরবর্ত্তী মেরুভঙ্গ, পৃষ্ঠবংশের জ্বালাদাহ, ও পক্ষাঘাত।

প্রত্যহ প্রাতে বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের অভিমুখে চাপ ও ধাক্কা লাগে, কন্দ (pro-lapsus uteri) নিবারণার্থে বসিয়া থাকা আবশ্যক হয় (লিলি, মিউর সিপ)

মৃদু মূর্চ্ছা উদ্ভব সহকারে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, উহা না কমে মূর্চ্ছা উদ্ভবের উপচয় (ল্যাকে)

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে দেহ কম্পিত হয় (স্পাইজি)

গুহ্যদ্বারোথিতের (সিপ —হরচে, গাই) কেশ স্পর্শ করিলে কেশ পতন; মুখ মণ্ডলের তৈলাক্ততা ও চিক্কণতা (নুজা)।

ক্রোধ; অম্ল খাদ্যদ্রব্য; কটি; কুইনাইন; অতিরিক্ত লবণ ভক্ষণ; এবং নাইট্রেট-অব-সিলভার দ্বারা দাহকর্ম্মের (কটারেটেশন) শোক, রাগ, অসন্তোষ, মর্ম্মাহত ভাব, ও সংযতঅনরুষ্টির সম্পাদন (ষ্টাফ)।

নখের চারিদিকের চর্ম্মের শুষ্কতা ও বিদারণ (পেট্রো), নখের মূল নিকটে, ও হাতের নিকটের চুলের খোঁচাগো দাগ (কালুম নাইকে, হুপার, সালফ)।

হাতের আঙ্গুলে আঁচিল (স্পর্শে বেদনা, কাষ্ট-কার্ব)।

গৃহে দস্যু তস্করাদির প্রবেশের পর, আসিয়াও যত অবেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে বিশ্বাস (সোরি) হাত এর সিপাসার স্বপ্ন।

ওষ্ঠের নিকটে মুক্তার ন্যায় ... ... ওষ্ঠের শুষ্কতা, বিদারণ ... (নেট্রাম)

জঙ্ঘার শিরার বেদনাযুক্ত আকুঞ্চন (... , ... , গ্র্যাফ)।

শ্রবণে স্পৃহা (ক্যাপ, কষ্ট), বাটিতে যাইতে অরুচি।

অতিরিক্ত লবণ ভক্ষণ সমুদ্রকূলে অবস্থিতি পরে সমুদ্রযাত্রা করিতে উৎপন্ন; কাঁটা আরক্ত ও দাহিত, বিশেষতঃ কেশের প্রান্তে উদ্ভূত, পামা (একজিমা)।

তরুণ ও পুরাতন শিরঃপীড়া, ... কামোদ্রেক, বিশেষতঃ প্রবল শারীরিক পরিশ্রমের পর উহার প্রকাশ (... , ক্যাল্ক ফস, স্থ্যান, আর্ট)।

সবিরাম জ্বর; পূর্ব্বাহ্ন ১০ বা ১১ টার সময় জ্বরের আবেশের উপস্থিতি, পুরাতন কুচিকিৎসিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন দ্বারা অবরুদ্ধ জ্বর,

শীত ও তাপাবস্থায় সংজ্ঞাশূন্যতা সহ শিরঃপীড়া; ও ঘর্ম্মে বেদনার উপশম

উপচয় —পূর্ব্বাহ্ন ১০ টা ব ১১ টার সময়, সূর্য্যের বা চুল্লীর উত্তাপে, সমুদ্র-কূলে বা সমুদ্র-ব যুতে; মানসিক পরিশ্রমে, আলাপনে, লিখনে, ও পঠনে এবং শয়নে বৃদ্ধি।

উপশম। শুষ্ক বৃত বায়ুতে (শীপস, ক্ষম)। শীতল জলে প্রক্ষালনে; উঠিয়া বসিলে; ও উপবাসে: দক্ষিণ পার্শ্বে ভরদিয়া শয়নে (ব্যাথিত পার্শ্বে ব্রাই, ইগ্নে, পলস); শ্বাস

সম্বন্ধ।— ১) এপিসের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ এপিসের পূর্ব্বে ও পরে ন্যাট্রম মিউরের ভাল ক্রিয়া দর্শে (২) ইগ্নেশিয়া ন্যাট্রম মিউরের উদ্ভিদ সমগুণ তরুণ রোগে-ইগ্নেশিয়া ও পুরাতন রোগে ন্যাট্রম-মিউর উপযোগী (৩) ন্যাট্রম মিউরের পর সিপিয়া ও থুজা ব্যবহৃত হয় (৪) পুরাতন রোগে লক্ষণের সাদৃশ্য অনুসারে অন্য অন্তর্ব্বর্ত্তী ঔষধ ব্যবহার না করিয়া অনেক সময় ন্যাট্রম মিউরের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় না (৫) জ্বরের আবেশ কালে কখনও ন্যাট্রম মিউর দেওয়া উচিত নহে (৬) ন্যাট্রম-মিউর ব্যবহারের পরে যদি শিরোঘূর্ণন ও শিরঃপীড়া অতিশয় প্রবর্দ্ধিত হয়; অথবা অবসন্নতা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে নক্স ব্যবহারে উহার শান্তি হয়।

ন্যাট্রম সলফিউরিকম।

(Natrum Sulphuricum)

আর্দ্র কালে, আর্দ্র গৃহ-বাসে সমুৎপন্ন বা বিবর্দ্ধিত রোগে, এবং শুষ্ক ঋতুর আর্দ্র ঋতুতে পরিবর্ত্তনে যে সকল রোগীর অসুখ করে; যাহারা সমুদ্র-বায়ু সহ্য করিতে পারেন, জলের নিকটে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে তাহা আহার করিতে পারেন না, যাহাদের শরীরে প্রমেহ-বিষে বিশেষ অনিষ্ট হয়, ও যাহারা প্রত্যেক রোগ হইতেই ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে; তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

প্রতি বসন্তকালে চর্ম্ম রোগের পুনঃ প্রকাশ (সোরি)

চিন্তা করিতে অসামর্থ্য (গ্র্যাট-কা)।

বিমর্ষতা অপ্রফুল্লতা, কোপনতা ; প্রাতে উহার আধিক্য ; কথা বলিতে বা শুনিতে অপ্রবৃত্তি (আইও, সিপি)

অপ্রসন্ন ; গীত-বাদ্যে রোগিণীর বিষণ্ণতা ; জীবনে পরিতৃপ্ততা (Satiety), আত্মহত্যা নিবারণার্থে অতিশয় আত্মসংযমের আবশ্যকতা।

অভিঘাতের মানসিক মন্দফল ; মস্তকের উপঘাত জনিত মানসিক লক্ষণ ; আঘাত বা পতন জন্য মস্তিষ্কের পুরাতন উপদ্রব।

অক্ষিপুটের দানাময়তা।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় দানা (গুল্মা) হরিদ্বর্ণ পুয ও ভয়ঙ্কর আলোকাতঙ্ক ; প্রমেহ বা মাষক-দোষ হইতে উহার উৎপত্তি।

ঋতু-কালে নাসিকা হইতে রক্তপাত (ঋতুর পরিবর্ত্তে রক্তপাত, ব্রাই, পল্স)।

শীতল জলে ও শীতল বায়ুতে উপশমিত দন্ত বেদনা (কফি, পল্স)।

জিহ্বায় ময়লা, হরিতাভ ধূসর অথবা কপিশবর্ণ লেপ

অতিসার।— সহসা বেগ, হুড় হুড় করিয়া মলস্রাব, অধিক বায়ু-নিঃসরণ ; নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রথম দাঁড়াইবামাত্র মলবেগ ; বৃষ্টি-কালের আবেশান্তে ; ও নিম্নতল গৃহে বাস বা কাজ করাতে উহার উৎপত্তি

প্রমেহ। হরিতাভপীতবর্ণ, বেদনাশূন্য, গাঢ়স্রাব (পল্স) ; পুরাতন বা সংরুদ্ধ প্রমেহ (গাঢ়, হরিদ্বর্ণস্রাব, কালী-আইওড)।

শ্বাস-কৃচ্ছ্র ; সেঁতসেঁতে, মেঘাচ্ছন্নকালে দীর্ঘ শ্বাসগ্রহণের ইচ্ছা।

শিশুদিগের শ্লেষ্মাস্রাবী শ্বাস-কাস ; প্রতি বর্ষাকালে ; ও প্রত্যেকবার নূতন সর্দ্দি লাগিলে উহার উপস্থিতি ; আর্দ্র, ও বৃষ্টি-কালে সর্ব্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ; হরিদ্বর্ণ, হরিতাভ, প্রচুর নিষ্ঠীবন (হরিতাভ ধূসর নিষ্ঠীবন, কোপে)।

মাষক-দোষজনিত ফুসফুস-প্রদাহ (সাইকোটিক নিউমোনিয়া) ; বাম ফুসফুসের নিম্নতর খণ্ডের আক্রান্ততা ; বক্ষঃস্থলের অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ, কাসিবার সময় শয্যায় উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে বুক ধরিয়া কাসিতে হয় (নিক।—দক্ষিণ ফুসফুস, ব্রাই)।

স্পাইন্যাল মিনিঞ্জাইটিস — মস্তিষ্কের ভূমিদেশে প্রবল চর্ব্বণবৎ বেদনা ; মস্তকের পশ্চাৎদিকে আকৃষ্টতা ; মানসিক উপদাহিতা ও প্রলাপ সহকারে আক্ষেপ ; মস্তকে প্রবল রক্ত-সঞ্চয়, প্রলাপ পশ্চাদ্ভিক্ত টঙ্কর।

উপচয়। — আর্দ্রগৃহে বাসে ; আর্দ্রকালে (আরাণ আর্স-আইও, ডাল্কা), বিশ্রামে ; ও শয়নে ; বৃদ্ধি

উপশম। — শুষ্ককালে ; প্রচালনে, উঠিয়া বসিলে (কাস) ; অবস্থান-পরিবর্ত্তনে (আর্দ্রকালে কষ্ট) ও অনাবৃত বায়ুতে ; হ্রাস।

রোগীর ঘন ঘন অবস্থানের পরিবর্ত্তন করিতে হয় বটে কিন্তু উহাতে কষ্ট হয় এবং শান্তি জন্মেনা (কষ্ট)।

সম্বন্ধ। — স্টাট-মিউ ও সলফেব সহিত অধিক সমগুণ সম্বন্ধ। রস-প্রধান-ধাতুতে সিফিলিস ও সাইকোসিস জন্মিলে থুজা ও মার্কের সহিত তুলনা হয়

পডফিলাম।

(Podophyllum)

পিত্ত-প্রধান-ধাতুর যে সকল ব্যক্তি, বিশেষতঃ পারদ সেবনের পর, আমাশয়ের বিশৃঙ্খলায় আক্রান্ত হয় ; এবং যাহার পিত্ত-প্রকোপের আক্রমণ সহ্যকরে ; তাহাদের পক্ষে পডফিলম বিশেষ উপযোগী।

উৎক্ষেপণবৎ (jerking) বেদনার আকস্মিক আক্রমণ। অধিক পরিমাণে শীতলজল পানের পিপাসা (ব্রাই)।

বিমর্ষতা, রোগীর অনুমান হয় যেন সে মরিতে যাইতেছে অথবা অতিশয় পীড়িত হইয়াছে (আর্স) জীবনে বিরক্তি।

অতিসারের সহিত সপর্য্যায়ে শিরঃপীড়া (এলো) ; শীতকালে শিরঃপীড়া, গ্রীষ্মকালে অতিসার

বেদনাশূন্য মৃদু-বিসূচিকা ; পদ, জঙ্ঘা-পৃষ্ঠ (Calves) ও উরুতে প্রবল খল্লী ; বেদনা-শূন্য জলবৎ মল, শিশু-বিসূচিকা (ক্যাল্ক-ফস)।

সহজে দন্তোদ্গম না হওয়া ; কোঁ কোঁ করা, ও রাত্রিতে দাঁত কড়মড় করা ; মস্তকের উত্তপ্ততা ও অবলুণ্ঠন (বেল, হেল) ; মাড়িতে মাড়িতে চাপ দেওয়ার অতিশয় ইচ্ছা (ফাইটো)।

হস্তদ্বারা যকৃৎ-প্রদেশ অবিরত মর্দ্দন।

অতিসার।—শিশুদিগের অতিসার, দন্তোদ্গমকালীন অতিসার ; আহারান্তে; প্রক্ষালনকালে ও শিশুর শয্যার বস্ত্র ভিজিয়া পতিত মলিন জলবৎ অতিসার (বেঞ্জ-এসি); প্রত্যূষ-কালে অতিসার, পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি, সন্ধ্যাকালে স্বাভাবিক মল নিঃসরণ (এলো), তৎসহ উদরে ও সরলান্ত্রে দুর্ব্বলতা বা নিম্নগতা অনুভব, দীর্ঘকাল স্থায়ী অতিসার।

মল।—সবুজবর্ণ, জলবৎ, দুর্গন্ধ, প্রভূত (ক্যাক) ; প্রবলবেগে বহির্গত (জেট্র, যস) খটিকাবৎ, লেহবৎ (এলো) অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত (সিঙ্ক, ফিস), পীতবর্ণ ময়দার ন্যায় তণ্ডুলবিশিষ্ট ; এবং মল ত্যাগের পূর্ব্বে বা তৎকালে সরলান্ত্রের ([illegible]) বহির্গমন লক্ষণাপন্ন, মল

কুন্থন বা ভারোত্তোলন বশতঃ ; কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা ও প্রসবের পরবর্ত্তী ; কন্দ

গর্ভের প্রথম ভাগে কেবল আমাশয়ের উপর ভর দিয়া শয়নে স্বচ্ছন্দতা (এগেট-এসি)

দক্ষিণ গল-মধ্য, দক্ষিণ ডিম্বাশয় ও দক্ষিণ কুক্ষির আক্রান্ততা, পূর্ব্বাহ্ণ ৭ টার সময় জ্বরের আবেশ, তৎসহকালে শীত ও উত্তাপের সময় অতিরিক্ত বাচালতা ; ঘর্ম্মস্রাবের সময় নিদ্রা (পোষ্ট)।

দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে বেদনা ও অবশতা, সেই দিকের উরু পর্য্যন্ত, উহার প্রধাবন (লিলি)।

যুবতী কুমারীদিগের রজোবিলুপ্তি (পলস, টিউব)।

উপচয়।—প্রত্যূষে (এলো, নক্স, সল), উত্তপ্ত কালে ; দন্তোদ্গম-সময় ; বৃদ্ধি

উপশম।—সন্ধ্যাকালে, বাহ্যিক উষ্ণতা প্রয়োগে ; ও চাপদানে হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) এলো, চেলি, কোফিন, লিলি, মার্ক, নক্স ও,সলফের সহিত পডর তুলনা হয়। (২) এতদ্বারা পারদের কুফল নিবারিত হয়। (৩) আমাশয়ের রোগে ইপি ও নক্সের পরে এবং যকৃদ্রোগে ক্যাল্ক ও সলফের পরে; পড উপযোগী হয়।

পল্‌সেটিলা।

(Pulsatilla)

পিঙ্গলকেশ, নীলচক্ষু, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল, নীরব শোক-প্রবণ, বিনীত স্বভাব ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ নারী ও বালক-বালিকাদিগের রোগেই এই ঔষধ বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। পলসেটিলার রোগীর মন্দ গতি, শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতু; ও বিরক্তি-প্রবণতা থাকে, কিন্তু কোপনতা থাকেনা।

সহজে অশ্রুপাত; অশ্রুপাত না করিয়া প্রায়ই রোগের কথা বলা অসম্ভব (ধন্যবাদদিলে অশ্রুপাত, লাই)।

স্ত্রীলোকদিগের মাংসলা হইবার প্রবণতা, তৎসহ স্বল্প ও অনেক দিন স্থায়ী ঋতু (গ্রাফ)

প্রথম রজ-প্রকাশের সময় হইতেই স্বাস্থ্যভঙ্গ, নীরক্ততা, হরিৎপাণ্ডু, বায়ু-নলীভুজ-প্রদাহ, যক্ষা। সেই সময় হইতে কখনও শরীর সুস্থ নহে

সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবই গাঢ়, অবিদাহী ও পীতাভ-হরিদ্বর্ণ (কালী-সল, ন্যাট-সল)।

বেদনা —আকর্ষণবৎ, ছেদনবৎ, একস্থান হইতে অন্য স্থানে সত্বর স্থান-বিকল্প শীল সঞ্চরমান বেদনা (কালী-বাই, ল্যাক-ক্যান ম্যাঙ্গ-এ); তৎসহ অবিরত শীত শীত অনুভব, যতই বেদনার উগ্রতা ততই শীতের তীব্রতা; সহসা বেদনার প্রকাশ, ক্রমে ক্রমে বিরাম, অথবা অশিথিলতা (টেন্‌শন্), যে পর্য্যন্ত না উহার তীব্রতা জন্মে সে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্তি, অনন্তর চট্ করিয়া উহার নিবৃত্তি (দন্ত-শূল, স্নায়ু-শূল); প্রথম সঞ্চলনে বেদনা (হ্রঃসটক্স)।

লক্ষণের সতত পরিবর্ত্তন, দুই বারের শীত, দুই বারের মল, দুই বারের আক্রমণ একরূপ হয় না; এক ঘণ্টায় সুন্দর সুস্থতা, অন্য ঘণ্টায় অসুস্থতা।

প্রায় সকল রোগের সহিতই পিপাসাহীনত।

গুরুপাক দ্রব্য, পিষ্টক, ঘৃতপক্ক দ্রব্য, তৈলাক্ত দ্রব্য, ও শূকরের মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ জন্য আমাশয়িক উপদ্রব; প্রাতে মুখের বিরসতা।

প্রাতে পিপাসা ব্যতীত অতিশয় মুখ-শোষ (নক্স-ম —মুখ আর্দ্র, অথচ দারুণ পিপাসা, মার্ক)।

আমাশয়ে, বিশেষতঃ চা-পায়ীদিগের আমাশয়ে শূন্যতা অনুভব।

স্তনে বা মুষ্কে (testicle) মংম্পস্ (ওল্দাবিবি) রোগের স্থান-বিকল্প

অতিসার।—নিরবচ্ছিন্ন অথবা সাধারণতঃ রাত্রিতে অতিসার, জলবৎ, পীত ও হরিৎ অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল, আহারের অব্যবহিত পরে নিঃসৃত; ফল, শীতল পানীয় দ্রব্য, ও বরফ সেবন হইতে উৎপন্ন; অতিসার (আর্স, ব্রাই — পেয়ারা ফল (ন্যাসপাতি) আহার বশতঃ, ভিরে, চায়না, পলাণ্ডু ভক্ষণ জনিত, থুজা, গুগুলি ভক্ষণ জনিত, ব্রোম, লাই, দুগ্ধপান বশতঃ, ক্যাল্, স্যাট কা, নিক, সল অপরিষ্কৃত জলপান বশতঃ, ক্যাম্ফ, জিঞ্জ)।

প্রাপ্ত-যৌবনাদিগের অসুখ; পা ভিজাতে রাজোবিলোপ সন্ধ্যাকালে শীতসহ নিয়মিত সময়ের অনেক পরে, স্বল্প, আঠা আঠা, থাকিয়া থাকিয়া প্রবাহিত, ঋতু; তৎসহকারে দারুণ বেদনা, অতিশয় অস্থিরতা ও অবলুণ্ঠন (ম্যাগ-ফস) দিবাভাগে অধিকতর ঋতু-নিঃসরণ (লিলি —শয়ন করিবার অব্যবহিত পরে, ক্রিয়োজ, কেবল রাত্রিতে অথবা শয়ন কালে, ম্যাগ-কা); প্রথম ঋতুপ্রকাশে বিলম্ব।

নিদ্রা।—সন্ধ্যাকালে সম্পূর্ণ নিদ্রাশূন্যতা, তখন শয়ন করিতে অনিচ্ছা; প্রথম অস্থির নিদ্রা, যখন নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় তখন গাঢ় নিদ্রা; দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তি সহকারে জাগরণ (নক্স ভমিকার বিপরীত)।

অজীর্ণ।-ঘৃতাদি বসাময়, তৈলাক্ত, অধিক মসলাযুক্ত খাদ্য দ্রব্য অথবা শূকরের মাংস আহার বশতঃ অজীর্ণ, বিশেষত উপরের অক্ষি-পুটে (লাই, ও ষ্ট্যাফ, তুলনা করুন)।

গর্ভ-স্রাবের আশঙ্কা ; রক্ত-স্রাবের বিরতি ও অনন্তর বিবর্দ্ধিত বেগে প্রত্যা-বৃত্তি ; আক্ষেপিক বেদনা, তজ্জন্য শ্বাস-রোধ ও মূর্চ্ছার উৎপত্তি ; বিমল বায়ু সেবনের প্রবৃত্তি।

দন্ত-বেদনা —মুখে শীতল জল রাখিলে দন্ত-বেদনার শান্তি (ব্রাই, কফি) ; উষ্ণ দ্রব্য ও গৃহের উত্তাপে উহার আতিশয্য।

শ্বাস ক্রিয়া ভালরূপে নিষ্পন্ন করিতে অপারগতা, অথবা উষ্ণগৃহে শীতানুভব।

স্নায়বীয়তা, ঋতুকালে উহার আধিক্য অনুভূত হয়

উপচয়। উষ্ণ, আবদ্ধগৃহে ; সন্ধ্যাকালে গোধূলি সময়ে ; বামপার্শ্বে বা বেদনাহীন পার্শ্বে শয়নে, দুষ্পাচ্য আহার, বসা দ্রব্য, শূকরের মাংস, ও বরফাদি সেবনে ; নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিলে ; উত্তাপে, ও উষ্ণ বাহ্য প্রয়োগে ; বৃদ্ধি (কালী-মি)।

উপশম।—অনাবৃত বায়ুতে ; ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে (ব্রাই) ; শীতল বায়ুতে বা শীতল গৃহে, শীতল দ্রব্য পানে বা আহারে ; ও শীতল বাহ্য প্রয়োগে ; হ্রাস (কালী মি)।

সম্বন্ধ।—(১) কালী মি, লাই, সিপি, সল এসিড সহিত পলসেটিলার অনুপূরক সম্বন্ধ (২) যে সকল তরুণ রোগে পলসেটিলা উপযোগী প্রায়ই সেই সকল রোগের পুরাতন অবস্থায় সিলিশিয়া সুপ্রযুজ্য। (৩) কালী-বাই, লাই, সিপি, সলের পরে পলসেটিলা ভাল খাটে (৪) ক্যাম, কুইনাইন, মার্ক, ও সল সেবন, এবং চা পান জনিত রোগ (৫) পুরাতন রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করিতে যে সকল ঔষধ সর্ব্বোত্তম পলসেটিলা উহার অন্যতম (৬) মৃৎপাণ্ডু, হরিৎপাণ্ডু বিশিষ্ট যে সকল রোগী অধিক বৎসর-পূর্ব্বেও অধিক পরিমাণে কুইনাইন, আয়রণ (লৌহ), ও বলকর ঔষধ (টনিক) সেবন করিয়াছে তাহাদের পক্ষে পলসেটিলা উপযোগী (৭) পলসের পূর্ব্বে ও পরে কালী মিউ ভাল খাটে।

পাইরোজেন।

(Pyrogen)

প্রসবান্তিক বা শস্ত্র-ক্রিয়ার পরবর্ত্তী ; জল-প্রণালী প্রভৃতির দূষিত বাষ্পজনিত ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড বা টাইফাস জ্বরের ভোগ-কালে উৎপন্ন ; সেপ্টিসিমি-

ন্যায় অত্যুৎকৃষ্ট সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও একেবারেই উপকার না জন্মিলে অথবা স্থায়ীফল না দর্শিলে এই ঔষধ উপযোগী।

শয্যা শক্ত অনুভূত হয় (আর্ণ); যে সকল অঙ্গে ভরদিয়া শয়ন করাযায় উহা ব্যথিত ও মৃষ্টবৎ অনুভূত হয় (ব্যাপ্ট,); ক্ষতোৎপন্ন শয্যা-ক্ষত (কার্ব্ব-এসি)

অতিশয় অস্থিরতা; অঙ্গের স্পর্শ-দ্বেষের উপশমার্থে অবিরত সঞ্চালনের আবশ্যকতা (আর্ণ, ইউপ)।

জিহ্বা।— বৃহৎ, লোলিত; পরিচ্ছন্ন, ভার্ণিসকরারমত মসৃণ; অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ, শুষ্ক, বিদারিত জিহ্বা; শব্দোচ্চারণে কষ্ট (ক্রোট, টেরে)।

স্বাদ।— ঈষৎ মিষ্ট, ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ; ক্ষত হইতে উৎপন্ন পূযবৎ মুখের স্বাদ।

বমন।—প্রতিনিয়ত কফি-চূর্ণের ন্যায় ঈষৎ কপিশবর্ণ; পশ্বাদির বিষ্ঠার গন্ধ বিশিষ্ট; আবদ্ধ বা প্রতিরুদ্ধ অন্ত্র সংযুক্ত (ওপি, প্লম্ব); বমন।

অতিসার।- ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ (সোরি); কপিশ বা কৃষ্ণবর্ণ (লেপ্ট) বেদনাশূন্য, অনিচ্ছায় নির্গত; অনিশ্চিত, বায়ু-নিঃসরণকালে বহির্গত (এলো, ওলিন); অতিসার।

কোষ্ঠ-রোধ —সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা সংযুক্ত (with complete inertia) (ওপি, আলি); জ্বরে অন্ত্রাবরোধ বশতঃ দুর্দ্দম্য; বৃহৎ, কাল, পচা মাংসের গন্ধ; জলপাইয়ের মত ছোট ছোট, কাল গোলার ন্যায় মল বিশিষ্ট (ওপি, প্লম্ব) কোষ্ঠ-রোধ

ঋতু।— ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ, পচা মাংসের গন্ধ; পচা গন্ধ, কেবল একদিন স্থায়ী, তৎপরে সেই প্রকার ভয়ঙ্কর গন্ধ রক্তাক্ত প্রদর বিশিষ্ট; ঋতু

ভ্রূণ।—(Foetus) ভ্রূণ ও ফুলাদির অবশেষের জরায়ুতে অবস্থিতি, বিগলিত হওয়া, গর্ভে ভ্রূণের কতিপয় দিবস মরিয়া থাকা; কাল, ভয়ানক দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ; গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর সেপ্টিক জ্বরের পরে স্বাস্থ্য-শূন্যতা। পাই-রোজেন জরায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার উত্তেজনা জন্মায়।

প তথা, বিদাহী, কটা, অতি দুর্গন্ধ প্রসবান্তিক স্রাব (lochia) (নাই-এসি); প্রসবান্তিক স্রাবের বিলুপ্তি, তৎপরে শীত, উত্তাপ ও প্রভূত দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম বিশিষ্ট জ্বর

হৃৎপিণ্ডের বিদ্যমানতার সুস্পষ্ট জ্ঞান, উহা স্রাও অনুভূত হয়, যেন বড় হইয়াছে এমন বোধ হয়, কানে অবিরত হৃৎপিণ্ডের দপ দপ ও স্পন্দনকর শব্দ শুনা যায়, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে; রক্তে পচনজনক পদার্থের অবস্থিতি বশতঃ হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা

নাড়ীর অস্বাভাবিক দ্রুততা, গাত্র-তাপের সহিত উহার অনুপাতের সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ (লিলি)

ত্বকের পাণ্ডুরতা, শীতলতা, ও ভস্মের ন্যায় বর্ণ (সিকেলি); বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের দুর্দম্য শিরা স্ফীতিসংযুক্ত, দুর্গন্ধ ক্ষত (সোরি)।

জ্বর —স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যভাগে, পৃষ্ঠে শীতের আরম্ভ; তীব্র শীত, সর্ব্বাঙ্গের, অস্থির ও হস্ত-পদের শীত; সেপ্টিক জ্বরের আক্রমণের লক্ষণ; ১০৩ হইতে ১০৬ ডিগ্রি গাত্রতাপ, আকস্মিক উত্তাপ, ত্বকের শুষ্কতা ও জ্বালা; দ্রুত, ক্ষুদ্র, তারবৎ নাড়ী, ১৪০ হইতে ১৭০ বার স্পন্দন; অনন্তর শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম

সেপ্টিক জ্বরে, বিশেষতঃ প্রসবান্তিক সেপ্টিক জ্বরে পাইরোজেন অতিশয় উপকারী পচন-নিবারক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

সম্বন্ধ —(১) আর্স, ব্যাপ্ট, কার্ব্ব-ভেজি, কার্ব্ব এসি, ওপি, রাস, সোরি, সিকে, ভিরেটের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ; (২) প্রচ্ছন্ন পূয় জনন-প্রক্রিয়া (latent pyogenic process) বশতঃ দৃশ্যমান সদৃশ ঔষধ ব্যবহারেও রোগের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্তি

পিক্রিক এসিড।

(Picric Acid)

জীর্ণশীর্ণ শরীর-যন্ত্র; স্নায়বীয় অবসন্নতার সুন্দর প্রতিকৃতি এই ঔষধে পরিশোধিত হয় (ক্যালী-ফ)

. বিবৰ্দ্ধনশীল, অনিষ্টজনক নীরক্তভা; স্নায়ুর দুর্ব্বলতা।

মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্য (ব্রেণ ফ্যাগ)।—সাহিত্যিক বা কর্মশীল লোকদিগের রোগ; যৎসামান্য উত্তেজনায়, মানসিক পরিশ্রমে বা অতিরিক্ত কার্য্য করিলে শিরঃপীড়ার উপস্থিতি, ও পৃষ্ঠবংশের লম্বালম্বি জ্বালার উৎপত্তি (কালী-ফস)।

শিরঃপীড়া।—ছাত্রদিগের, শিক্ষকদিগের, ও অতি কার্য্যশীল লোকদিগের শিরঃপীড়া; শোক ও অবসাদজনক মনোভাব বশতঃ উহার উৎপত্তি; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ও গ্রীবাদেশে বেদনা (গ্যাট-সি, সিলি); একটু মাত্র নড়িলে চড়িলে অথবা মানসিক পরিশ্রমে উহার বৃদ্ধি বা উদ্রেক।

পৃষ্ঠবংশের রোগসহকারে কাম-প্রবৃত্তি পরিশূন্য লিঙ্গোদ্রেক; অনেকক্ষণ-স্থায়ী প্রবল উদ্গম; প্রভূত শুক্রপাত, পুরুষের কামোন্মাদ (ক্যান্থ, ফস)।

শরীরের যে কোন অংশে, কিন্তু বিশেষতঃ বাহ্যিক শ্রুতি-প্রণালীতে (external auditory canal) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক

পৃষ্ঠবংশের (Spine) লম্বালম্বি জ্বালা এবং পৃষ্ঠবংশ ও পৃষ্ঠের অতিশয় দুর্ব্বলতা; পৃষ্ঠবংশের মজ্জার কোমলতা (ফস, জিঙ্ক)।

শ্রান্তি, নড়িলে চড়িলে অল্প অল্প ক্লান্তি অনুভব হইতে সম্যক পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত উহার পরিণতি। সর্ব্বশরীরে বিশেষতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শ্রান্তি ও গৌরব অনুভব (heavy feeling) পরিশ্রমে উহার আধিক্য।

উপচয়।—অত্যল্প মানসিক শ্রমে; সঙ্গমে, অধ্যয়নে; ও বৃষ্টির দিনে; বৃদ্ধি।

উপশম।—শীতল বায়ুতে ও শীতলজলে, উপশম।

সম্বন্ধ —আর্জ্জ-না, জেল, কালী-ফস, ফস-এসি, ফস, পেট্রো, সিলিস সহিত পিক্রিক এসিডের তুলনা হয়।

পেট্রোলিয়ম।

(Petroleum)

যে সকল ব্যক্তিদিগের চুল ও ত্বক পাতলা, প্রকৃতি উগ্র ও বিবাদশীল (নক্স); যাহারা সামান্য বিষয়ে রুষ্ট (ইগ্নে, মেড) ও সকল বিষয়েই বিরক্ত হয়; তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ঘোড়ার গাড়ী, রেলের গাড়ী অথবা জাহাজে আরোহণ জনিত পীড়া (কক, ত্মানি); ঝড়-বজ্রের পূর্ব্বে ও তৎকালে বিবর্দ্ধিত হয় এরূপ পীড়া (স্মটকা, ফস, সোরি)।

রোগের লক্ষণের শীঘ্র শীঘ্র আবির্ভাব ও তিরোভাব (বেল, ম্যাগ-ফস)—প্লাট ষ্টাণের বিপরীত)।

নিদ্রা বা প্রলাপ কালে একটা অঙ্গ যেন দুইটা হইয়াছে এরূপ অনুমান; যেন একই শয্যায় রোগীর পার্শ্বে আর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছে; এবং শয্যায় যেন দুইটা শিশু রহিয়াছে; এ প্রকার অনুভব (ভেলে)

উঠিলেই শিরোঘূর্ণন (ব্রাই), মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে; মত্ততাবৎ; সামুদ্রিক বিবমিষার অনুরূপ (কক), শিরোঘূর্ণন।

শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে সীস সদৃশ গুরুত্ব; প্রচাপন ও দপদপকর বেদন; মস্তকের প্রত্যেক বস্তুই যেন সজীব; মস্তক যেন কাষ্ঠ নির্ম্মিত; অবশ ও স্পৃষ্ট; এরূপ অনুভব

আমাশয়-বেদনা —গর্ভাবস্থায়; প্রচাপন ও আকর্ষণবৎ বেদনা সহকারে আমাশয় শূন্য থাকিলে; আমাশয়ের গ্যাষ্ট্রালজিয়া, সতত আহার করিলে উহার উপশম (এনাক, চেলি, সিপি)

অতিসার —বাঁধাকপি, ও অম্ল কাউট (কপি দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য বিশেষ) আহারে; গর্ভাবস্থায়; ঝড় বৃষ্টি-কালে সর্ব্বদা দিবাভাগে প্রবল বেগে নিঃসৃত; পীতবর্ণ জলবৎ; অতিসার

সমস্ত শরীরের চর্ম্মের কষ্টপ্রদ অনুভূতি, সকল পরিচ্ছদেই কষ্ট জন্মে; যৎসামান্য উপঘাতে পূয উৎপন্ন হয় (হিপ)।

হস্তের ত্বকের খরস্পর্শতা ও বিদারণ; হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রভৃতি শীতকালে কর্কশ, ফাঁটা, ও বিদীর্ণ; পদ-দ্বয়ে স্পর্শ-দ্বেষ, দুর্গন্ধ ঘর্ম্মে উহার সিক্ততা (গ্রাফ, স্যানি, সিপি)।

হার্পিজ (দক্র বিশেষ)।—মূলাধার ও উরু পর্য্যন্ত সংপ্রসারিত জননাঙ্গের দক্র; কণ্ডুয়ন, আরক্ততা; ত্বকের বিদারণ, কর্কশতা, রক্তস্রাব, শুষ্কতা বা আর্দ্রতা

পদতল ও করতলের উত্তাপ ও জ্বালা (স্যাজ, সল)।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই বাহ্য জননাঙ্গের ঘর্ম্ম ও আর্দ্রতা।

বেদনা সংযুক্ত, কণ্ডুয়নজনক শীতস্ফোট, ও হাত ফাটা শীত ঋতুতে উহার বৃদ্ধি; শয্যাক্ষত।

হৃৎপিণ্ডের সমীপে শীতলতা অনুভব (কার্বো-এন, ন্যাট-মিউ, ক্যাল্‌ক-মিউ)।

উপচয়।—শকটারোহণে, বজ্র-বৃষ্টি কালে, ও শীতকালে (চর্ম্ম-লক্ষণের) বৃদ্ধি

উপশম।—উষ্ণতায় ও উষ্ণবায়ুতে হ্রাস

সম্বন্ধ।—(১) সীসজনিত বিষাক্ততায় পেট্রোলিয়ম অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ এই ঔষধের চর্ম্ম-লক্ষণ শীতকালে বর্দ্ধিত হয়, গ্রীষ্মকালে উপশমিত থাকে (এলম), এবং নিদ্রাকৃষ্ট হইলে অভিমান অন্যে।

পেট্রোসেলিনম।

(Potroselinum)

সবিরাম জ্বর।—আভিঘাতিক বা পুরাতন মূত্র-মার্গের প্রদাহ কিংবা সংবৃতি (stiiotnio) সংসৃষ্ট জ্বর; যকৃৎ ও উদরের রোগ এবং বিকৃত বা অসম্পূর্ণ সমীকরণ-ক্রিয়ার (assimilation) বিদ্যমানতা

তৃষ্ণার্ত্ততা ও ক্ষুধার্ত্ততা, কিন্তু আহার বা পান করিতে আরম্ভ করিবামাত্র ইচ্ছার সম্যক বিরতি (ক্যাম্বের বিপরীত)

সহসা মূত্র-বেগ (ক্যান্থ)।

শিশুর সহসা মূত্র-বেগ ; তৎক্ষণাৎ মূত্র-ত্যাগ করিতে না পারিলে যাতনায় উল্লম্ফন।

মূলাধার (perineum) হইতে সমগ্র মূত্রমার্গের অভ্যন্তর দিয়া জ্বালা ও সড়সড় করা।

মূত্র-মার্গের নৌকাকার গহ্বরে বারবার সুরসুরি।

প্রমেহ।—সহসা দুর্নিবার মূত্র-প্রবৃত্তি, মূত্রমার্গের গভীর স্থানে তীব্র দংশন, ও কুণ্ডুয়ন, উহার উপশমার্থে কর্কশভাবে মূত্র-মার্গ মর্দ্দনের আবশ্যকতা ; লিঙ্গ-মূলে বা মূত্রাশয়ের গ্রীবায় বেদনা। লালা-মেহ (gleet)

সম্বন্ধ।—সহসা মূত্রবেগে ; ক্যান, ক্যান্থ, মার্কের সহিত এই ঔষধের তুলনা হয়

প্লাম্বাম।

(Plumbum)

প্লাম্বাম মেরুদণ্ডমূলক রোগে উপযোগী (ফস ফিক এসি, জিঙ্ক)।

শীঘ্র শীঘ্র সমধিক শীর্ণতা প্রাপ্তি ; সর্বাঙ্গীন বা আংশিক বিরক্ততা এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা সহকারে পক্ষাঘাতের চরম সীমা।

পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের দৃঢ়তা বশতঃ পেশীর শীর্ণতা।

অবসাদ ; জনপূর্ণ গৃহে প্রবেশে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি

ধীরে ধীরে উপলব্ধির উৎপত্তি, বুদ্ধি-বৃত্তির জড়তা, ক্রমশঃ বিবর্দ্ধিত ঔদাস্য (জরে, ফস-এসি)

স্মৃতি-শক্তির দুর্ব্বলতা বা বিলুপ্তি, উপযুক্ত শব্দ প্রাপ্ত হইতে অসমর্থতা (এনাক, ল্যাক-কা)।

উদর-বেদনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রলাপ।

শয্যায় অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গি ও অবস্থিতির অবলম্বন

পাণ্ডুর, ভস্মবর্ণ, পীতবর্ণ, মৃতদেহ সদৃশ, ও নিমগ্ন গণ্ড বিশিষ্ট ; অতিশয় উৎকণ্ঠা এবং যাতনা জ্ঞাপক ; মুখাকৃতি

মুখমণ্ডলের ত্বকের তৈলাক্ততা ও চিকণতা (ন্যাট-মিউ, ম্যানি)।

মাড়ীর প্রান্তভাগ দিয়া সুস্পষ্ট নীলবর্ণ রেখা; মাড়ীর স্ফীততা, পাণ্ডুরতা, ও সীসবর্ণ রেখা প্রদর্শন।

উদরে অত্যধিক বেদনা, শরীরের সকল অংশে উহার বিকীর্ণতা।

রাত্রিতে উদরে এক প্রকার অনুভূতি বশতঃ কতিপয় ঘটিকা পর্য্যন্ত রোগীর প্রচণ্ড ভাবে অঙ্গ-প্রসারণ; সকল দিকেই প্রসারণের আবশ্যকতা (এমিল)।

প্রবল শূল বেদনা, উদর-প্রাচীর যেন রজ্জুবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ বংশের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এ প্রকার অনুভব।

উদর-বেদনা ও পুরীষ বমন সহ অন্ত্র প্রবেশ রোগ (intussusception), উরু, বঙ্ক্ষণ অথবা নাভী দেশীয় আবদ্ধ অন্ত্র-বৃদ্ধি

কোষ্ঠ-রোধ — শক্ত, দলা দলা, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় কাল মল (প্লেটি, ওপি) তৎসহ মল দ্বারের আক্ষেপ বশতঃ আবেগ ও ভয়ঙ্কর বেদনা, মলের দৃঢ়তা, প্রস্রাবের শুষ্কতা, পক্ষাঘাত বা পেশীর শীর্ণতা, দুর্ব্বলতা; অধিক মল-সঞ্চয় বশতঃ মল নিঃসরণের প্রতিবন্ধকতা (প্লাটিনা বিফল হইলে প্লাম্বাম ফলপ্রদ)

ব্রাইট-রোগ।—উদর-বেদনা, উদরের আকুঞ্চিততা; শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণতা প্রাপ্তি; অতিশয় দুর্ব্বলতা; মূত্রকের সঙ্কুচিততা।

গর্ভাশয়ে ভ্রূণ দেহের স্থানাভাব অনুভব; জরায়ুর প্রসারণে অসামর্থ্য; আশঙ্কিত গর্ভপাত।

আক্ষেপ।—ঘন ঘন পেশীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ; অথবা অধিকক্ষণ স্থায়ী আক্ষেপ; মস্তিষ্কের দৃঢ়তা অথবা অর্ব্বুদ হইতে উহার উৎপত্তি; অপস্মার বা অপস্মারের অনুরূপ আক্ষেপ।

পীতবর্ণ ত্বক; নিবৃত্ত- বয়স্কা দিগের এক প্রকার মলিন-কপিশ ছুলী; পাণ্ডু, চক্ষু, ত্বক ও মূত্রের পীতবর্ণ

উপচয়।—রাত্রিতে (অঙ্গ বেদনার) বৃদ্ধি।

উপশম —ঘর্ষণে; ও শক্ত প্রচাপনে; হ্রাস।

সম্বন্ধ (১) শূল বেদনায় এলম, প্ল্যাট ও ওপির সহিত ; নাভীর আকুঞ্চনে পডোর সহিত এবং আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধিতে নক্সের সহিত প্লাম্বমের তুলনা হয় (২) পডো এই ঔষধের উদ্ভিজ্জ সমগুণ (৩) প্লাম্বমের কুফল, এলম, পেট্রো প্লাট, সল-এসি ও জিঙ্ক দ্বারা বিনষ্ট হয়

প্লাটিনা।

(Platina)

যে সকল নারীর কেশ মলিনবর্ণ, দেহ-তন্তু দৃঢ়, যাহাদের শরীর কৃশ, ধাতু রক্ত-প্রধান ; এবং ঋতু নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে ও অতিরিক্ত অধিক পরিমাণে হয় ; তাহাদের পক্ষে প্লাটিনা বিশেষ উপযোগী।

জননাঙ্গের অত্যন্ত অনুভূতি ; বস্ত্রের স্পর্শ সহ্য করিতে পারা যায়না ; জননেন্দ্রিয় পরীক্ষা করিলে আক্ষেপ উৎপন্ন হয় ; রমণ-কালে অগ্রে কষ্ট অনুভূত হয় ; সংসর্গকালে মূর্চ্ছা জন্মে অথবা উহা সহ্য করিতে পারা যায়না (মিউর,ও অরিগেনম তুলনা করুন)।

বেদনা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং সেইরূপ ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয় (ষ্টান) ; তৎসহ বেদনাক্রান্ত স্থানের অবশতা থাকে (ক্যাম)

গুল্ম-বায়ুগ্রস্ত (hysterical) রোগিণী, পর্য্যায়ক্রমে প্রফুল্লতা ও বিমর্ষতা, সহজে ক্রন্দন (ক্রোক, ইগ্নে, পলস) ; পাণ্ডুরতা, সহজে শ্রান্তির উৎপত্তি।

উদ্ধত, গর্ব্বিত, প্রগল্ভ প্রকৃতি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি উপেক্ষা ; অনিচ্ছায় একপ্রকার তাচ্ছিল্য করা।

মানসিক ভ্রান্তি, রোগিণীর সমীপবর্ত্তী প্রত্যেক বস্তুই যেন ক্ষুদ্র ; সকল ব্যক্তিই যেন শারীরিক ও মানসিক সম্বন্ধে নিকৃষ্ট, কিন্তু তাহার নিজের শরীর বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ ; এপ্রকার অনুভব

সকল দিকেই যেন রোগিণী বৃহত্তর হইতেছে এরূপ অনুভব।

সামান্য বিষয়ে গভীর বিরক্তির উৎপত্তি (ইগ্নে, ষ্ট্যাফ) ; অনেকক্ষণ মনে মনে রাগ করিয়া থাকা।

অল্পভাষিতা ও মৃত্যু-ভয় সহকারে জীবনে পরিতৃপ্তি (একন, আস´)।

ভয়, শোক, বিরক্তি; এবং কৃত্রিম মৈথুন, ও অহঙ্কারের পরে মানসিক উপদ্রব।

মানসিক লক্ষণের উপস্থিতিতে শারীরিক লক্ষণের বিরতি এবং শারীরিক লক্ষণের উপস্থিতিতে মানসিক লক্ষণের নিবৃত্তি

শিরঃপীড়া।—মস্তিষ্কে বা মস্তকের শিখরাগ্রে অবশতা ও গুরুত্বজনক বেদনা; ক্রোধ বা বিরক্তি হইতে; ও জরায়ুর রোগজনিত হিষ্টিরিয়া হইতে উহার উৎপত্তি; বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্তি

কামোন্মাদ। সূতিকাবস্থায় উহার বৃদ্ধি; ইন্দ্রিয়-লিপ্সার অত্যধিক বিকাশ, বিশেষতঃ কুমারীদিগের (কালী-ফস); যোনি-মুখের অনৈচ্ছিক আক্ষেপিক অবরোধ, আক্ষেপ ও আকুঞ্চন

নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, অতিশয় অধিক পরিমাণে, অতিরিক্ত অধিক দিন স্থায়ী ঋতু; মলিনবর্ণ, সংযত, দুর্গন্ধ, কুঞ্চনবৎ আক্ষেপ সংযুক্ত স্রাব; হেঁচকা টান সংযুক্ত জরায়ুর বেদনা; জননাঙ্গের অতিরিক্ত অনুভূতি।

জরায়ুতে অতিশয় কণ্ডূয়ন, ভগ-কণ্ডূয়ন।

কোষ্ঠবদ্ধতা —পর্য্যটন কালে (সমুদ্রে, ব্রাই); সীসদ্বারা বিষাক্ত হইবার পরে; অন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা হইতে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মল বেগ; সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে নরম কাদার ন্যায় মল লাগিয়া থাকে (এলম), ঔপনিবেশিকদিগের; গর্ভাবস্থায়, ও কষ্ট বিফল হইবার পরে দুর্দ্দমা অবস্থায়, কোষ্ঠ-রোধ।

জরায়ুর রক্তস্রাব।—কালকাল সংযত রক্তখণ্ড ও তরল রক্ত একত্র স্রাব; গাঢ়, কাল, আলকাতরার মত অথবা জমাট-বাঁধা রক্ত-পিণ্ড স্রাব (ক্রোক)।

সম্বন্ধ।—অরম, ক্রোক, ইগে, কালী-ফস, পলস, সিপি, ও ষ্ট্যানের সহিত প্লাটিনার সমগুণ সম্বন্ধ

ভ্যালে প্লাটিনার উদ্ভিজ্জ সমগুণ।

ফসফরাস ।

(Phosphorus)

যে সকল রক্ত-প্রধান-ধাতুর ব্যক্তির দীর্ঘ ও ক্ষীণ দেহ, সুন্দর ত্বক, সুকুমার চক্ষু-পক্ষ্ম, সুন্দর সূক্ষ্ম অথবা আরক্ত চুল ; এবং যাহাদের দ্রুত তীব্র প্রতিবোধ (perceptions) ও তীব্র অনুভূতি, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। যে সকল যুবক-যুবতী শীঘ্র শীঘ্র বদ্ধিত হয়, যাহাদের অবশীর্যতার প্রবণতা থাকে (অবনীর্য হইয়া হাঁটে, সল), এবং ক্লোরোসিস , ও এনিমিয়া রোগ থাকে, তাহাদের পক্ষে , এবং প্রাতঃকালীন অতিসার বিশিষ্ট বৃদ্ধদিগের পক্ষে ; ফসফরাস সুপ্রযুজ্য ।

আলোক, শব্দ, গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি বাহ্য সংস্রবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অনুভূতি (ইগ্নে, নক্স , টারাণ)

অস্থিরতা , অবিরত সঞ্চালন, এক মুহূর্ত্তও স্থির হইয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে পারা যায় না (পদ দ্বয়ের অস্থিরতা, জিঙ্ক)

জ্বালা —মেরুদণ্ডের স্থানে স্থানে ; স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্য ভাগে (বরফ খণ্ডের অনুরূপ ল্যাক-না), অথবা পৃষ্ঠের উপর দিকে প্রখর উত্তাপের প্রধাবন ; করতলের জ্বালা (ল্যাক), বক্ষঃস্থলে ও ফুসফুসের জ্বালা ; শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রের ও বিধান-তন্তুর জ্বালা (আর্স সলফ), সাধারণতঃ স্নায়ু-মণ্ডলের রোগে।

মস্তক, বক্ষঃস্থল, আমাশয় ও সমগ্র উদরে এক প্রকার দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা অনুভব ।

বেদনা —বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে বেদনা, সামান্য প্রচাপনেও উহার বৃদ্ধি, পর্শুকা-মধ্যবর্ত্তী স্থানে (intercostal space), ও বামপার্শ্বে শয়নে বেদনা, অত্যল্প মাত্র শীতে বেদনার উদ্রেক। অনাবৃত বায়ু সহ্য হয়না।

চক্ষু।—নিমগ্ন, নীলবর্ণ মণ্ডল-পরিবেষ্টিত চক্ষু ; চক্ষুর পাতার স্ফীততা, জলপূর্ণ স্ফীততা (উপরের পাতার স্ফীততা, কালী-কা ; নীচের পাতার, এপিস) ।

ঔদাস্য; কথা বলিতে অনিচ্ছা; ধীরে ধীরে উত্তর দান, আস্তে আস্তে সঞ্চলন।

জীবনে শ্রান্তি, বিষণ্ণ ও পূর্ব্বভাবী ভাবনা।

খুসকি বা খুসিকা; বহু সংখ্যক একত্র পতন (ফাই); থোপা থোপা কেশ-পতন, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানের টাক।

স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা; কম্পন ম্যাগ্নেটাইজ হইবার ইচ্ছা

সমগ্র শরীরের দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা; জীবনের তরল বিধানের অপচয় বশতঃ দৌর্ব্বল্য ও শ্রান্তি (সিঙ্ক, ফস-এসি)

শীতল খাদ্য ও পেয় দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা, সিক্ত দ্রব্যের স্পৃহা, বরফ ভক্ষণে আমাশয়ের যাতনার হ্রাস।

উষ্ণ জলে হাত রাখিলে বিবমিষা জন্মে, শীতলজলে হাত রাখিলে হাঁচি ও সর্দ্দি হয় (ল্যাক-ডি)

জল আমাশয়ে উষ্ণ হইবা মাত্র উঠিয়া পড়া

গ্রাসে গ্রাসে ভুক্তদ্রব্য উদ্গীরণ (ফেরম)

কোষ্ঠ-কাঠিন্য, সরু, লম্বা, শুষ্ক, দুর্গন্ধ, ও শক্ত, কষ্টে নিঃসারিত মল (কষ্টি, গ্র্যাফ)।

অতিসার।—মলদ্বারে কিছু প্রবেশ করিবা মাত্র; পিচকারীর জলের ন্যায় বেগে নিঃসৃত, সাগুর ন্যায় দানা দানা মিশ্রিত, জলবৎ, মলদ্বার যেন বিমুক্ত রহিয়াছে এরূপ অনুভব বিশিষ্ট (এপিস, সিকে); অনিচ্ছায় বিনির্গত, ওলাউঠার সময় প্রাদুর্ভূত (ওলাউঠার পূর্ব্ববর্ত্তী, ফস-এসি)। এবং বৃদ্ধদিগের প্রাতঃকালীয়; অতিসার।

গর্ভাবস্থা।—গর্ভকালে জলপানে অসামর্থ্য; জল দর্শনে বমনের উৎপত্তি; স্নান করিবার সময় চক্ষু বুজিয়া থাকার আবশ্যকতা (লাইসি)।

রক্তস্রাব।—পুনঃ পুনঃ প্রভূত পরিমাণে, বিমুক্ত ভাবে রক্তপাত, অনন্তর কিয়ৎকালের জন্য উহার বিরতি; ফুসফুস হইতে রক্তপাত; জরায়ু হইতে রক্তপাত, ক্যান্সার হইতে রক্তস্রাব; রজোবিলোপে নাসিকা, আমাশয়, মল-দ্বার ও মূত্র-দ্বার হইতে অনুকল্প রক্ত-স্রাব।

বক্ষঃস্থলের উপর যেন কোন গুরুভার স্থাপিত রহিয়াছে এরূপ গুরুত্ব অনুভব।

ঘর্ম্মে গন্ধকের গন্ধ।

বামদিকের নিম্ন হনুর অস্থি-পচন (Necrosis)।

রক্তস্রাব-প্রবণ শারীরিক প্রকৃতি, সামান্য অভিঘাত হইতে প্রভূত রক্তপাত (ক্রিয়ো, ল্যাক) প্রতি শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর দ্বার হইতে রক্তস্রাব

স্বরযন্ত্রে এতই বেদনা যে কথা বলিতে পারা যায় না, উষ্ণ হইতে শীতল বায়ুতে গেলে (ব্রাইওনিয়ার বিপরীত), হাসিলে, কথা বলিলে, পড়িলে, খাইলে ও বাম পাশে শুইলে, কাসের উদ্রেক হয় (ড্রস ষ্ট্যান)

হানিম্যান বলেন যে পুরাতন অতিসারগ্রস্ত রোগীদিগের প্রতি এই ঔষধের সমধিক উপকারজনক ক্রিয়া দর্শে

উপচয় —দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে (পলস, রাস) একাকী থাকা কালে, বাম বা ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে আলোকে, মেঘগর্জ্জন কালে; উত্তপ্ত বা শীতল ঋতুর পরিবর্ত্তনে, ও উষ্ণ বস্তু আহারে; বৃদ্ধি

উপশম —অন্ধকারে; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে, নিদ্রান্তে, শীতল দ্রব্য আহারে মর্দ্দনে বা মিসমেরাইজ করিলে, ঠাণ্ডা শীতল বায়ুতে মস্তক ও মুখমণ্ডলের লক্ষণের উপশম কিন্তু বক্ষঃস্থল গলা ও ঘাড়ের লক্ষণের বৃদ্ধি

সম্বন্ধ —(১) আর্সেনিকের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ (২) কষ্টিকমের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ কষ্টিকমের পূর্ব্বে বা পরে ফসফরাস ব্যবহৃত হয় না। (৩) সিঙ্কোনা বা ক্যালকেরিয়ার পরে ফসফরাস ভাল খাটে। (৪) আইওডিন সেবনের ও অতিরিক্ত লবণ আহারের মন্দফল ফসফরাস দ্বারা নিবারিত হয়

ফসফরিক এসিড।

(Phosphoric Acid)

পূর্ব্বে যাঁহাদের শরীর সবল ছিল, কিন্তু পরে শুক্রাদি জীবনের তরল বিধানের অপচয়, অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা (সিঙ্ক), প্রবল তরুণ

রোগ এবং শোক-দুঃখ, দুশ্চিন্তা, ভগ্ন প্রেমাদি জনিত দীর্ঘকাল স্থায়ী চিত্তবিকার বা বৈষয়িক বশতঃ যাহারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ সমধিক উপযোগী

পাণ্ডুবর্ণ, রুগ্ন মুখাকৃতি, নীলবর্ণ ওষ্ঠ-পরিবেষ্টিত নিমগ্ন নয়ন। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, শোক, দুঃখ ও স্বগৃহে যাইবার জন্য কাতরত জনিত রোগ (ইগ্নে); নিদ্রালুতা বিলাপ-প্রবণতা, প্রাতঃকালের প্রাক্কালে নৈশ ঘর্ম

মৃদু ও বিনীত স্বভাব (পল)।

অন্যাবিষ্টতা ও উদাসীনতা, জীবনের কার্য্যে বিরাগ, যে সকল বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল তাহাতে অনাসক্তি, শোকে বিহ্বলতা।

অতি বর্দ্ধনশীল বালক বালিকা ও যুবক-যুবতী (ক্যাল্ক, ক্যাল্ক-ফস) পৃষ্ঠে ও অঙ্গে আঘাতিতবৎ বেদনা

প্রলাপ — অবোধ্য মৃদু (বিড়বিড়) প্রলাপ, সুপ্ত অথবা মোহবৎ নিদ্রায় পড়িয়া থাকা, চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে তদ্বিষয়ে জ্ঞানশূন্যতা; জাগরিত করিলে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাপ্রাপ্তি, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের ধীরে ধীরে ও পরিশুদ্ধরূপে উত্তর প্রদান, পুনর্বার আবার সুপ্তি (stupor)

রোগীর কম্পন, জঙ্ঘার দুর্বলতা সহজে হোঁচট লাগা, বা পদস্খলন।

গণ্ডমালা, উপদংশ অথবা পারদ দোষ বশতঃ অস্থির অন্তর্বর্ত্তী বিধানের প্রদাহ অস্থি-বেষ্টের প্রদাহ, জ্বালাকর বেদনা, ছুরি দিয়া চাঁচার ন্যায় ছেদনবৎ বেদনা (মেজেরি), কেরিজ নেক্রোসিস, কিন্তু নিক্রোসিস নহে; বিবর্দ্ধনশীল বেদনা।

শিরোঘূর্ণন।—সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে মস্তকের নিমগ্নতা; চক্ষু বুজিলে শিরোঘূর্ণন টাইফাস জ্বরে উঠিয়া বসিলে পতন, শয্যায় শয়ন করিয়া থাকার সময় মাথা স্থির রহিয়া পা যেন উপরে যাইতেছে এরূপ অনুভব.

শিরঃপীড়া —মস্তকের মধ্যস্থানে প্রচাপক ভার, অধিকদিন স্থায়ী শোক অথবা স্নায়ুর অবসন্নতা বশতঃ উহার উৎপত্তি, মস্তকের ও গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে; সাধারণতঃ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে বেদনা, নড়িলে চড়িলে, গোলমালে, বিশেষতঃ গীত-বাদ্যে উহার বৃদ্ধি শয়নে উপশম (থাই, জেল,

সিলি), চক্ষুর অতি ব্যবহার বশতঃ বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের শিরঃপীড়া; (ক্যাল্ক-ফ, ন্যাট-মি) অতিরিক্ত বর্দ্ধনশীল ছাত্রদিগের শিরঃপীড়া

শরীর-শাখার অন্তভাগের স্নায়ুতে ছিদ্রকরণ, টানন ও খননবৎ বেদনা; অঙ্গচ্ছেদের পর অবশিষ্টাংশে স্নায়বীয় রোগ (সেপা)

অতিসার।—বেদনাশূন্য, অদৌর্ব্বল্যজনক; পীত বা শ্বেতবর্ণ; বায়ু সহকারে, অনিচ্ছায় নির্গত (এলো, ন্যাট); অম্লদ্রব্য, ওলাউঠা ও ভয়জনিত; অতিসার

মূত্র —লেহবৎ, রক্তাক্ত খণ্ডমিশ্রিত দুগ্ধবৎ-দৃষ্ট মূত্র; মূত্র সত্বর বিসগাসিত হয়; রাত্রিতে পরিষ্কৃত জলবৎ প্রভূত মূত্র, ত্যাগের পর তৎক্ষণাৎ উহার উপর শুভ্র সরের উৎপত্তি (ফসফেটের আধিক্য, স্নায়ু ক্ষয়)

কৃত্রিম মৈথুন; দূষিত ক্রিয়ার অপরাধিতায় রোগীর অতিশয় যাতনা (ডাইওস, ষ্ট্যাফ,)।

অনৈচ্ছিকশুক্রস্রাব—বারংবার, দৌর্ব্বল্যকর, প্রভূত শুক্রপাত; সংসর্গের পরেও শুক্রস্রাব, শুক্রস্রাবের পর অতিশয় সম্ভোগলিপ্সা, এক রাত্রিতে দুই বা ততোধিকবার শুক্রপাত, স্বলজ্জত্ব, দুঃখিতত্ব, ও আরোগ্যাশাবিহীনত্ব (কৃত্রিম মৈথুনের দুর্নিবার প্রবৃত্তি সহকারে—অষ্টি)

বক্ষঃস্থল।—কথা বলিলে ও কাসিলে বুকের দুর্ব্বলতা (ষ্টান); যক্ষ্মা; তরল বিধানের অপচয়, অতি শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধন ও অবসাদজনক মনোভাব বশতঃ স্নায়বীয়তা

মস্তিষ্ক (cerebral) টাইফয়েড বা টাইফস জ্বর, সম্পূর্ণ ঔদাস্য ও সুপ্তি; কাঠের গুঁড়ির ন্যায় পড়িয়া থাকা কোন বিষয়ে কোন খবর না লওয়া; চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে তৎপ্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগ; অন্ত্র হইতে ময়লা রঙ্গের রক্তস্রাব

উপচয় —মানসিক পীড়া জন্য; শুক্রাদি তরল-বিধানের অপচয় বশতঃ কৃত্রিম মৈথুন; অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা বশতঃ বৃদ্ধি কথা বলিলে বক্ষঃস্থলে দুর্ব্বলতার উৎপত্তি (ষ্টান)।

উপশম।—সঞ্চলন; উষ্ণতা ও আর্দ্রকালে; হ্রাস (কষ্ট, নক্স)।

সম্বন্ধ।—(১) টাইফয়েড জ্বরে, ফস, পলস, পিক-এসি, সিপি ও মিউ-

এসিড় সহিত ; এবং ঔদাস্য, সুপ্তি ও প্রলাপে, নাইট-স্পিরি-ডলসিসের সহিত এসিড ফসের তুলনা হয় (২) শরীর-ক্ষয়কর ঘর্ম্ম, অতিসার ও দুর্ব্বলতায় সিঙ্কোনার পূর্ব্বে ও পরে ; এবং আহারের পরে মূর্চ্ছায় নক্সের পরে ; ফস-এসি ভাল ক্রিয়া করে।

ফাইটোল্যাক্কা।

(Phytolacca)

আমবাতিক ধাতুর রোগী ; পেশী-তন্তু ও অস্থি-বেষ্টের বাত, পারদ বা উপদংশ হইতে উহার উৎপত্তি।

শীর্ণতা, হরিৎপাণ্ডু, শরীরের বসার ক্ষয়প্রাপ্তি।

অতিশয় ক্লান্তি ও প্রগাঢ় অবসন্নতা।

ব্রাইওনিয়া ও রাসটক্স দেখিতে সুন্দর উপযোগী দেখাইলেও যখন এই ঔষধ দ্বয়ে সফলতা লাভ হয় না তখন ফাইটো ব্যবহারে আরোগ্য জন্মে।

ডিপথিরিয়া, প্রমেহ, পারদ ব উপদংশের পরবর্ত্তী আমবাত ও স্নায়ু-শূল

তাড়িতাঘাতের ন্যায় বেদনার সঞ্চরণ ; চিড়িক-মারা ও ছুরিদিয়া কাটার মত ; শীঘ্র শীঘ্র স্থান-পরিবর্ত্তনশীল বেদনা (ল্যাক-ক্যান, পলস) ; নড়িলে চড়িলে ও রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি

জীবনে সম্পূর্ণ ঔদাস্য ; রোগিণী মনে করে যে সে নিশ্চয়ই মরিবে।

শিরোঘূর্ণন ; শয্যা হইতে উঠিবার সময় শক্তিহীনতা অনুভব (ব্রাই)

তীব্র শিরোবেদনা ও পৃষ্ঠ-বেদনা, সর্ব্বশরীরে খঞ্জতা, ব্যথিতত্ব ও দুষ্টতা অনুভব অবিরত নড়িতে চড়িতে ইচ্ছা, কিন্তু নড়িলে চড়িলে বেদনা বৃদ্ধি পায় ; (ল্যাক-ক্যান, মার্ক ; নড়িলে চড়িলে হ্রাস পড়ে, রাস)।

দন্তোদ্ভেদ-কালে দন্ত অথবা দন্ত-মূল একত্র দংশন করিবার দুর্নিবার প্রবৃত্তি (পডো)

গল-ক্ষত (Sore throat) ; উহার মলিন লোহিতবর্ণ, আল-জিহ্বার বৃহত্ত্ব, শোথ, প্রায় আংশিক স্বচ্ছতা (কালী-বাই, রাস)

ডিপথিরিয়া।—গলাধঃকরণে গলা হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনার সঞ্চরণ, গিলি-

নাব সময় জিহ্ব মুখে অতিশয় বেদনা জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা অগ্নিরক্ত তপ্ত লৌহ সংলগ্নের ন্যায় জ্বালা; পরিশুষ্কতা; হস্ত-কম্প সহ গিলিতে কষ্ট; ক্রমাগত গলাধঃকরণের ইচ্ছাসহ গলায় যেন একটা পিণ্ড রহিয়াছে এ প্রকার অনুভব; তালুমূল, অলি-জিহ্ব, ও গল-মধ্যের পশ্চাৎ ভাগের ভস্মবর্ণ ঝিল্লীদ্বারা (membrane) আচ্ছন্নতা;: -তপ্ত তরল দ্রব্য পান করিতে অসমর্থতা (ল্যাক)

ডিফথিরিয়া ও আরক্ত জ্বরের পরে ক্যারোটীড্ ধমনীর গ্রন্থির ও হনু-নিম্ন-গ্রন্থির দৃঢ়তা।

স্তনে অনেকগুলি শক্ত ও ব্যথিত অর্ব্বুদ।

স্তনের সত্বর স্ফোটক জন্মিবার সম্ভাবনা, পূর্ণতা, প্রস্তরবৎ দৃঢ়তা ও ব্যথিতা বিশেষতঃ যখন পূয়োৎপত্তি অপরিহার্য্য, সন্তান স্তনপান কালে স্তন-বৃন্ত হইতে সর্ব্ব শরীরে বেদনার সঞ্চরণ (পৃষ্ঠে-গতি, ক্রোটেলাস জরায়ুতে গতি, পলস, সিপি)

স্তনব্রণ; নালী, হাঁ-করা প্রদাহিত ক্ষত, দূষিত, রসানীব ক্ষত, অসুস্থ পূয

স্তনের স্ফীততা সত্ত্বেও পাকেওনা, উহার বেগুনী রং এবং "পুরাতন পনিরের ন্যায় কাঠিন্য" (বাই, ল্যাক-ক্যান, ফেল.)

স্তন-বৃন্তের অতিরিক্ত অনুভূতি, স্পর্শ-দ্বেষ ও বিদারণ (গ্রাফ); সন্তানকে স্তনদানে উহার দারুণ বৃদ্ধি, সর্ব্ব শরীরে বেদনার বিকীরণ

ফাইটো পূয়োৎপত্তির সম্ভবতা জন্মায় (হিপ, ল্যাক, মার্ক, সিলি)

উপচয়।—বৃষ্টির সময় ও আর্দ্র শীতল বায়ুভোগে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—কালী-আইওডের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ

ফাইসষ্টিগমা।

(Physostigma)

অসাধারণ মানসিক ক্রিয়াশীলতা, চিন্তাকরা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারা যায় না।

দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা · কলঙ্ক (blur) বা পাতলা পরদা হইতে উহার উৎপত্তি ; দৃষ্টবস্তু বিমিশ্রিত দেখায়

ব্যবহারের পর চক্ষু-বেদন ; চক্ষুর সম্মুখে ভাসমান কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ও আলোকের শিখা দর্শন, চক্ষুর পাতা ও পেশীর স্পন্দন (স্পার) ; নিষ্ট্যাগমস্ (অক্ষি গোলকের অনৈচ্ছিক পরিদোলন)

পেশী-মণ্ডলের অতিশয় অবসন্নতা ; গতিশক্তির ক্ষীণতা (জেলস)

মানসিক বা শারীরিক উপদ্রব বশতঃ যুবক যুবতীদিগের কম্প

স্বয়ম্ভূত বা আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কার, কোন গতিশীল লোকের যৎ সামান্য নিশ্বাস-বায়ুতে উহার উপস্থিতি বা উপচয় (হাইপর, নাইসি, নক্স, ষ্ট্রিক)

সম্বন্ধ।—বেল কোন কিউর, জেলস, হাইপার, ও ষ্ট্রিকনিয়ার সহিত এই ঔষধের তুলনা হয়

ফিরম্।

(Ferrum met)

রক্ত-প্রধান-ধাতু, বিবাদ ও বিতর্ক প্রিয়, সহজে উত্তেজিত ; যৎসামান্য প্রতিবাদে রাগান্বিত ব্যক্তি (এনাক, কষ্ট, ইগে) ; এবং দুর্ব্বল, সুকুমারী, হরিৎপাণ্ডু রোগগ্রস্তা অথচ অতিশয় আরক্ত-বদনা নারীদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

রক্তস্রাব-প্রবণ শারীরিক প্রকৃতি, উজ্জ্বল লোহিত রক্তপাত, সহজে উহা সংযত হয় (coagulates easily) (ফিরফস ইপি, ফস)।

মুখমণ্ডলের অত্যন্ত পাণ্ডুরতা এবং অত্যল্প মাত্রে বেদনায় ; সঞ্চালনে বা শ্রমে উহার আরক্ততা ও উদ্দীপ্ততা, মুখ-রাগ (blushing) (এমিল, কোকা)।

উপদাহিতা ; যৎসামান্য গোলমালে, এমন কি কাগজের কড় কড় শব্দে পর্য্যন্ত রোগীর নৈরাশ্য জন্মে (এসার, টার)

দুর্বলতা বশতঃ যদিও রোগীকে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়, তথাপি আস্তে আস্তে হাঁটিয়া বেড়াইলে রোগী সর্ব্বদাই ভাল বোধ করে

কোন জীবনী ক্রিয়ার বিকৃত বিবৃদ্ধি বশতঃ হরিৎ পাণ্ডু (Plethoric chlorosis), শীত ঋতুতে উহার বৃদ্ধি।

ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল, জিহ্বা ও মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রভৃতি আরক্ত স্থানের শুভ্রবর্ণ প্রাপ্তি।

ঋতু।—নিয়মিত সময় অপেক্ষা শীঘ্র উপস্থিত, অধিক দিন অবস্থিত, প্রভূত ঋতু, তৎসহ অগ্নিবৎ আরক্ত মুখমণ্ডল; কর্ণে ঝন্ ঝন্ শব্দ, ঋতুস্রাবের একবারে দুই তিন দিন বিরতি, তৎপরে পুনরায় প্রত্যাবৃত্তি; পাণ্ডুবর্ণ জলবৎ, দৌর্ব্বল্যকর রজ-স্রাব

শিরোঘূর্ণন —জলের উপর থাকার ন্যায় তোল করার (balancing) মত অনুভব সহকারে; প্রবাহিত জল দর্শনে; জলের উপর হাঁটিবার সময়, যথা সেতু পার হইবার কালে, নীচে নামিবার সময় (বোর, ফ্লান), শিরোঘূর্ণন।

শিরঃপীড়া —দুই তিন সপ্তাহ পর পর, দুই তিন বা চারি দিনব্যাপী, মুদ্গরাঘাত বা করাঘাতবৎ স্পন্দনজনক বেদনা ও শয়নের আবশ্যকতা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া, তৎসহ আহার বা পানে অপ্রবৃত্তি।

বিবমিষা ব্যতীত গ্রাসে গ্রাসে ভুক্ত-দ্রব্য উদ্গীরণ (ফেরম)

সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে অত্যন্ত অপ্রবৃত্তিসহ ক্ষুধাহীনতা, অথবা কুক্কুরবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা

বমন —দুই প্রহর রাত্রির অব্যবহিত পরে বমন; আহার করিবা মাত্র ভুক্তদ্রব্য বমন; খাইতে খাইতে সহসা উঠিয়া যাইয়া যাহা কিছু আহার করা গিয়াছে সমস্ত এক উদ্যমে বমন করিয়া ফেলা, পুনরায় বসিয়া খাইতে পারা; অম্ল বমন (লাই, সল-এসি)

অতিসার —রাত্রিতে অপরিপাচিত মল, অথবা আহার বা পান করিবার সময় মলস্রাব (ক্রোট-টি); উত্তম ক্ষুধা সহকারে বেদনা শূন্য অতিসার; ক্ষয়রোগগ্রস্তদিগের অতিসার

কেবল দিবাভাগে কাস (ইউক্রে); শয়ন করিলে উহার উপশম; ও আহারান্তে উপশম (স্পঞ্জ)।

শরীরের তরল বিধানের অপচয়ের পরে; কুইনাইন অপব্যবহারে; ও সবিরাম জ্বরের অবরোধে, উৎপন্ন শোথ (কার্ব্বো, সিঙ্ক)

কোষ্ঠকাঠিন্য। অন্ত্রের দৌর্ব্বল্য জনিত, নিষ্ফল মল প্রবৃত্তি বিশিষ্ট, শক্ত, আয়াসে বিনির্গত ও মলত্যাগের পর পৃষ্ঠে বেদন অথবা সরলান্ত্রে খল্লীবৎ বেদনা সংযুক্ত, শিশুদিগের গুহ্যভ্রংশ সমন্বিত, এবং রাত্রিতে মলদ্বারের কণ্ডূয়ন লক্ষণাপন্ন; মল-কৃচ্ছ্র।

আস্তে আস্তে হাঁটিলে সর্ব্বদাই ভাল বোধ হয়, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগীকে বাধ্য হইয়া শয়ন করিতে হয়।

উপচয়।—বিশ্রাম কালে, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি

উপশম।—ধীরে ধীরে হাঁটিলে; ও গ্রীষ্মকালে হ্রাস

সম্বন্ধ।—(১) এলম ও সিঙ্কোনার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) কি তরুণ কি পুরাতন প্রায় সকল রোগেই ফিরমের পরে সিঙ্কোনা ভাল খাটে।

ফ্লোরিক এসিড।

(Fluoric Acid)

বার্দ্ধক্যের বা অকালবার্দ্ধক্যের রোগ, উপদংশ ও পারদজনিত ধাতু-দুষ্টতা এবং যুবক-যুবতীদিগের বৃদ্ধবৎ দর্শন।

শ্রান্তি ব্যতীত শারীরিক পরিশ্রমের বিবর্দ্ধিত সমর্থ্য (কোকা), গ্রীষ্মকালের, অতি গ্রীষ্মের ও শীতকালের শীতের অল্পতর প্রভাব অনুভব।

পুরাতন ক্ষত-চিহ্নের প্রান্তভাগের চারিদিক লাল হইয়া উঠা ও কাঁচা ক্ষত জন্মিবার সম্ভাবনা (কষ্ট, গ্রাফ)।

বহু সন্তানের প্রসূতাদিগের শিরার স্ফীততা ও ক্ষত, উহার দীর্ঘকালস্থায়িতা ও দুর্দ্দম্যতা।

অস্থির, বিশেষতঃ দীর্ঘাস্থির কেরিজ ও নিক্রোসিস, সোরা-দোষ, উপদংশ-দোষ এবং পারদ বা সিলিসিয়ার অপব্যবহার হইতে উহার উৎপত্তি [এঙ্গস্]।

বালক-বালিকাদিগের দক্ষিণ শঙ্খ স্থানের (Temple) চেপ্টা জটুল (জন্ম-চিহ্ন) ; কৈশিকানাড়ীর অর্ব্বুদ (ক্যাল্ক-ফোব, টিউব)।

ক্ষত —লোহিতবর্ণ প্রান্ত ও ফোদাসংযুক্ত গর্ত ; শয্যা ক্ষত ; উষ্ণতায় বৃদ্ধি ও শীতলতায় হ্রাস প্রাপ্তি ; কোন এক ক্ষুদ্র স্থানে নিবদ্ধ, বিদ্যুৎ রেখার স্থায় প্রচণ্ড বেদনা।

শীঘ্র শীঘ্র দন্তের ক্ষয় প্রাপ্তি ; দন্তনালী বা নেত্র নালী (নালী ঘা), মুখমণ্ডলের অস্থির অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন (হেক্লা)।

সম্বন্ধ —(১) কোবা ও সিলির সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) মদ্য-পায়ীদিগের উদরীরোগে আর্সেনিকের পরে ; বক্ষঃ রোগে (হিপ-ডিজিজ) কালী কার্ব্বের পরে ; দন্তের অতিরিক্ত অনুভূতিতে, কফি ও ষ্টাফের পরে ; বহুমূত্রে ফস-এসির পরে ; অস্থিরোগে, সিলি ও সিম্ফার পরে ; এবং গলগণ্ডে, স্পঞ্জিয়ার পরে ; ফ্লোরিক এসিড ভাল খাটে।

বার্ব্বেরিস ভং‌লগেরিস।

(Berberis Vulgaris)

বৃক্কক (kidney) অথবা মূত্রাশয়ের লক্ষণের প্রাধান্য

কটিতে বেদনা ; বৃক্কক-প্রদেশে অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ ; উপবেশনে ও শয়নে, এবং সঞ্চালন ও শ্রান্তি বশতঃ উহার আতিশয্য

বৃক্কক-প্রদেশে জ্বালা ও টাটানি।

বৃক্কক-প্রদেশে ও কটিদেশে প্রতাপনসংযুক্ত অবশতা, অাড়ষ্টতা, ও খঞ্জতা (lameness)

মুখমণ্ডলের মৃত্তিকার স্থায় পাণ্ডুবর্ণ, গণ্ডদ্বয়ের নিম্নগতা, এবং নীলমণ্ডল-পরিবেষ্টিত কোটর-গত চক্ষু

মূত্র-যন্ত্রের রোগ সহকারে আমবাত ও গ্রন্থিবাত জনিত পীড়া।

পিত্ত-শিলা (gallstone) জনিত উদর বেদনা।

পিত্তজনিত উদর বেদনা, তৎপরে পাণ্ডু-রোগ; কর্দ্দম-বর্ণ-মল; পিত্তলক্ষণ ও কুগস্থানের কণ্ডূয়ন সহকারে ভগন্দর (fis ula in ano) হ্রস্বকাস ও বক্ষঃস্থলের পীড়া, বিশেষতঃ ভগন্দরে শস্ত্রক্রিয়ার পরে (ক্যাল্ক-ফস, সিলি)।

বাম বৃক্কক হইতে মূত্রবাহীনলের (ureter) পথে মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গ (urethra) পর্য্যন্ত সূচী-বেধন ও কর্ত্তনবৎ বেদনা (ট্যাব—দক্ষিণ বৃক্কক হইতে, লাইক)।

বৃক্কক শূল, বামপার্শ্বে আতিশয্য (ট্যাব-মূলবেগ ও মূত্র-কৃচ্ছ্র সহ যে কোন পার্শ্বে, ক্যান্থ)।

বৃক্ককে জল-বুদ্বুদ্ উত্থিতির ন্যায় অনুভব (মেড)।

মূত্র —ঈষৎ হরিদ্বর্ণ (greenish), রক্তের ন্যায় লোহিত, গাঢ় আঠা আঠা রেশা সংযুক্ত" স্বচ্ছ, ঈষৎ আরক্ত অথবা স্নেহবৎ (jelly like) অধঃপতিত পদার্থ-বিশিষ্ট; মূত্র

সঞ্চালনে মূত্র বেগের উপস্থিতি অথবা বৃদ্ধি।

উপচয় —সঞ্চালন, বিচরণ বা শকটারোহণ; এবং আকস্মিক সংঘর্ষণে বৃদ্ধি

সম্বন্ধ।—(১) বৃক্কক-শূলে, ক্যান্থ, লাই, সার্সা, ট্যাবের সহিত সমগুণ সম্পন্ন (২) আমবাতিক রোগে, আর্ণ, লাই, ক্যালী-লাই, হ্রাস ও সলফের পরে এই ঔষধের ভাল ক্রিয়া দর্শে

বিসমথ।

(Bismuth)

নির্জ্জনতা সহ্য হয় না। লোক-সংসর্গের ইচ্ছা, শিশু সংসর্গার্থে মাতার হাত ধরিয়া থাকে (ক্যালী-কা, লিলি, লাই)।

উৎকণ্ঠা; রোগী কখন বসে, কখন হাঁটে, কখন শোয়, কখনও একস্থানে অনেকক্ষণ থাকে না।

প্রতি শীতকালে শিরঃপীড়ার পুনরাবৃত্তি, আমাশয়-শূলের সঙ্গে সঙ্গে, বা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিতি।

মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুরতা, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডল।

শীতল জল মুখে রাখিলে দন্ত-বেদনার উপশম (ব্রাই, কফি, পলস)।

বমন।। জল আমাশয়ে উপস্থিত হইলেই বমন হইয়া পতন, ভুক্তদ্রব্যের অধিকতর সময় অবস্থিতি (ভুক্তদ্রব্য ও জল বমন, আর্স)

কয়েকদিন পরে পরে, আমাশয় ভুক্তদ্রব্যে পূর্ণ হইলে অধিক পরিমাণে বমন; পান করিবামাত্র সকল প্রকার তরল পদার্থ বমন; এবং দুর্গন্ধ মল বিরেচন (জলবৎ মল, ভিরে); তৎসহ আক্ষেপিক মুখ-রোধ ও অকথ্য বেদনা, উদর ছেদের (laparotomy) পরে উহার উৎপত্তি (নক্স, ষ্ট্যাফ)।

আমাশয়।—কোন এক ক্ষুদ্র স্থানে, ভারী বস্তুর চাপের ন্যায় চাপ, তৎসহ, পর্য্যায়ক্রমে জ্বালা ও খাল-ধরার ন্যায় আক্ষেপিক বেদনা; তৎসহ উপদাহ, হৃদ্দাহ (বুক-জ্বালা) ও মুখ-প্রসেক (মুখে জল-উঠা)।

বমন-প্রধান, মৃদু ওলাউঠা ও গ্রীষ্মকালীয় উদরাময়; মলিন, সোদবৎ জলবৎ, দুর্গন্ধ, অতিশয় অবসন্নতাজনক মল (আর্স, ভিরে)।

বেঞ্জোইক এসিড।

(Bonzoic Aoid)

প্রমেহ কিংবা উপদংশগ্রস্ত রোগীর গাউট বা আমবাতিক প্রকৃতি প্রাপ্তি

গাউট জনিত পিণ্ড-সঞ্চয়, সন্ধি-বাত, সকল সন্ধির আক্রান্ততা, বিশেষতঃ সঞ্চালনে জানুসন্ধির কড় মড় শব্দ; সন্ধিস্থলে চূর্ণময় পদার্থের সঞ্চয় (বার্ব্ব, লিথি-কার্ব্ব, লাই)

মলিন-কপিশ মূত্র, মূত্রের মূত্র-গন্ধের অত্যন্ত তীব্রতা।

সুকুমার শিশুদিগের রাত্রিতে শয্যা-মূত্র; মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থির বিবর্দ্ধনসহ বৃদ্ধ পুরুষদিগের বিন্দু বিন্দু মূত্র-পাত; মূত্রের স্বাভাবিক গন্ধের অধিকতর তীব্রতা; মূত্রে ইউরিক এসিডের আতিশয্য

প্রমেহের বিলুপ্তির পর মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায় (catarrh)।

বালক-বালিকাদিগের অতিসার ; তরল, অতি দুর্গন্ধ, অবসন্নতাজনক তরল মল, শয্যা-বস্ত্রের অভ্যন্তর দিয়া উহার গতি (পড), দুর্গন্ধ, গাঢ় লোহিত বর্ণ মূত্র।

কাস ; হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন (ল্যাট-সল), অত্যন্ত শ্রান্তি ও আলস্য

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর বড় বড় সন্ধিতে ছেদন ও সূচী-বেধনবৎ বেদনা সন্ধিস্থানের আরক্ততা ও স্ফীততা ; রাত্রিতে গাউটের বৃদ্ধি

সম্বন্ধ।—(১) অবাবিত-মূত্র রোগে · বিশেষতঃ নাইটার বিফল হইলে কোপে, নাইটার, ফিব, থুজার সহিত বেঞ্জ-এসিডের সমগুণ সম্বন্ধ। সন্ধিবাত জনিত রোগে বার্ব্ব ও লিথি-কার্ব্ব ইহার সমগুণ (২) গাউট রোগে কলচিকম বিফল হইলে তৎপরে এবং বিলুপ্ত প্রমেহে কোপেবা অপব্যবহৃত হইবার পরে এই ঔষধ উপযোগী। (৩) সুরার সহিত ইহার বিষম-গুণ সম্বন্ধ ; তদ্দ্বারা মূত্র-রোগ, এবং গাউট ও আমবাত জনিত রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়

বেলেডোনা।

(Belladonna)

পিত্ত-প্রধান স্নায়ু প্রধান ও রক্ত-প্রধান প্রকৃতির রোগী ; সুস্থাবস্থায় সজীবতা ও প্রফুল্লতা, অসুস্থাবস্থায় প্রচণ্ডতা ও অনেক সময় প্রলাপিতা।

লঘু-কেশ, নীল নয়ন, সুন্দর মুখশ্রী, সুকুমার ত্বকবিশিষ্ট নারী ও বালক-বালিকা ; অনুভবাধিক, স্নায়বীয়, আক্ষেপ-সম্ভব রোগী ; গুটিকা প্রকৃতিবিশিষ্ট (টিউবারকিউলাস) রোগী।

সহজে সর্দ্দি লাগে, বায়ু-প্রবাহে বিশেষতঃ মস্তক অনাবৃত থাকিলে, অতিশয় অনুভবাধিক্য ; চুল কাটিলে সর্দ্দি লাগে, শীতল বাতাসে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইলে তালু-মূলের (tonsils) প্রদাহোৎপন্ন হয় (একন, হিপ, রস -- পায় ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দি লাগে, কোন। কুপ, সিলি)।

দ্রুত অনুভব ও দ্রুতগতি ; চক্ষু শীঘ্র সঞ্চালিত হয় ; বেদনা অকস্মাৎ উপস্থিত হয় ; অনিশ্চিত সময় পর্য্যন্ত থাকে এবং অকস্মাৎ বিরত হয় (ম্যাগ ফস)।

বেদনার সাধারণতঃ অল্প অল্প সময় স্থায়ী আক্রমণ ; বেদনায় বদন ও নয়নের আরক্ততার উৎপত্তি ; মস্তকের পূর্ণতা ও ক্যারটিড ধমনীর দপদপ।

রোগী মনে করে যেন সে ভূত-প্রেত, ভয়ঙ্কর মুখ, ও বিবিধ কীট (ষ্ট্রাম) কৃষ্ণবর্ণ জন্তু, কুকুর এবং নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি দেখিতে পায়।

অবাস্তব বস্তুর ভয়, উহাদের নিকট হইতে পলায়নের ইচ্ছা, ভ্রান্তদৃষ্টি (hallucination)

প্রচণ্ড প্রলাপ ; কামড় দেওয়া, থুথু ফেলা, মারা ও দ্রব্যাদি ছিঁড়িয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি ; উচ্চ হাস্যের আবেশ ও দাঁত কড়মড় করা ; পরিচারক-দিগকে দংশন ও আঘাত করিবার প্রবৃত্তি (ষ্ট্রাম) ; পলায়নের চেষ্টা (হেলি)।

মস্তকের উত্তপ্ততা ও যাতনাপূর্ণতা, বদনের প্রদীপ্ততা, নয়নের প্রমত্ততা (wildness) ও একদৃষ্টি (staring), চক্ষু-তারার প্রসারিততা, নাড়ীর পূর্ণতা, উল্লম্ফনশীলতা (bounding), গোলাকারতা, ও গোলার ন্যায় অঙ্গুলিতে আঘাতকারিতা ; মুখ গহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পরিশুষ্কতা ; মলের ধীরতা ও মূত্রের বিলুপ্ততা নিদ্রালুত, অথচ নিদ্রা যাইতে অপারগতা (ক্যাম, ওপি)।

দন্তোদগম-কালে, জ্বরসহকারে টঙ্কার (জ্বর ব্যতীত টঙ্কার, ম্যাগ-ফস) ; সহসা উহার উপস্থিতি, মস্তকের উত্তপ্ততা ও পদদ্বয়ের শীতলতা।

মস্তকে ও মুখমণ্ডলে রক্তের প্রধাবন এমিল, গ্লন, মেল)

আরক্ত মুখমণ্ডল, মস্তিষ্ক ও গ্রীবার বৃহৎ ধমনীদ্বয়ের দপদপ সহকারে, রক্তসঞ্চয় জনিত, শিরোবেদনা (মেল) ; সামান্য শব্দ, সংঘর্ষণ, সঞ্চালন, আলোক শয়ন, ও অত্যল্প শ্রমে উহার উপচয় ; প্রচাপন, দৃঢ় বন্ধন, বস্ত্র জড়িত করণ ও ঋতুকালে উপশম।

বালিসে মস্তক প্রবিষ্ট করণ (এপিস, হেলি, পড)।

মস্তক অবনত করিলে, অথবা মস্তক অবনত করিয়া থাকিয়া উঠিবার সময় (ব্রাই) শিরোঘূর্ণন প্রত্যেকবার অবস্থান পরিবর্ত্তনে শিরোঘূর্ণন।

উদরের স্পর্শদ্বেষ ও স্ফীততা অতি অল্প মাত্র সংঘর্ষে এমন কি শয্যার

সংস্পর্শে পর্য্যন্ত উহার বৃদ্ধি, কোন প্রকার সংঘর্ষ না লাগে এজন্য অতি সাবধানে বিচরণ।

দক্ষিণ জড়িতাস্থি ও অন্যান্য প্রদেশে (ইলিওসিকেল রিজিয়ন) বেদনা, যৎসামান্য স্পর্শে এমন কি শয্যা-বস্ত্রের সংস্পর্শে পর্য্যন্ত উহার বৃদ্ধি।

অনুপ্রস্থ স্থূলান্ত্রের (ট্রান্সভার্স কোলন্) পিণ্ডের ন্যায় উন্নমন।

ত্বক্‌।—ত্বকের সর্ব্বাকার মসৃণ, চিক্কণ, গাঢ় আরক্ততা পরিশুষ্কতা, উত্তপ্ততা, ও জ্বালা পরীক্ষার্থে গায়ে হাত দিলে হাতে জ্বালা অনুভব সম্পূর্ণ মসৃণ ও প্রকৃত আরক্ত উদ্ভেদ বিশিষ্ট প্রকৃত সিডেন্‌হ্যাম্‌ স্কার্লেট জ্বর

উদরের আধেয় পদার্থ যেন ভগপথে বাহির হইয়া পড়িবে নিম্নাভিমুখে এরূপ প্রচাপন। দাঁড়াইলে ও সোজা হইয়া বসিলে উহার উপশম; প্রাতঃকালে উপচয় (লিলি, সিউব, সিপি)।

উপচয়।—স্পর্শে, নড়িলে চড়িলে, শব্দে, বায়ুপ্রবাহে, সমুজ্জ্বল চাকচিক্যময় বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলে (লাইসি, ষ্ট্রাম), অপরাহ্ণ ৩টার পরে, রাত্রিতে, দুই প্রহর রাত্রের পরে পানকালে, মস্তক অনাবৃত করিলে, গ্রীষ্মকালের সূর্য্যের উত্তাপে ও শয়ন করিলে বৃদ্ধি।

উপশম।—বিশ্রামে, দাঁড়াইলে অথবা সোজা হইয়া বসিলে ও উষ্ণ গৃহে উপশম।

সম্বন্ধ।—(১) ক্যাল্‌কেরিয়ার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। বেলেডোনায় আরব্ধ আরোগ্য ক্যাল্‌কেরিয়ার সম্পূর্ণ হয়। (২) একন, ব্রাই, সিকু, জেল, গ্লন, হাইওস, মেল, ওপি ও ষ্ট্রামোর সহিত বেলেডোনার সমগুণ সম্বন্ধ।

বোভিষ্টা।

(Bovista)

শুষ্ক বা আর্দ্র দদ্রুগ্রস্ত রোগী।

হৃৎকম্প সংযুক্তা বৃদ্ধা কুমারী

তোতলা বালক-বালিকা। (ষ্ট্রেম)

নাসিকা ও অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে অতি শক্ত, রজ্জুবৎ, ছুশ্ছেদ্য স্রাব নিঃসরণ (কালী-বাই)।

ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি স্থূল-মুখ শস্ত্রাদি ব্যবহারে অঙ্গুলীতে অতিশয় গভীর দাগের উৎপত্তি।

কটিদেশে কাপড় সহ্য হয় না (ক্যাল্ক, ল্যাক, সলফ)।

কক্ষতলের ঘর্ম্মে পঁয়াজের ন্যায় গন্ধ।

দন্তোত্তোলনের পর (হেমে), আঘাত হইতে; এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব

সন্ধি সকলের অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং হস্ত-পদের শ্রান্তি

হাত হইতে দ্রব্যাদির পতন-প্রবণতা (এপিস); শক্তিশূন্য হস্ত হইতে বস্তুর পতন।

ঋতু —কেবল রাত্রিতে, ঋতুর রক্ত প্রবাহিত হয়, দিনে পড়েনা (ম্যাগ-কা—কেবল দিনে পড়ে, এবং শুইলেই থামিয়া যায়, কাক, কষ্ট, সিপি); ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতু-কালে অতিসার (এম-কা), ঋতুদ্বয়ের ব্যবধান-কালে মধ্যে মধ্যে কয়েকদিন রক্তদর্শন (বোরা), প্রতি দুই সপ্তাহে মলিন ও সংযত রক্ত নিঃসরণ, তৎসহকারে যন্ত্রণাপূর্ণ আবেগ (bearing down sensation) (সিপি)

কোকিল-চঞ্চু-অস্থির (coccyx) অগ্রভাগে দুর্নিবার কণ্ডুয়ন, যে পর্য্যন্ত না অবদরণ ও ক্ষত জন্মে ততক্ষণ চুলকাইতে হয়।

সম্বন্ধ।—(১) ঋতু-বৈলক্ষণ্যে, এম-কা, বেল, কাল্ক, ম্যাগ-সল, সিপির সহিত তুলনা হয় (২) আলকাতরার বাহ্য প্রয়োগের মন্দ ফল; এবং বাষ্প (গ্যাস) জনিত শ্বাস-রোধ বোভিষ্টা দ্বারা নিবারিত হয়। (৩) পুরাতন শীত-পিত্তে রাসটক্স উপযোগী হইয়াও বিফল হইলে বোভিষ্টা ব্যবহৃত হয়।

বোরাক্স।

(Borax)

প্রায় সকল রোগেই নিম্নাভিমুখ গতিতে আশঙ্কা।

নিম্নাভিমুখ গতিতে অতিশয় উৎকণ্ঠা; শিশুকে খাটে শোয়াইতে গেলে কাঁদে ও ধাত্রীকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, দোলাইলে, ঝুলাইলে, নাচাইলে, এবং নীচের তলায় নামাইতে ও ঘোড়ার পিঠে চড়াইতে ভয় পায়।

কোন দৃশ্যমান কারণ ব্যতীত শিশু সহসা জাগিয়া চিৎকার করে ও দোলার পার্শ্ব হাতদিয়া চাপিয়া ধরে (এপিস, সিনা, ষ্ট্রাম)

অত্যন্ত স্নায়বীয়তা, যৎসামান্য শব্দে অথবা অসাধারণ (unusual) তীব্র শব্দে এবং কাস হাঁচি ক্রন্দন বা দীপ-শলাকা জ্বালিবার শব্দে ভয়প্রাপ্তি (এসার ক্যালাড)।

চুল জড়াইয়া যায়, চিরিয়া যায়, অগ্রভাগে সংলগ্ন হইয়া থাকে; এই সকল খোপা কাটিয়া ফেলিলে পুনরায় জন্মে, আঁচড়াইয়া সমান করা যায়না (ফ্লোর-এসি, ল্যাই, সোরি, টিউব)

চক্ষুর পক্ষে শুষ্ক, আঠা আঠা স্রাব, প্রাতে সংযোজনা, পক্ষের রোম অভ্যন্তর দিকে ফিরিয়া চক্ষুর, বিশেষতঃ উহার বহির্দিকের কোণের প্রদাহের উৎপত্তি; উচ্ছৃঙ্খল রোমোৎপত্তির প্রবণতা।

নাসা-রন্ধ্রে চিপিটকা, প্রদাহিত; নাসাগ্রের চিকণ আরক্তো; যুবতী কামিনীদিগের লাল-নাক

দক্ষিণ নাসা-রন্ধ্রের অবরুদ্ধতা, অথবা প্রথমে দক্ষিণ, তৎপরে বাম নাসা-রন্ধ্রের অবরুদ্ধতা, তৎসহ অবিরত ফোঁৎ ফোঁৎ করণ (এম-কা, ল্যাক-কা, ম্যাগ-মি)।

উপক্ষত —মুখ-বিবরে, জিহ্বার উপরে, গালের অভ্যন্তর ভাগে উপক্ষত; আহারকালে বা স্পর্শ করিলে উহা হইতে সহজে রক্তপাত হয়; শিশুর স্তনপানে প্রতিবন্ধকতা জন্মে; তৎসহকারে মুখ-বিবরের উত্তপ্ততা, পরিশুষ্কতা ও

পিপাসা (আর্স), জিহ্বার বিদারণ ও রক্তপাত (এরম) এবং লালা স্রাব, (বিশেষতঃ দন্তোদ্ভেদ-কালে) থাকে

উপক্ষতজনিত মুখ ক্ষত ; স্পর্শে, এবং অম্ল বা লবণাক্ত দ্রব্য আহারে উহার বৃদ্ধি ; বৃদ্ধদিগের মুখের উপক্ষত (এলুমেন)।

শিশুর বারবার মূত্র-পাত, ও মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে চিৎকার (লাই, স্যানি, সার্সা)।

শ্বেতপ্রদর প্রভূত অণ্ডলালময়, শ্বেতসারময়, উষ্ণজলের প্রবাহের ন্যায় অনুভূত ; ঋতুকালের ব্যবধান সময়ে দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত ; প্রদর স্রাব (বোক্স, কোনা)।

ত্বক, অস্বস্থ সামান্য উপঘাতে পূযোৎপত্তি (ক্যালেণ্ড, হিপ, মার্ক সিলি)।

উপচয়।— নিম্নাভিমুখীন গতি, আকস্মিক যৎসামান্য শব্দ ধূমপান (উহাতে অতিসারও জন্মিতে পারে) ও আর্দ্র, শীতল ঋতুতে এবং মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

উপশম।— প্রচাপনে ; ব্যথিত পার্শ্ব হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলে ; উপশম

সম্বন্ধ।—(১) ক্যাল্ক সোরি, স্যানি, ও সলফের পরে, বোরাক্স সুব্যবহৃত। (২) বোরাক্সের পরে, আর্স ব্রাই, লাই, ফস, সিলি, সুপ্রযুক্ত। (৩) এসেটিক-এসিড, ভিনিগার ও আসবের (সুরা) পূর্ব্বে বা পরে বোরাক্স ব্যবহৃত হয় না। উহাদের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ

ব্যাপ্টিসিয়া টিঙ্কটোরিয়া।

(Baptisia Tinctoria)

ব্যাপ্টিসিয়া রস-প্রধান ধাতুতে উপযোগী

শরীরের তরল বিধানের বিসমাংশ প্রবণতা, সংকোচের অত্যন্ত অবসন্নতা (পাইরো), শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত

শরীরের সর্ব্ববিধ নিঃসরণ ও স্রবের দুর্গন্ধ বিশেষতঃ টাইফয়েডজ্বরে অথবা অন্যান্য তরুণরোগে শ্বাস, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ও ক্ষতের দুর্গন্ধ (সোরি, পাইরো)

মানসিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি, চিন্তা করিতে অনিচ্ছা, অথবা অসামর্থ্য সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, কিছু করিতে চেষ্টা জন্মেনা কার্য্যে মন স্থির রাখিতে পারা যায় না।

সুপ্তি · কথা শুনিতে শুনিতে অথবা জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিতে দিতে নিদ্রিত হইয়া পড়া ; কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যায় আবার তখনই প্রলাপ উপস্থিত হয় (আর্ণ)।

প্রথমে লোহিতবর্ণ জিহ্বা-কণ্টকসহকারে জিহ্বায় শুভ্রবর্ণ লেপ ; কেন্দ্র স্থলের শুষ্কতা এবং পীত কপিশ বর্ণ। পরিশেষে জিহ্বার শুষ্কতা, বিদারণ, ও ক্ষত

মুখমণ্ডলের উদ্দীপ্ততা ধূসরবর্ণ, মলিন আরক্ততা, বুদ্ধিশূন্য, বিমত্ত মুখাকৃতি (জেলস)।

কেবল তরল পদার্থ গিলিতে পারা যায় (ব্যারা-কা); যৎসামান্য কঠিন খাদ্যও গলায় ঠেকে (কেবল তরল দ্রব্য গিলিতে পারা যায়, কিন্তু উহাতে অরুচি, সিলি)

বেদনাশূন্য গল-ক্ষত (Sore throat) তালু-মূল, কোমল তালু (Soft palate) ও কর্ণমূলের মলিন আরক্তত, ও স্ফীততা, পচা, দুর্গন্ধ স্রাব (ডিপথিরিয়া)

বৃদ্ধদিগের রক্তাতিসার ; বালকদিগের অতিসার, বিশেষতঃ উহাতে অতিশয় দুর্গন্ধ (কার্ব্বো, পডো মোরি)

রোগিণী আপনাকে একত্র করিতে পারেনা বলিয়া নিদ্রা যাইতে পারেনা মস্তক বা শরীর শয্যার চারি দিকে খণ্ড খণ্ড ছড়ান বোধ হয় ; সেই সকল খণ্ড একত্র করিতে রোগিণী এপাশ ওপাশ করে ; তাহার বোধ হয় যেন সে তিনজন, সকলকে সে ঢাকিয়া রাখিতে পারেনা (পেট্রো)

যে কোন অবস্থানে রোগী শয়ন করে, শরীরের যে অংশে ভর দিয়া শয়ন করে সেই অংশই ব্যথিত ও ঘৃষ্ট অনুভূত হয় (পাইরো—আর্ণ ও পাইরো তুলনীয়)।

টাইফয়েড জ্বরে শয্যা-ক্ষত (আর্ণ মিউ-এসি, পাইরো)

সম্বন্ধ। (১) গ্লানি, স্নায়বীয়তা, প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, তন্দ্রালুতা ও পেশীয় বেদনাবিশিষ্ট জ্বরের প্রথমাবস্থায় আর্ণ, আর্স, ব্রাই, ও জেলসের সমগুণ।

(২) টাইফয়েড বা টাইফস জ্বরে অনুপযুক্তভাবে অথবা অতিরিক্তরূপে পুনঃ পুনঃ আর্সেনিক প্রয়োজিত হইয়া থাকিলে ব্যাপ্‌. উপযোগী (৩) টাইফয়েড ও টাইফস জ্বরের রক্তস্রাবে ব্যাপ্টিসিয় পরে ক্রোট, হেমে, নাইট-এসি ও টেরেবিন্থ ভাল ক্রিয়া করে

ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা।

(Baryta Carbonica)

প্রথম বাল্যকাল ও দ্বিতীয় বাল্যকাল অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের রোগে, এবং কচ্ছু-দোষ অথবা গুটিকা-ধাতু-দোষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

স্মৃতিশক্তির অসদ্ভাব। বিস্মরণশীলতা, অনাবিষ্টতা (inattention), মনে রাখিতে পারেনা বলিয়া বালক শিখিতে পারেনা জড়ত্ব জন্মিবার সম্ভাবনা

গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত, খর্ব্বকায় শিশু, শীঘ্র বাড়েনা (শীঘ্র শীঘ্র বাড়িলে ক্যাল্ক); গণ্ডমালাজনিত চক্ষু-প্রদাহ, কনীনিকার অস্বচ্ছতা; উদরের স্ফীততা; ঘন ঘন উদর-বেদনার আক্রমণ মুখমণ্ডলের স্ফীততা (ফুলা ফুলা ভাব); সর্ব্বাঙ্গীন শীর্ণতা।

শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা বিশিষ্ট বালক বালিকা

খর্ব্বাকারা, হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা স্ত্রী এবং অল্পরজোবিশিষ্টা কুমারীদিগের রোগ; শারীরিক তাপের অসদ্ভাব সর্ব্বদা শীত শীত অনুভব

বৃদ্ধ, ধাতু-দুষ্ট ব্যক্তি; গণ্ডমালাগ্রস্ত, বিশেষতঃ স্থূলকায় ব্যক্তি, অথবা গাউট রোগগ্রস্ত ব্যক্তি (ফ্লোর-এসি)

বৃদ্ধ পুরুষদিগের রোগ; মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থি ও অণ্ডের বিবৃদ্ধি অথবা দৃঢ়তা; মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা।

বৃদ্ধদিগের সংন্যাস-প্রবণতা, প্রাচীন মদ্যপায়ীদিগের রোগ, বাত-গ্রস্ত বৃদ্ধদিগের শিরঃপীড়া।

তালু-মূল বা গল-প্রদাহের প্রবণতা, সহজে সর্দ্দির উৎপত্তি; অথবা প্রতিবার সর্দ্দির আক্রমণে, এমন কি যৎসামান্য সর্দ্দি লাগিলেই তালুমূল-প্রদাহের উপস্থিতি, উহাতে পূযোৎপত্তির প্রবণতা (হিপার, সোরি)।

তরল দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু গিলিতে অক্ষম—গিলিতে অক্ষমতা।

প্রত্যেকবার মূত্র ত্যাগকালে অধিক পরিমাণ জলপানের

গোরা-দোষগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের পুরাতন কাস, কিম্বা দীর্ঘীভূত আদ-চিহ্ন ; গরম মাংস খাদ্যে উপচয় (এলাম)।

গ্রন্থির, বিশেষতঃ গ্রীবার ও কুচকীর গ্রন্থির স্ফীতত্তা ও দৃঢ়তা, অথবা প্রচ্ছন্ন (incipient) পুযোৎপত্তি

দুর্গন্ধ পাদ ঘর্ম্ম, তজ্জন্য পদাঙ্গুলি ও পদতলের ক্ষত (পাদ-মূলের ঘর্ম্ম পায়ের ঘর্ম্মের অবরোধ বশতঃ রোগ (গ্রাফা, সোরি, জ্যানি, সিলি)

শর্দ্দিতে অতিশয় অনুভবাধিক্য (ক্যাল্ক কার্ব্ব-কা, সোরি)

উপচয় —রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (অক্স এসি), ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে ; আহারান্তে ও কপাল প্রক্ষালনে বৃদ্ধি

সম্বন্ধ। — (১) সাধারণতঃ সোরি সলফ ও টিউবের পরে উপকারী (২) ব্যারাইটা-কার্ব্বের পরে সোরিণম ব্যবহারে তানুমূল প্রদাহের প্রবণতার শারীরিক প্রকৃতি নির্ম্মূল হয় (৩) এলাম ক্যাল্ক-আইওড ডলকা, ফ্লোর-এসি আইওড, সিলি, ব্যারাইটার সমগুণ (৪) সংশোধনপ্রয়োগে, ব্যাসিলিনামের পরে ব্যারাইটা বিষমগুণ ও অনুপযোগী

ব্রাইওনিয়া।

(Bryonia)

আমবাত বা গেঁটেবাত প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং পিত্ত-প্রকোপের পক্ষে, এই ঔষধ বিশিষ্টরূপে উপযোগী।

ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক রোগীদিগের কোপনতা প্রচণ্ডতা ও ক্রোধ-প্রবণতা মলিনবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ চুল, মলিনবর্ণ মুখাকৃতি, দৃঢ় পেশী-তন্তু ; শুষ্ক কৃশ স্নায়বিক দেহ থাকে

বেদনা '—ব্রাইওনিয়ার বেদনা সূচী-বেধন বা ছেদনবৎ হয়, রাত্রিতে উহা বৃদ্ধি পায়, নড়িলে চড়িলে, নিশ্বাস লইলে, ও কাসিলে উহার

(২) টাইফয়েড বা টাইফস জ্বরে অস্থিরতায় ও ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে আর্সেনিক প্রয়োজিত হয় (ট্রিলিয়া পলস - সূচী-বেধনবৎ বেদনার উপচয় ও টাইফস জ্বরের ন্যায় বিপরীত প্রকাশ হইলে, কার্বো-ভেজ)।

জ্বাল — সমগ্র শরীরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিশয় পরিশুষ্কতা, ওষ্ঠ ও জিহ্বার পরিশুষ্কতা ও বিদারণ মাংসবৎ দগ্ধবৎ শুষ্কতা, শুষ্ক কঠিন; যন্ত্রণাজনক মল নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস; মলিনবর্ণ তপ্ত মূত্র, অতিশয় পিপাসা।

অনুকল্প রজঃ; ঋতুকালে ঋতু প্রকাশিত না হইয়া নাসিকা হইতে রক্তপাত (ফস); রক্ত-নিষ্ঠীবন অথবা রক্ত-কাস, টাইফয়েড জ্বরের ভোগ-কালে শেষোক্ত প্রকার রক্ত-স্রাব।

ক্রোধ অথবা বিরক্তিজনিত অসুখ (কলো, ষ্টাফ); শীতানুভব ও শীতলতা সহ প্রচণ্ডতা, ক্রোধের পর শীতানুভব, কিন্তু মস্তকের উত্তপ্ততা ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা

শীতল সময়ের পর উষ্ণ সময়ের সমাগমে, গ্রীষ্মকালে শীতল পানীয় অথবা বরফ সেবনে; সর্দ্দি লাগিয়া ও গ্রীষ্মকালে গরম হইয়া অতিরিক্ত উত্তপ্ততার সময় শীতল হওয়াতে; শীতল বাতাসের প্রবাহ লাগিয়া (একন, হিপার), খাদ্য ওনদুগ্ধ অথবা তরল দ্রব্যের বিলোপ হইয়া, যে সকল রোগ জন্মে, তাহাতে ব্রাইওনিয়া ফলপ্রদ।

কোন প্রকারে নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি, এবং শারীরিক বা মানসিক সম্যক সুস্থিরতায় হ্রাস, ব্রাইওনিয়ার একটী প্রধান বিশেষ লক্ষণ।

যে সকল বস্তু পাওয়া যায়না তাহা তৎক্ষণাৎ পাইতে ইচ্ছা, অথবা উহা দিলে না লওয়া।

শিশুরা কোলে চড়িয়া বেড়াইতে অথবা শয্যা হইতে উঠিতে ভালবাসে না।

প্রলাপ; সর্ব্বদা নিজের কার্য্যের কথা বলা; শয্যা হইতে উঠিয়া স্বগৃহে যাইবার ইচ্ছা (এক্টি, হাইওস)

বামবাহু ও বাম জঙ্ঘার অবিরত সঞ্চালন (এপোসা, হেলি)।

বিবমিষা ও অবসন্নতা বশতঃ রোগীর উঠিয়া বসিতে অক্ষমতা।

অনেকক্ষণ পরে পরে একবারে অধিক পরিমাণ জলপানের অতিশয় পিপাসা।

শিরঃপীড়া – মাথা নোয়াইলে মস্তিষ্ক যেন কপালের ভিতর দিয়া ফাটিয়া বাহির হইবে এপ্রকার অনুভব, ইন্দ্রিয় কর বশতঃ (সিপি), কাসিলে; প্রাতে উত্থানান্তে, অথবা প্রথম চক্ষু মেলিবার সময় শিরঃপীড়া; প্রাতে উহার আরম্ভ, সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি, কোষ্ঠরোধ জনিত শিরে বেদনা (এলো, কলিন, ওপি)।

আমাশয়-গহ্বরে প্রস্তর-জনিত চাপের ন্যায় চাপ অনুভব, উদগারে উহার উপশম (নক্স, পল)।

কোষ্ঠ-রোধ —নিষ্ক্রিয়তা মল-প্রবৃত্তি-পরিশূন্যতা, বৃহৎ, কঠিন, মলিনবর্ণ, পরিশুষ্ক, দগ্ধবৎ মল। সমুদ্র-যাত্রায় কোষ্ঠরোধ (প্লাট)

অতিসার —গ্রীষ্মকালের আবেশ সময়ে উপস্থিত পৈত্তিক, বিদাহী, মলদ্বারের স্পর্শ-দ্বেষ জনক মলিন জলবৎ; অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বিশিষ্ট; অতিরিক্ত উত্তপ্ত অবস্থায় শীতল পেয়দ্রব্য পান বশতঃ ও ফল আহার জন্য অতিসার; প্রাতে ও নড়িলে চড়িলে, এমন কি হাত-পা নাড়িলেও উহার বৃদ্ধি। স্তনের গুরুত্ব, প্রস্তরের ন্যায় কঠিনতা; পাণ্ডুরতা কিন্তু কাঠিন্য; উত্তপ্ততা ও ব্যথিততা; স্তনদ্বয় অবলম্বন দ্বারা তুলিয়া রাখিতে হয় (ফাইটো)।

কাস —শুষ্ক, আক্ষেপিক গল-রোধ ও বমন সংযুক্ত (আর্ণিকা); বক্ষঃস্থলের পার্শ্বে সূচী-বেধনবৎ যাতনাবিশিষ্ট; মস্তক যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া উড়িয়া যাইবে এরূপ শিরঃপীড়াসহ; আহারান্তে, পানান্তে, উষ্ণগৃহে প্রবেশ ও গভীর নিশ্বাস গ্রহণে, বিবর্দ্ধিত; কাস।

উপচয়। সঞ্চালনে, শারীরিক শ্রমে ও স্পর্শে বৃদ্ধি, উঠিয়া বসিতে পারা যায়না শ্রান্তি বা বিবমিষা অথবা উভয়ই জন্মে। উষ্ণতা, উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য ■ কোনও প্রকার স্রাবের বিলোপে; উপচয়।

উপশম।—শয়নে বিশেষতঃ ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে (ব্রিলিয়া, পলস), চাপ প্রদানে; বিশ্রামে, শীতলতায় ও শীতলদ্রব্য আহারে; উপশম

সম্বন্ধ —(১) এলুমিনা ও প্লাটিনার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) বাগ্যন্ত্র সমস্ত হইয়া কথা বলা ও জল পান করা অক্ষমে বেলেডোনার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (৩) বক্ষঃস্থলের আমবাতিক বা প্লুরাটিক বেদনায় র‍্যানানকিউলাসের সহিত এবং স্কন্ধদেশে বেদনা ও গৌরব; দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে হ্রাস ও বামপার্শ্বে শয়নে অতিশয় বৃদ্ধি; বামদিকে ফিরিলে একপ্রকার ভারাকর্ষণ অনুভব; এই সকল লক্ষণে টিলিয়ার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (৪) ব্রাইওনিয়ার পরে এলম কার্বো, কা না, ফস, রসটক্স, স. ম, ভাল খাটে

ব্রোমিয়ম।

(Bromium)

পাতলা-নীলবর্ণ চক্ষু, ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ চুল, পাতলা ভ্রূ, সুন্দর সুকুমার ত্বকবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং সুন্দর আরক্ত-গণ্ড, গণ্ডমালা গ্রস্ত বালিকাদিগের পক্ষে; এই ঔষধের অত্যুৎকৃষ্ট ক্রিয়া দর্শে। অন্যান্য প্রকার আকৃতির রোগীদিগের পক্ষেও ইহার ক্রিয়া যে না দর্শে এমন নহে

মুখমণ্ডলে লূতা-তন্তু (cobweb) থাকার ন্যায় অনুভব (ব্যারা বোরা, গ্রাফ)।

নাসা-পক্ষের তাল-বৃ এবং স্পন্দন (এণ্ট-টা, লাইক)।

সমুদ্র-কূলে জাহাজের নাবিকদিগের শ্বাস-কাস।

গ্রন্থির, বিশেষতঃ নিম্ন-হনু ও গল-গ্রন্থির অর্থাৎ ধলক গ্রন্থি (thyroid), হনু-নিম্ন গ্রন্থি (submaxillary) কর্ণ-মূল (parotids) ও অণ্ডের (testes) গণ্ডমালা বা গুটিকা-ধাতু-দোষজনিত প্রস্তরবৎ দৃঢ় স্ফীতত।

ডিফথিরিয়া —ফ্যারিংস বা গল-কোষে কৃত্রিম ঝিল্লীর উৎপত্তি; বায়ু-নলী কণ্ঠ-নলী অথবা স্বরযন্ত্রে উহার আরম্ভ ও উপরের দিকে প্রসারণ। বক্ষঃস্থলের বেদনার ঊর্দ্ধ দিকে গতি

কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট ও ডিফথিরিয়া জনিত ক্রুপ। কাসিবার সময় শ্লেষ্মার অতিশয় ঘড় ঘড় শব্দ, কিন্তু হিপার সলফারের লক্ষণের ন্যায় গল-রোধ নহে। কাসের শব্দ তরল শুনায় বটে, কিন্তু নিষ্ঠীবন উঠেনা।

হুপ-শব্দ কাসের সময় স্বরভঙ্গসহ ক্রুপের লক্ষণ; শ্বাস ত্যাগের জন্য "খাবি খাওয়া" (gasping or breath)।

শ্বাস-কৃচ্ছ্র —গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারা যায়না; যেন স্পঞ্জের ভিতর দিয়া শ্বাস-ক্রিয়া চলিতেছে অথবা বায়ুপথ যেন ধুমায় বা গন্ধকের বাষ্পে পূর্ণ রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব, ঘড ঘড় শব্দ, করাত-টানার ন্যায় শব্দ (স্বর শুনা যায়না); স্বর-যন্ত্রে শ্লেষ্মাবস্থান বশতঃ শ্বাস-রোধের আশঙ্কা, (বায়ুনলী ভুজে শ্লেষ্মা জন্য, এণ্ট-টার্ট)।

ব্যায়াম-ক্রীড়াবশতঃ বালকদিগের হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি (অঙ্গ চালনা বশতঃ বালিকাদিগের হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, কষ্ট)

জরায়ুর বাতাধ্মান, অপত্য পথ হইতে উচ্চৈঃস্বরে বায়ু-নিঃসরণ (লাইক); ঝিল্লীবিশিষ্ট গলঃকৃচ্ছ্র (ল্যাক-ক্যান)।

নিশ্বাস গ্রহণে স্বরযন্ত্রে শীতলতা অনুভব (রুস্টক্স, সল্ফ) ক্ষৌর ক্রিয়ার পর উহার উপশম (ক্ষৌর-ক্রিয়ার পর বৃদ্ধি কার্বো-ভেজ)।

সম্বন্ধ।—(১) ক্রুপ ও ক্রুপজনিত রোগে ক্লোর, হিপার, আইওড, ও স্পঞ্জিয়ার সহিত ব্রোমিয়মের তুলনা হয়। (২) আইওড বিফলান্তে এতদ্বারা কঠিন গলগণ্ড আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে (৩) ক্রুপরোগে, আইওড, ফস, হিপার, স্পঞ্জ বিফল হইবার পর, বিশেষতঃ আইওডের পরে পুনরাক্রমণে ব্রোম দ্বারা আরোগ্য লাভ হইয়াছে (৪) 'ব্রোম ও আইওডে প্রধান প্রভেদ এই যে ব্রোমে নীল-নয়ন এবং আইওডে কৃষ্ণ নয়নবিশিষ্ট রোগীদিগের আরোগ্য [illegible]

ভিরেট্রংম এলবংম।

(Veratrum album)

বালক-বালিকা ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে, জীবনের অন্তসীমায়, যাহারা স্বভাবতঃ শীতল ও জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার অসদ্ভাব বিশিষ্ট, তাহাদের পক্ষে এবং স্নায়বীয় ও রক্ত-প্রধান ধাতুর যুবক যুবতীদিগের পক্ষে, এই ঔষধ সমধিক উপযোগী।

জীবনী শক্তির শীঘ্র শীঘ্র পতন, সম্পূর্ণ অবসন্নতা ও হিমাঙ্গ বিশিষ্ট রোগ।

প্রায় সকল রোগের সহিতই কপালে শীতল ঘর্ম্ম (সর্ব্ব শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, ট্যাবে)

একাকী থাকিতে পারা যায় না; অথচ কাহারও সহিত কথা বলিতে একেবারেই প্রবৃত্তি হয় না

রোগিণী আপনাকে গর্ভবতী অথবা আসন্ন-প্রসবা মনে করে

প্রত্যেক বস্তু, বিশেষতঃ কাপড় কাটিবার ও ছিঁড়িবার ইচ্ছা সহকারে উন্মাদ (টারাণ), লাম্পট্যসূচক অশ্লীল কথা সহ প্রেমোন্মাদ অথবা ধর্ম্মোন্মাদ (হাইয়স, ষ্ট্রাম)

অত্যল্প মাত্র শ্রমে মূর্চ্ছার আক্রমণ (কার্ব্বো ভে, সলফ); অত্যধিক দুর্ব্বলতা।

রক্তস্রাব কালে নিমগ্নতা (sinking) অনুভব, (মূর্চ্ছা, ট্রিল)

শীতানুভব সহ মস্তকের মধ্যস্থলে এক খণ্ড বরফ স্থাপিতবৎ অনুভব (সিপি, ভেলে), করোটিতে যুগপৎ শীতোত্তাপ অনুভব; মস্তিষ্ক যেন ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে এরূপ অনুভব।

মুখমণ্ডল। পাণ্ডুর নীলবর্ণ শীতল মুখমণ্ডল; নিমগ্ন (Hippocratic) মুখাকৃতি; শয়িত অবস্থায় মুখমণ্ডলের আরক্ত, উঠিলে পাণ্ডুরতা (একন)

পিপাসা।—অধিক পরিমাণে শীতল জল ও অম্ল পানীয় দ্রব্য পান করিবার জন্য ও দুর্নিবার পিপাসা; সকল বস্তুই শীতল অবস্থায় খাইবার ইচ্ছা

অম্ল দ্রব্য অথবা সরস স্নিগ্ধ দ্রব্য আহারের স্পৃহা (ফস-এসি)।

মুখমণ্ডল, নাসাগ্র, পদ, জঙ্ঘা বাহু ও অন্যান্য অনেকগুলি শরীরাংশের বরফবৎ শীতলতা

উদরে শীতলতা অনুভব (কদাচিৎ, টাব)

প্রভূত অতিসার সহকারে প্রবল বমন।

বমন।- বিবমিষা ও অতিশয় অবসন্নতা সহ অত্যধিক বমন; জলপানে উহার বৃদ্ধি (আর্স); অত্যল্প মাত্র নড়িলে চড়িলেও বৃদ্ধি (ট্যাবে); বমনান্তে অতিশয় দুর্ব্বলতা

উদরে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় যাতনা।

ওলাউঠা —বমন-বিরেচন, প্রভূত, জলবৎ বেগে বিনির্গত অবসন্নতাজনক ভেদ বিশিষ্ট ওলাউঠা ভয় প্রাপ্তির পর ওলাউঠা (একন)।

অতিসার —হরিতের আভাবিশিষ্ট, (greenish) জলবৎ প্রবলবেগে বিনির্গত, বারবার নিঃসৃত; ছিবড়ে ছিবড়ে পদার্থ বিমিশ্রিত অতিসার, হাত পায় খল্লীর আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরে উহার প্রসারণ সহকারে কর্ত্তনবৎ উদর-বেদনা; ভয়প্রাপ্তির পর অবসন্নতাজনক অতিসার; অত্যল্প মাত্র নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি; বমনসহ অতিসার, ভেদ-বমনের পরে শীতল ঘর্ম্ম ও তৎপরে অবসন্নতা (আর্স, ট্যাবে)।

কোষ্ঠবদ্ধতা।— মল প্রবৃত্তি পরিশূন্যতা; বৃহৎ, শক্ত মল (ব্রাই, সলফ); গোলাকার কালকাল গোলার মত মল (চেলি, ওপি, প্লম্ব); সরলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা জনিত কোষ্ঠ-রোধ; উদরোর্দ্ধ দেশে বারম্বার মল-প্রবৃত্তি অনুভব (ইগ্নে, সরলান্ত্রে প্রবৃত্তি অনুভব, নক্স), শিশু ও বালকদিগের মলকৃচ্ছ্র, ল্যাই ও নক্সের পরে।

মূত্র-কৃচ্ছ্র।—বমন ও বিরেচন, অথবা শীতল ঘর্ম্ম সংযুক্ত অবসাদ-জনক অতিসার। (ক্যান-ক্যা, বোভি) সহকারে মূত্র-কৃচ্ছ্র, এত দুর্ব্বলতা যে প্রতি ঋতু-কালে দুই দিন পর্য্যন্ত প্রায় দাঁড়াইতে পারা যায় না (এলম, কার্ব্বো-এন, কক)।

অহিফেন-সেবন বা তাম্রকূট-চর্ব্বণের মন্দ ফল।

বর্ষাকালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা, শয্যার উষ্ণতায় উহার আতিশয্য, ক্রমাগত হাঁটিলে হ্রাস

রক্তসঞ্চয়াবিশিষ্ট বা দূষিত সবিরামজ্বর শরীরের অতিশয় শীতলতা, পিপাসা, মুখমণ্ডলের শীতলতা ও পতনাবস্থা; ত্বক্ শীতল ও আঠ আঠ, অতিশয় অবসন্নতা; কপালে শীতল ঘর্ম্ম ও মুখমণ্ডলের মৃত্যুবৎ পাণ্ডুবর্ণতা।

উপচয়।—যৎসামান্য সঞ্চালনে, পানান্তে, ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে, মল-ত্যাগকালে; ঘর্ম্ম নিঃসরণ সময়ে; ও ভয় পাইবার পর; বৃদ্ধি

সম্বন্ধ (১) আর্স, আর্ণ, চিক্ক, কুপ, ইপিক পরে, (২) ওলাউঠায় ক্যাম্ফরের পরে, (৩) বমন ও বিরেচন সহবর্ত্তী রক্তকৃচ্ছে এম কা, কার্ব্বো ভেজি ও বোভের পরে; ভিরেট্রাম ভাল খাটে। (৪) অপরিমিত মদিরা-পান ও তাম্রকূট সেবনের মন্দফল অনেক সময় এই ঔষধে দূরীকৃত হয়।

ভিরেট্রম ভিরিডি।

(Voratium Viride)

পূর্ণ-রক্ত, রক্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

রক্ত-সঞ্চয় বিশেষতঃ <u>মস্তিষ্কের ভূমিদেশে,</u> (base of brain) বক্ষস্থলে, পৃষ্ঠবংশে ও আমাশয়ে রক্ত-সঞ্চয়

প্রদাহ সংসৃষ্ট প্রবল বেদনা

তরুণ আমবাত, উচ্চজ্বর, পূর্ণ দৃঢ়-দ্রুত নাড়ী, সন্ধিতে ও পেশীতে তীব্র বেদনা (ব্রাই, স্যালি-এসি), স্বল্প ও লোহিত মূত্র।

শিশুর কম্পন ও উৎক্ষেপণ, টঙ্কারের সম্ভাবনা, অবিরত মস্তকের উৎক্ষেপণ, বা সঞ্চালন স্নায়বীয় বা সবমন শিরঃপীড়া; ঋতু বিলুপ্তি বশতঃ রক্ত-সঞ্চয়, প্রবল বিবমিষা ও বমন সহবর্ত্তী প্রায় সন্ন্যাস সদৃশ দারুণ শিরঃপীড়া।

রক্ত-সঞ্চয় জনিত সন্ন্যাস, উত্তপ্ত মস্তক, রক্তবর্ণ চক্ষু, স্থূলবাক্য, ধীর, পূর্ণ, লোহার ন্যায় শক্ত নাড়ী

টঙ্কার —অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি; <u>মস্তকের ভূমিদেশের ঝিল্লীর প্রদাহ;</u> পশ্চাৎদিকে আকৃষ্ট মস্তক, শিশুর আক্ষেপের উপক্রম

আক্ষেপ, প্রসারিত কনীনিকা, ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ, পশ্চাদ্বক্র টঙ্কার ; শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম সহকারে মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠ-বংশীয় (cerebro-spinal) রোগ।

অর্কাঘাত (Sun stroke), মস্তকের পূর্ণতা, ধমনীর দপ্ দপ্ শব্দে অতিরিক্ত অনুভূতি ; যুগল বা আংশিক দৃষ্টি (জেল স্নন)।

জিহ্বা। মধ্যস্থলের নিম্নে লোহিত রেখাসহ শ্বেত বা পীতবর্ণ জিহ্বা, শুষ্ক, আর্দ্র, শ্বেত বা পীতবর্ণ লেপ, অথবা উভয় পার্শ্বেই লেপাভাব ; জিহ্বা ঝলসিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় (স্যাঙ্গ)।

নাড়ী।—সহসা বেগের বৃদ্ধি এবং ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক অপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত নাড়ী ; মন্দ, কোমল, দুর্ব্বল ; অনিয়মিত সবিরাম (ডিজি) ; নাড়ী।

কেবল নাড়ীর বেগের হ্রাস অথবা "হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার লাঘব" জন্মাইবার জন্য ভিরেট্রম ভিরিডি ব্যবহেয় নহে অন্যান্য ঔষধের ন্যায় "লক্ষণ সমষ্টির" সাদৃশ্য অনুসারেই এই ঔষধও ব্যবহৃত হওয়া বিধেয়।

ভেরিওলাইনম।

(Variolinum)

বসন্তের পূয হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয় ইহা আংশিক পরীক্ষিত হইয়াছে।

ডিপথিরিয়ার সহিত ডিপ্থিরিনাম যে সম্বন্ধ বসন্তের সহিত ভেরিওলাইনমেরও সেই সম্বন্ধ।

সংশ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট ও দূষিত বসন্ত, উপবসন্ত ও জল-বসন্ত সকল প্রকার বসন্তেই এই ঔষধের আরোগ্যকারিণী শক্তি বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ কর্তৃক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ষষ্ঠ, ত্রিংশ ক্রম হইতে লক্ষ (c. m) ক্রম পর্য্যন্ত সকল ক্রমেই এই ঔষধে উপকার দর্শে।

বসন্তের প্রতিষেধক স্বরূপ ভিরিওলাইনম ভ্যাক্সিনেশন অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। দূষিত বীজের দোষে টীকার পরে যে সকল উপসর্গ উপস্থিত হয় ইহাতে সে সকল পরিণামফল উৎপন্ন হয় না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তির কার্য্যকা-

সিত জড়বাদী বুঝিতে চাহিবেন না ; কিন্তু বসন্ত প্রভৃতি রোগের সংক্রামক প্রকৃতি বুঝিলে, শক্তিকৃত ঔষধের ক্রিয়া বুঝা কি উহা হইতে আরও কঠিন ? যাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করেন নাই তাহাদের কথা যাহারা হোমিওপ্যাথির "সমমতের" সত্যাসত্য পরীক্ষা না করিয়াছেন তাঁহাদের মতই অবিশ্বাস্য ইচ্ছা হয় এই ঔষধের ফলাফল পরীক্ষা কর এবং জগৎবাসীর সম্মুখে পার যদি ইহার বিফলতা ঘোষণা কর

ভেলেরিয়ানা।

(Valeriana)

স্নায়বীয়, কোপন-স্বভাব, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত, (ইগে পলস) বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য-বিশিষ্ট, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হিষ্টিরিয়াজনিত স্নায়ু-শূলসংযুক্ত, এবং পরিবর্তনশীল প্রকৃতি সমন্বিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

শরীরের লোহিতাংশের শুভ্রতা প্রাপ্তি (ফির)

বায়ুতে যেন ভাসিতেছে রোগীর এরূপ লঘুতা অনুভব (এসার, ল্যাক-ক্যান — যেন জলে ভাসিতেছে, ষ্টিক)।

সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অনুভূতি (ক্যাম, কফি, নক্স)

মস্তকে শীতলতা অনুভব, (মূর্দ্ধাদেশে, ক্যাল্‌ক, ভিরে), গল-গহ্বরের নীচে যেন একগাছি সূতা ঝুলিতেছে এরূপ অনুভব (জিহ্বায়, য়্যাট, সিলি)

শিশুর বড় বড় খণ্ড খণ্ড সংযত দুগ্ধ বমন ; মলও সেইরূপ সংযত দুগ্ধ (ইথু); মাতার ক্রোধাবেশের পর স্তন পান করিবামাত্রে তখনই বমন

সায়েটিকা, দাঁড়াইলে ; ঘরের মেজের উপর পা স্থির রাখিলে (বেল), অঙ্গ-প্রসারণ করিলে ও পূর্ববর্ত্তী পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম করিলে, বেদনার বৃদ্ধি ; হাঁটিলে হ্রাস

সম্বন্ধ।—(১) এসাফ, এসার, ক্রোক, ইগ্নে, ল্যাক-ক্যান, পিপ্তি, সলফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (২) পাদ-মূলের বেদনায় এসার, কষ্ট, সাইক্লে, পিড, ম্যাগ ও কাইটোর সহিত এই ঔষধের তুলনা হয়।

মারকিউরিয়ঃস।

(Mercurius)

পাতলা চুল বিশিষ্ট এবং শিথিলাপেশী ও চর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকারিতা।

রাত্রিতে ও শয্যার উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি মারকিউরিয়াসের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ

অস্থি রোগ, রাত্রিতে বেদনার আতিশয্য ; পূয সংযুক্ত বা পূয পরিশূন্য, বিশেষতঃ পূযের অতিপ্রাচুর্য্য বিশিষ্ট (হিপ, সিলি) গ্রন্থির স্ফীততা।

শীতল স্ফীততা, বেগে ধীরে ধীরে পূযোৎপত্তি

প্রায় সকল রোগের সহিতই প্রভূত ঘর্ম্মের বিদ্যমানতা কিন্তু ঘর্ম্মস্রাবে উপশম জন্মে না, এমন কি যাতনার বৃদ্ধিও হইতে পারে (অধিকাংশে উপশম প্রাপ্তি, ষ্ট্যাট, সোরি, ভিরে)

সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও কম্পন।

শ্বাস ও শরীরের দুর্গন্ধ (সোরি)

ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে শীঘ্র শীঘ্র কথা বলা (হিপ)

অত্যন্ত হাঁচি ও প্রভূত বিদাহী স্রাব সহকারে নাসারন্ধ্রে অবদরণ ও ক্ষত, পীতাভ হরিৎ বর্ণের দুর্গন্ধ পূযের মত স্রাব, নাসাস্থির স্ফীততা, আর্দ্রঋতু ও রাত্রিকালে বৃদ্ধি সহকারে নাসিকার প্রতিশ্যায়

দপদপকর, ছেদনকর, বিদারণকর, মুখমণ্ডল ও কর্ণে সম্প্রসারিত তীব্র বেদনা ; আর্দ্রঋতু অথবা সান্ধ্য বায়ুতে, শয্যার উত্তাপে, শীতল উষ্ণ দ্রব্যে বিবর্দ্ধিত ; গণ্ডঘর্ষণে উপশমিত দন্ত বেদনা।

দন্তের শিখরের ক্ষয়প্রাপ্তি, কিন্তু দন্ত-মূলের বর্ত্তমানতা (দন্ত-মূলের ক্ষয়প্রাপ্তি, শিখরের বিদ্যমানতা, মেজ)

রক্তামাশয় —শেওলা শেওলা রক্তাক্ত মল, তৎসহ উদর-বেদনা ও মূর্চ্ছা ; মল ত্যাগ কালে ও মলত্যাগের পরে, অতিশয় কুন্থন, তৎপরে শীত, এবং "মলত্যাগ-ক্রিয়া শেষ হইল না" এ প্রকার অনুভব ; যতই অধিক রক্ত ও অধিক বেদনা থাকে ততই এই ঔষধ ভাল খাটে।

লালাস্রাব প্রভৃতি, দুর্গন্ধ উবাটে ধাতব আস্বাদ লালা, সাবান সদৃশ, ও রজ্জুবৎ লালা।

বৃহৎ লোহিত, দন্তাঙ্ক সম্বলিত (চেলি, পড, হাইড্রা); স্ফীতসংযুক্ত; ব্যথিত; লোহিত বা শুভ্র; জিহ্বা

দারুণ পিপাসা, কিন্তু জিহ্বা আর্দ্র দৃষ্ট হয় ও প্রভূত লালাস্রাব হয় (মুখ শোষ, কিন্তু পিপাসা পরিশূন্যতা, পল)

প্রভূত দুর্গন্ধ লালা সহকারে ওদাবিবি (mump); ঝিল্লীক প্রদাহ (diphtheria), ও তালুমূল প্রদাহ (tonsillitis; বৃহৎ, লোহিত দন্তাঙ্ক সম্বলিত জিহ্বা; মানচিত্রের ন্যায় অঙ্কিত জিহ্বা (ল্যাক, ন্যাট, ট্যারাক্স)

ডিফ্থিরিয়া।—প্রদাহিত তালুমূল, বিবর্দ্ধিত ও স্ফীত উপজিহ্বা অবিরত গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি; স্থূল, ধূসরবর্ণের দাগ বা সংলগ্ন বা বিযুক্ত প্রান্ত বিশিষ্ট কৃত্রিম ঝিল্লী সহকারে ডিফ্থিরিয়া।

যে পরিমাণ জলপান করা যায় তদপেক্ষা অধিক মূত্রস্রাব বারবার মূত্র-প্রবৃত্তি

স্বপ্নে রক্তমিশ্রিত শুক্রস্রাব (সেড; সর্প)

শ্বেতপ্রদর।—বিদাহী, জ্বালাকর, কণ্ডুয়ন ও অবসন্নতা বিশিষ্ট প্রদর; সর্বদা রাত্রিতে উহার আধিক্য; ভগ-কণ্ডুয়ন, মূত্রসংস্পর্শে উহার বৃদ্ধি ধুইয়া ফেলার আবশ্যকতা (সল)

গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বিবমিষা (সিম্ফোরিকার্পাস), নিদ্রাকালে অতিশয় লালাস্রাব হইয়া বালিশ ভিজিয়া যায় (ল্যাক-এসি)

প্রতি ঋতু-কালে স্তনে বেদনা, বোধ হয় যেন উহাতে ক্ষত হইবে (কোনা, ল্যাক-ক্যান); রজের পরিবর্ত্তে স্তনে দুগ্ধোৎপত্তি।

কাস।—শুষ্ক, শ্রান্তিকর, যন্ত্রণাজনক; দুই আবেগে উপস্থিত; রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে বিবর্দ্ধিত, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে সম্পূর্ণ অসমর্থতা বিশিষ্ট কাস

দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নখণ্ডের আক্রান্ততা; পৃষ্ঠের অভ্যন্তর দিয়া সূচীবেধবৎ যাতনা (চেলি, কালী-কা)।

ফুসফুস-প্রদাহের রক্তস্রাবের পর ফুসফুসে পূযোৎপত্তি (কালী-কা)

মাড়ীতে, জিহ্বায়, গলার মধ্যে, গালের অভ্যন্তর ভাগে লালাস্রাব সহকারে

ক্ষতের প্রকাশ ; ক্ষতগুলির অসম আকৃতি · অনির্দ্দিষ্ট প্রান্ত ; মলিন, অসুস্থ দৃশ্য ; মলিনবর্ণ মণ্ডল-পরিবেষ্টিত, শূকরের বসাসদৃশ ভূমিদেশ · ক্ষতগুলির একত্র মিলিত হইবার অভিমুখতা, উপদংশের ক্ষত গোলাকার হয়, মুখমধ্য ও গল-মধ্যের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করে, উহার নিম্নাবিত প্রান্ত থাকে ; চারিদিক তাম্রবর্ণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, এবং আদি স্থান হইতে প্রসারিত হয় না"—ডনহাম।

শরীর- শাখার বিশেষতঃ হস্তদ্বয়ের কম্পন ; বেপথু (প্যারালিসিস-এজিট্যান্স)

উপচয় ।—রাত্রিতে ; ভিজা সেঁতসেঁতে, শীতল বায়ুতে, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে ; শরৎকালে, উষ্ণদিন ও শীতল সেঁতসেঁতে রাত্রিতে অনাবৃত হইলে, খোলাগায় শীতল বায়ু লাগিলে (ব্যারা, হিপ) ; দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে ; ঘর্ম্ম-নিঃসরণে ; ও শয্যার উত্তাপে ; বৃদ্ধি

উপশম ।—অনাবৃত বায়ুতে ; কার্য্যের সময় সবলে সঞ্চালনে ; শয্যায় বিশ্রামে ; উপশম।

আর্সেনিক ও মারকিউরি উভয় ঔষধেই শয্যায় শয়ন-কালে উপচয় ও উপশম জন্মে। শয্যার উত্তাপে মারকিউরির লক্ষণ বিবৰ্দ্ধিত কিন্তু শয্যায় বিশ্রামে উহা উপশমিত হয় আর্সেনিকের লক্ষণ শয্যায় বিশ্রামে বিবৰ্দ্ধিত কিন্তু শয্যার উত্তাপে উপশমিত হয়।

সম্বন্ধ ।—(১) বেল, হিপ, ল্যাক ও সলফের পরে মার্ক ভাল খাটে, কিন্তু সিলিশিয়ার পূর্ব্বে বা পরে এই ঔষধ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। (২) নিম্নক্রমে মার্ক ব্যবস্থা করিলে পূযোৎপত্তি, নিবারিত না হইয়া সত্বর উৎপন্ন হয় (৩) মার্কের মন্দ ফল অর,, হিপ ল্যাক, নাই-এসি, সলফ এবং লক্ষণের সহিত সৌসাদৃশ্য থাকিলে উচ্চ শক্তির মার্ক ব্যবহারে বিদূরিত হয়। (৪) মেজেরিয়ম মার্কের উদ্ভিজ্জ সমগুণ ; অধিক মাত্রায় ও অতিরিক্ত পুনঃ পুন মার্ক সেবনের মন্দফলে ইহার ব্যবহার হইতে পারে। (৫) চিনি ভক্ষণ, কীটাদির দংশন, আর্সেনিক বা তাম্রের ধূম্রগ্রহণের মন্দফলে যে সকল রোগ এবং শীতকালের রোগে মার্ক উপযোগী।

মারকিউরিয়ংস করোসাইভংস।

(Mercurius Corrosivus)

পুরুষের উপদংশজ রোগ ; খাইয়া যায় এরূপ বিদাহী পূয-বিশিষ্ট ক্ষত, আইট্রস ভিজিল।

অন্ত্র-প্রণালীর রক্তাতিসার ও গ্রীষ্মকালীয় অতিসার, মে হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত উহার উপস্থিতি

কুন্থন।—সরলান্ত্রের কুন্থন, মল-ত্যাগে উহার অনিবৃত্তি (মলত্যাগে নিবৃত্তি, নক্স) ; অবিরত ও ক্রমাগত কুন্থন ; স্বল্প, রক্তাক্ত, শেওলা শেওলা, দুর্গন্ধ, তপ্ত মল ; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর খণ্ডপাত এবং ভয়ঙ্কর কর্ত্তনবৎ উদর-বেদনা

মূত্রাশয়ের কুন্থন, তৎসহ মূত্রমার্গে তীব্র জ্বালা ; তপ্ত, জ্বালাকর, স্বল্প বা বিলুপ্ত মূত্র ; অতিশয় যাতনা সহকারে বিন্দু বিন্দু মূত্র-পাত ; রক্তাক্ত কাগিশ, ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ ; সাওলাল মূত্র।

প্রমেহ ; দ্বিতীয় অবস্থা, ঈষৎ হরিদ্বর্ণ (greenish) স্রাব, রাত্রিতে বৃদ্ধি, অতিশয় জ্বালা ও কুন্থন।

মারকিউরিয়ংস ডংলসিস।

(Mercurius Dulcis)

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিশেষতঃ চক্ষু ও কর্ণের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায় জনিত পীড়া।

মধ্য-কর্ণের প্রতিশ্যায় জনিত প্রদাহ (ক্যালী-মিউ)

ইউষ্টেকিয়ান টিউবের অবরুদ্ধতা ; সোরাদোষগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের প্রতিশ্যায় জনিত বধিরতা ও কর্ণস্রাব (ক্যালী-মিউ)।

কুচিকিৎসিত ষ্ট্রীকচারের পর প্রষ্টেট-গ্রন্থির তরুণ পীড়া।

নাসা-রন্ধ্র, গল-মধ্য ও গলকোষের পারদ মিশ্রিত ধাতব পদার্থ জনিত প্রাতিশ্যায়িক পীড়া ও বধিরতা।

বালক-বালিকাদিগের অতিসার ; ঘাসের ন্যায় সবুজবর্ণ ও খণ্ডিত অণ্ডের ন্যায় মল ; প্রভূত মল ; মল লাগিয়া মল-দ্বারে ক্ষতের উৎপত্তি।

মারকিউরিয়ংস প্রটো-আইওডাইড।

(Mercurius Proto-Iodide)

ডিপথিরিয়া জনিত রোগে এবং গলরোগে গ্রীবা-গ্রন্থি ও কর্ণমূল-গ্রন্থির অত্যন্ত স্ফীততা, দক্ষিণ পার্শ্বে কৃত্রিম ঝিল্লীর আরম্ভ বা আতিশয্য; উষ্ণ পানীয় দ্রব্য পানে ও খালি ঢোক গিলিলে বৃদ্ধি (ন্যাশ)।

জিহ্বা —জিহ্বার ভূমিদেশে গাঢ় পীতবর্ণ লেপ (কালী-বাই।—স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ লেপ, ন্যাট-ফস; মলিন বর্ণ অথবা হরিতাভ ধূসরবর্ণ লেপ, ন্যাট-সল); অগ্রভাগ ও প্রান্তভাগের আরক্ততা; গলার ও ঘাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বের অধিকতম আক্রান্ততা।

কঠিন উপদংশে (হান্টেরিয়ান শ্যাঙ্কার), উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে গৌণ লক্ষণ কদাচিৎ প্রকাশ পায় বক্ষণ-গ্রন্থির (বাঘী) অতিশয় স্ফীততা, পূযোৎপত্তি হইবার অপ্রবণতা।

মারকিউরিয়ংস বিন আইওডাইড

(Mercurius Bin Iodide)

বাম পার্শ্বের ডিপথিরিয়া জনিত ও গ্রন্থির পীড়া; গল-গহ্বরের মলিন আরক্ততা; অতরল বা তরল পদার্থ গিলিতে যাতনা; যৎসামান্য কৃত্রিম ঝিল্লী, উহা সহজে বিচ্ছিন্ন হয়; বহুব্যাপক আরক্ত জ্বরের (epidemic scarlet fever) আনুষঙ্গিক রোগ, গলগহ্বরে বা তালু-মূলে ক্ষত; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, গলকোষ (pharynx) অথবা নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধ্র হইতে ঈষৎ হরিদ্বর্ণ দৃঢ় খণ্ড নিঃসরণ।

টিউবারকিউলার ফেরিঞ্জাইটিস অর্থাৎ গুটিকা জনিত গলকোষ-প্রদাহ।

মারকিউরিয়ংস সলফিউরিকংস।

(Mercurius Sulphuricus)

হৃদ্রোগ অথবা যকৃদ্রোগ হইতে উৎপন্ন বক্ষঃস্থলের শোথ; শ্বাস-কষ্ট, উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, শয়ন করিতে পারা যায় না। হাত-পায়ের স্ফীততা

জলবৎ তরল মল, উহাতে তীব্র জ্বালা ও স্পর্শদ্বেষের উৎপত্তি ; বক্ষঃস্থলে জ্বালা।

ডাঃ লিপি বলেন এই ঔষধের উত্তম ক্রিয়া দর্শিলে এতদ্বারা প্রভৃত জলবৎ অতিসারের উৎপত্তি হইয়া রোগীর অতিশয় শান্তি জন্মে, বক্ষঃস্থলের শোথে ইহা আর্সেনিকের ন্যায় উপযোগী।

সম্বন্ধ — আর্স, সিনাব, ডিজি ও সলফের সহিত এই ঔষধের তুলনা হয়

মারকিউরিয়ংস সলিউবিলিস।

(Mercurius Solubilis)

স্রাব বিলুপ্তির পর, বিশেষতঃ সোরা-দোষ-প্রাপ্ত রোগীদিগের স্নায়বীয় রোগ (এসাফ.)

বালক-বালিকাদিগের গ্রন্থিসংক্রান্ত এবং গণ্ডমালা জনিত রোগ

কর্ণস্রাব (কান-পাকা) —রক্তাক্ত, দুর্গন্ধস্রাব তৎসহ খোঁচা মারিয়া সেলাই করার মত বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে, রাত্রিতে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি।

বাহ্যকর্ণ-দ্বারে স্ফোটক (পিক-এসি)

বাহ্যকর্ণ দ্বারে বহুপাদ (polyp) এবং ছত্রাকাকার উপমাংস (মেরম, থুজা)।

বিদাহী নাসা-স্রাব, উহার পুরাতন পনিরের ন্যায় গন্ধ ; নাসারন্ধ্রের আরক্ততা, অবদরণ ও ক্ষত।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব —কাসিবার সময় ; রাত্রিতে নিদ্রাকালে ; নাসিকা হইতে লম্বমান বরফবিন্দুর ন্যায় মলিন সংযত-রক্ত-রজ্জু ঝুলিয়া থাকে।

প্রমেহ (gonorrhœa) —মুদা (phymosis) বা ঈষৎ উপদংশ (chancroid) সবুজবর্ণ স্রাব, রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি ; মূত্র বেগ ; শেষ কয়েক বিন্দু মূত্রের পতন-কালে মূত্র মার্গের সম্মুখভাগে অসহ্য জ্বালা ; লিঙ্গ-মুণ্ডের আচ্ছাদন-ত্বকের উত্তপ্ততা, স্ফীততা এবং স্পর্শদ্বেষ ; শ্লেষ্মা প্রকৃতির রোগ, বাঘীর সম্ভাবনা অথবা পাকা বাঘী।

উপদংশ।— মুখ্য (primary) উপদংশ - নিয়মিত, কঠিন (হণ্টেরিয়ান), শূকরের বসার ন্যায় নিম্নভাগবিশিষ্ট পনির সদৃশ তল এবং বিপর্য্যস্ত আরক্ত প্রান্ত ; ও মুদা বা উল্টামুদা (paraphymosis) সংযুক্ত উপদংশ, গভীর গোলাকার ক্ষত, লিঙ্গ-মুণ্ডের বল্‌গা (frænum) ও আচ্ছাদন ত্বক (prepuce) খাইয়া খাইয়া ক্ষত অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় ; উহা হইতে যাতনা সহকারে রক্ত ও ঈষৎ পীতবর্ণ দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসৃত হয়।

উপদংশ এবং জনন ও মূত্রপথের রোগে মারকিউরিয়াস সল্‌উবিলিস হানিমানের ঔষধ। জিহ্বা শুষ্ক থাকিলে কদাচিৎ ইহার প্রয়োগ হয়।

চর্ম্মের রোগ, শরীরে কীট দংশনের ন্যায় অসহ্য দংশন ও কণ্ডূয়ন ; সন্ধ্যাকালে ও শয্যার উত্তাপে উহার বৃদ্ধি ; চুলকাইলে ভাল লাগে।

অঙ্গের দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তি ; স্পর্শ-দ্বেষ ও দুষ্টবৎ অনুভব।

মারকিউরিয়স সায়েনাইড।

(Mercurius Cyanide)

গল-গহ্বরের তীব্র আরক্ততা ও গলাধঃকরণে অতিশয় আয়াস-সহকারে দূষিত ডিফ্‌থিরিয়া, সমগ্র গল-গহ্বরের উপর এবং গলমধ্যেও নিম্ন পর্য্যন্ত কৃত্রিম ঝিল্লীর প্রসারণ ; পচা, গ্যাংগ্রীণ বিশিষ্ট ডিফথিরিয়া; তৎসহ বিগলিত ক্ষত ; কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট ক্রুপ।

অতিশয় দুর্ব্বলতা ; যৎপরোনাস্তি অবসন্নতা ; দুর্ব্বলতা-বশতঃ দাঁড়াইতে পারা যায় না।

যখন এই ঔষধ ব্যাপক আকারে প্রকাশিত ডিফথিরিয়ার লক্ষণের সাদৃশ্যে অমোঘ ঔষধস্বরূপ স্থিরীকৃত হয় তখন অন্যান্য অমোঘ ঔষধের ন্যায় প্রতিষেধক স্বরূপও ইহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

মিউরিএটিক এসিড।

(Muriatic Acid)

কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণচক্ষু, মলিনবর্ণ মুখাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে মিউর-এসি বিশেষ উপযোগী।

কোপনতা, কলহপ্রিয়তা, ক্রোধ ও বিরক্তির প্রবণতা (নক্স), অস্থিরতা ও শিরোঘূর্ণন

দৌর্ব্বল্যকর প্রকৃতির রোগ তৎসহ কোঁকোঁ করা ; সংজ্ঞাশূন্যতা, ও বিরক্ত চিত্ততা

ছত্রাকের ন্যায় (funguslike) উপমাংস ও কৃত্রিম ঝিল্লীসংযুক্ত অন্ত্র-প্রণালীর (intestinal tract) ক্ষত

অতিশয় দুর্ব্বলতা। বসিবামাত্র চক্ষু মুদিত হইয়া আইসে। নিম্ন হনু ঝুলিয়া পড়ে ; রোগী শয্যার নিম্নভাগে সরিয়া পড়ে।

মুখ-বিবর ও মল-দ্বার প্রধানতঃ আক্রান্ত হয়, জিহ্বা ও মলদ্বারের আবরণ-পেশীর পক্ষাঘাত জন্মে।

মুখ-বিবরের উৎকট রোগ ; গভীর ও রক্ত কর ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ক্ষত, উহার কাল অথবা মলিন ভূমি ; দুর্গন্ধ শ্বাস ; দারুণ অবসন্নতা ; ডিফথিরিয়া, স্কার্লেটিনা, ক্যান্সার।

মাংসের চিন্তা বা দৃশ্য সহ্য করিতে পারা যায় না (সাই-এসি)।

অর্শসম্বলিত বা অর্শ-বিবর্জ্জিত মলদ্বারের অতিশয় অনুভূতি ; ঋতু-কালে মলদ্বারের স্পর্শ-দ্বেষ

অর্শ—স্ফীত নীলবর্ণ বলি স্পর্শে উহাতে অনুভূতি ও বেদনা ; সহসা বালকদিগের অর্শোৎপত্তি ; উহাতে অত্যল্পমাত্র স্পর্শও সহ্য হয় না, শয্যার চাদর লাগিলেও অস্বচ্ছন্দতা জন্মে মূত্রত্যাগ-কালে হাড়িশ বাহির হয় (ব্যারা-কা)

অতিসার —মূত্র-কালে ; ও অপান নিঃসারণ-কালে (এলে অনিচ্ছায় মল নিঃসরণ মূত্র-কালে যুগপৎ মলের নিঃসরণ না হইয়া মূত্রত্যাগ করিতে পারা যায় না।

ধীরে ধীরে মূত্রনিঃসরণ হয় ; মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় ; এত বেগ দিতে হয় যে মল-দ্বার বাহির হইয়া পড়ে

জননাঙ্গে অত্যল্প মাত্র স্পর্শ, এমন কি বিছানার চাদরের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য হয়না (মিউর)

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মুখমণ্ডলে অনুভূত হয়

মাস্তিয়া ; একজিমা সোলারিস

টাইফয়েড ও টাইফাস জ্বর —মোহবৎ গভীর নিদ্রা ; জাগ্রদবস্থায় জ্ঞান শূন্যতা ; উচ্চ কোঁ কোঁ শব্দ বা মৃদুপ্রলাপ (বিড়বিড় করিয়া বকা) প্রান্তভাগে লেপাচ্ছন্ন কুঞ্চিত, শুষ্ক, চর্ম্মবৎ, পক্ষাঘাতিত জিহ্বা ; মূত্রত্যাগকালে অনিচ্ছায় দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ ; শয্যার নিম্নভাগে সরিয়া পড়ন ; নাড়ীর তৃতীয় স্পন্দনের বিরাম ; মলিনবর্ণ তরল রক্তস্রাব ; ঈষৎ নীলবর্ণ দাঁতে মুখ-বিবরের পূর্ণতা ; অতিশয় অবসাদ

সম্বন্ধ। — (১) ব্রাই, মার্ক, রাসের পরে ভাল খাটে (২) অতিরিক্ত আফিম ও তামাক সেবন জনিত পেশীর দুর্ব্বলতা এই ঔষধে আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

মিউরেক্স পার্পিউরিয়া।

(Murex Purpurea)

বিমর্ষ প্রকৃতির লোকদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী

নিবৃত্ত-রজস্কাদিগের অসুখে ইহা ব্যবহার্য্য (ল্যাক, সিপি, সলফ) চিত্তের অতিশয় অবসাদ। আমাশয়ে যেন কিছু নাই এপ্রকার শূন্যতা অনুভব (সিপি)।

জননাঙ্গের অত্যল্প সংস্পর্শে, প্রবল কামোদ্দীপনার উৎপত্তি (জননাঙ্গের অতিশয় উপদাহ বশতঃ কৃত্রিম মৈথুনে প্রবৃত্তি, অরিগেন, জিঙ্ক)

জননেন্দ্রিয়ের প্রবল উত্তেজনা, এবং রমণ-ক্রিয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা (সিপিয়ার বিপরীত)

জরায়ুতে ক্ষতবৎ বেদনা ; জরায়ুর বিদ্যমানতার স্পষ্ট অনুভূতি (হেলোন, লাইসি) আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি যেন বলপূর্ব্বক বাহির হইয়া আসিবে এরূপ আবেগ অনুভব, তজ্জন্য উরুর উপর উরু রাখিয়া বসিয়া থাকিতে হয় ও চাপ দিলে উপশম পড়ে (কিন্তু সঙ্গম-প্রবৃত্তি পরিশূন্যতা, সিপি)

ঋতু —অনিয়মিত, নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা সত্বর প্রকাশিত, প্রভূত, অধিক-দিন স্থায়ী ; বড়বড় রক্ত-খণ্ড বিশিষ্ট, ঋতু

প্রদর —মানসিক অবসাদ, স্রাবের আতিশয্যে প্রফুল্লতা

সম্বন্ধ। —(১) কামোন্মাদে লিলি ও প্লাটের সহিত ; এবং কাম-প্রবৃত্তি পরিশূন্য "আবেগ" অনুভবে সিপিয়ার সহিত মিউরেক্সের তুলনা হয়

মিলিফোলিয়ম।

(Millefolium)

অতিরিক্ত শারীরিক চেষ্টা অথবা পতনজনিত রোগ

বল ব্যায়াম-কালে নহে, কিন্তু ধীরে ধীরে সঞ্চলন-সময়ে শিরোঘূর্ণন।

রক্ত-স্রাব —জ্বর ব্যতীত ও বেদনা বিবর্জ্জিত, উজ্জ্বল লোহিত, তরল রক্তপাত (একন, ইপি, স্যাবি) ; ফুসফুস, বায়ু-নলী-ভুজ, স্বরযন্ত্র, মুখ-বিবর, নাসিকা, আমাশয়, মূত্রাশয়, সরলান্ত্র ও জরায়ু হইতে রক্ত-পাত ; আধিভৌতিক (mechan cal) রক্ত-স্রাব ; সদ্যব্রণের (wound) রক্তস্রাব (হেমে)।

প্রভূত রক্তস্রাবী সদ্যব্রণ, বিশেষতঃ পতনের পর (আর্ণ, হেমে)।

ফুসফুস হইতে রক্তপাত —উপঘাতের পর ; প্রচ্ছন্ন যক্ষ্মা রোগে ; অর্শগ্রস্ত রোগীর ও রক্তবহানাড়ী বিদীর্ণ হইয়া ; ফুসফুস হইতে রক্তপাত।

নাসিকা, ফুসফুস ও জরায়ু হইতে ; প্রসব বা গর্ভপাতান্তে ; অতি পরিশ্রম বশতঃ গর্ভ-স্রাবের পর ; ক্রমে ক্রমে বেদনাশূন্য রক্তস্রাব। এই ঔষধ প্রসবান্তিক রক্তস্রাবের প্রতিষেধক

ঋতু —নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে প্রকাশিত, প্রভূত ও দীর্ঘকালস্থায়ী ঋতু ; উদরে বেদনা সংযুক্ত বিলুপ্ত ঋতু।

পেশীর দৌর্ব্বল্য বশতঃ বালিকাদিগের শ্বেতপ্রদর (ক্যাল্ক)।

কাস —উজ্জ্বল রক্তের উত্থিতি বিশিষ্ট ঋতু বা অর্শস্রাব বিলোপজন্য; বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব ও হৃৎকম্প সম্বলিত; উচ্চস্থান হইতে পতন বশতঃ (আর্ণি); প্রবল পরিশ্রমের পর; প্রতিদিন অপরাহ্ন ৪টার সময় (লাইকো) রক্ত সংযুক্ত কাস।

সম্বন্ধ। —(১) নাসিকা ও ফুসফুস হইতে উজ্জ্বল লোহিত রক্ত-পাতে ইরেক্টের সহিত মিলিফোলিয়মের তুলনা হয়। (২) রক্ত-স্রাবে একন ও আর্নিকার পরে মিলিফোলিয়ম ভাল খাটে।

মেজেরিয়ম।

(Mezerium)

পাতলা চুল, শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতুবিশিষ্ট অস্থিরপতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে মেজেরিয়ম বিশেষ উপযোগী

অবসাদবায়ুগ্রস্ত ও নিরাশচিত্ত, প্রত্যেক বিষয় ও ব্যক্তির প্রতি উদাসীন। সামান্য ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বিষয়ে রাগান্বিত ও তৎপরে শীঘ্র তন্নিমিত্ত অনুতপ্ত রোগী

পামা (eczema); অসহ্য কণ্ডূয়ন, শয্যায় থাকাকালে ও স্পর্শে উহার বৃদ্ধি; রক্তাম্বুবৎ প্রচুর স্রাব ক্ষরণ, গো বীজে টীকা দেওয়ার পর কণ্ডূয়নজনক উদ্ভেদ।

শিশু সতত বদন কণ্ডূয়ন করে, উহাতে মুখমণ্ডল রক্তাবৃত হইয়া পড়ে আর্দ্র উদ্ভেদ; রাত্রিতে কণ্ডূয়নের বৃদ্ধি, মুখমণ্ডলের প্রাদাহিক আরক্ততা।

অতি অল্পমাত্র বিরক্তির পরে প্রবল শিরঃপীড়া; যৎসামান্য স্পর্শে উহাতে যাতনা; সাধারণতঃ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা।

মস্তকে একপ্রকার পুরু, চর্ম্মবৎ চিপিটিকা (crusta), উহার নীচে স্থানে স্থানে গাঢ় ও শাদা পূয সঞ্চয়; কেশের সংযোজনা; কিছুকাল পরে পূযের রসানিবৎ দূষিততা প্রাপ্তি, এবং উহাতে দুর্গন্ধ ও পোকার উৎপত্তি।

ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে দন্ত-শূল (ক্রিয়োজ)। দন্ত দীর্ঘীভূত বোধ হয়, দাঁতে কামড় বা জিহ্বা লাগাইলে মৃদু বেদনা, রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি ; মুখ খুলিয়া বায়ু আকর্ষণে উপশম। দন্ত-মূলের ক্ষয়প্রাপ্তি (মার্কের বিপরীত)

স্থূল, শ্বেতাভ পীতবর্ণ চিপটিকাবৃত ক্ষত, উহার তলে গাঢ়, পীতবর্ণ পূয় সঞ্চয় ক্ষতে বস্ত্র লাগিয়া থাকে, উহা টানিয়া ছাড়াইলে রক্তপাত হয়।

ক্ষতের চারিদিকে জলপূর্ণ স্ফোট উৎপন্ন হয়, উহাতে প্রবল কণ্ডূয়ন জন্মে, আগুনের ন্যায় জ্বালা করে (হিং) ; উহার চারিদিকে অধিক ঔজ্জ্বল্য লোহিত বর্ণ, চকচকে মণ্ডল দৃষ্ট হয়

অস্থি, বিশেষতঃ দীর্ঘাস্থি প্রদাহিত ও স্ফীত ; উপর হইতে নীচের দিকে রাত্রিকালীন বেদনার গতি ; পারদ সেবন, ও উপদংশ-রোগের পর উহার উৎপত্তি ; অস্থি-ক্ষত ; অস্থি-বিবর্দ্ধন, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে অর্ব্বুদের কোমলতাপ্রাপ্তি।

দীর্ঘাস্থির অস্থি-বেষ্টে (periosteum) বেদনা রাত্রিতে শয্যায়, অত্যল্প মাত্র স্পর্শে, ও আর্দ্রকালে উহার বৃদ্ধি (মার্ক, ফাইটো)

কটিবন্ধবৎ দদ্রুর (zona) পরে স্নায়ু-শূলজনিত জ্বালাকর বেদনা।

*সহজের স্বল্প-বিরাম ব টাইফয়েড্ প্রকৃতির প্রবণতা জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যাপক আকারে যে সকল জ্বর উপস্থিত হয় তাহাতে সাধারণতঃ মেজে-রিয়মের প্রয়োজন পড়ে।

* উপচয়। — শীতল বায়ুতে ; শীতল জলে প্রক্ষালনে। রাত্রিতে এবং স্পর্শে ও সঞ্চালনে সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের অত্যাস্তো ও মার্কিউরি অথবা এল-কোহলের মন্দফলের ; বৃদ্ধিপ্রাপ্তি।

সম্বন্ধ। — ফাইটো, কষ্ট, হংস ও গোয়েকের সহিত মেজেরিয়মের তুলনা

মেডোরাইনঃম

(Medorrhinum)

প্রমেহের বিষ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। কুচিকিৎসিত ও বিলুপ্ত প্রমেহের সর্ব্বাঙ্গীন মন্দফলে অতীব সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও উপশম বা স্থায়ী উপকার না দর্শিলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাইকোসিস (মষক দোষ) হইতে উৎপন্ন গাউট, আমবাত, স্নায়ু-শূল এবং পৃষ্ঠ-বংশের মজ্জার বা উহার ঝিল্লীর রোগ—এমন কি উহার বিধান-বিকার (organic lesions) ও উহা হইতে পক্ষাঘাতে পরিণতিতেও মেডোরাইনঃম উপযোগী।

নারীদিগের পুরাতন ডিম্বাশয়-প্রদাহ (ovaritis), ফ্যালোপিয়ান টিউবের প্রদাহ, পেলবিক সেলুলাইটস, তন্তুময় অর্ব্বুদ, (fibroids), কোষময় অর্ব্বুদ (cysts) ও জরায়ুতে অন্যবিধ অস্বাভাবিক বস্তুর উৎপত্তিতে, বিশেষতঃ সেই সকল বিকৃত পদার্থের উৎকট প্রকৃতি ধারণের সম্ভাবনায়, সাইকোসিস-দোষ-মূলক হউক বা না হউক, এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

স্কিরঃস, কার্সিনোমা অথবা ক্যান্সার রোগের তরুণ বা পুরাতন বিকাশে, লক্ষণের সৌসাদৃশ্য ও সাইকোসিস-দোষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত থাকিলে এই ঔষধ উপযোগী।

ত্বক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গভীর-মূল রোগে সোরিণমের যে সম্বন্ধ, সাইকোসিস-দোষ জনিত পৃষ্ঠবংশীয় ও সহানুভৌতিক স্নায়ুমণ্ডলের (sympathetic nervous system) গভীর-মূল পুরাতন রোগে মেডোরাইনমের সেই সম্বন্ধ।

পাণ্ডুবর্ণ, রেকাইটিস-গ্রস্ত বালক-বালিকারা; অপরিবর্দ্ধিত ক্ষুদ্রকায়া (ব্যাবাকা); মানসিক স্থূলবুদ্ধিতা ও দুর্ব্বলতা।

নাসিকা-অস্থির বিবর্দ্ধন সহকারে সর্ব্বশরীরের অতিশয় উত্তাপ ও স্পর্শদ্বেষ।

ক্ষয়রোগজনিত অবসাদ; শ্রান্তি; সর্ব্বাঙ্গীন জীবনী-শক্তির অতিশয় অবসন্নতা।

বেদনা।—বিলুপ্ত প্রমেহের পরিণাম স্বরূপ সন্ধিবাত ও আমবাত জনিত

বেদনা (ড্যাফ, রস); আকুঞ্চনবৎ যাতনা, বোধ হয় যেন সমস্ত শরীর কষিয়া ধরা হইয়াছে (কাষ্ঠ); সর্ব্বশরীরে দষ্টবৎ স্পর্শ-দ্বেষ (আর্ণ, ইউপ)।

রোগীর নিকট সর্ব্বশরীরের কম্পানুভব, তীব্র স্নায়বীয়তা ও গভীর অবসন্নতা।

হিমাঙ্গ অবস্থা, সকল সময়ই বাতাস করিতে বলা (কার্ব্বো-ভে); বিমল বায়ু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা; গাত্র শীতল সত্ত্বেও গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেওয়া (ক্যাম্ফ, সিকে); গাত্রের শীতলতা ও শীতল ঘর্ম্মে সিক্ততা (ভিরেট)।

মন। স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা; নাম, শব্দ বা শব্দের প্রথম অক্ষর স্মরণ রাখিতে পারা যায় না; অত্যন্ত আত্মীয় বন্ধুরও নাম জিজ্ঞাসা করিতে হয়; এমন কি নিজের নাম পর্য্যন্ত মনে থাকেনা।

পরিশুদ্ধরূপে বর্ণ বিন্যাস করিতে পারা যায় না; সুপরিচিত নাম কেমন করিয়া বানান করিতে হয় তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

আলাপ করিতে করিতে কথার সম্বন্ধ হারাইয়া যায়।

রোগিণী তাহার লক্ষণ অনায়াসে বর্ণনা করিতে পারে না, ভেবাচেকা খায়, তখন পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করিতে হয়।

না কাঁদিয়া কথা বলিতে পারা যায় না।

মৃত্যুর কথা পূর্ব্বে বলা; সর্ব্বদা পূর্ব্ব-দৃষ্টি, ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই তৎসম্বন্ধে অতিশয় অনুভূতি।

সামান্য সামান্য বিষয়ে বিরক্তি, দিবাভাগে কোপনতা, রাত্রিতে হৃষ্টতা। অতিশয় অসহিষ্ণুতা; ক্ষণরাগিতা।

উৎকণ্ঠা, স্নায়বীয়তা, অত্যন্ত অনুভূতি; অত্যল্প শব্দে চমকিত হইয়া উঠা।

সময় অত্যন্ত ধীরে ধীরে অবসান হয় (এলুম, আর্জ্জ-না, ক্যান-ইণ্ড)।

অতিশয় ব্যস্ত-সমস্ততা; কোন কিছু করিবার সময় রোগিণীর এতই ব্যস্ত-সমস্ততা যে সে শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

অনেকগুলি লক্ষণ, যখন উহাদের বিষয় চিন্তা করা যায়, তখন বৃদ্ধি পায়। (বেদনার বিষয় ভাবিবামাত্র উহার প্রত্যাবৃত্তি, অক্স-এসি)।

মস্তক।—মস্তিষ্কে দারুণ জ্বালাকর বেদনা, উপমস্তিষ্কে (cerebellum) উহার আতিশয্য; মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত প্রসারণ

মস্তক ভারী বোধ হয় এবং পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হয়।

গাড়ীর কর্কশ শব্দে শিরঃপীড়া ও অতিসার মস্তকে অশিথিলতা ও সঙ্কোচন অনুভব, সমগ্র পৃষ্ঠবংশের অস্থাদি উহার প্রসারণ

গল-মধ্য —যেন তীব্র শর্দি হইয়াছে রোগিণীর এরূপ অনুভব, তৎসহ অস্থিতে যাতনাপ্রদ বেদনা, গ্লাব বেদনা ও স্ফীততা, তরল বা অতরল পদার্থ গিলিতে পারা যায় না (ম্যাক)।

নাসিকার পশ্চাৎ বর্ণ হইতে গাঢ় ধূসর, বা রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইয়া গলার সতত পূর্ণতা (হাইড্রা)

ক্ষুধা —আহারান্তে তৎক্ষণাৎ আবার অতিশয় ক্ষুধা (সিনা লাইকো, সোরি)

অবিরত পিপাসা রোগিণী স্বপ্নেও জলপান করে।

মদিরায় (পূর্ব্বে ঘৃণা সত্বেও) (এসার); লবণে (কার্ব্ব, ন্যাট) মিষ্ট দ্রব্যে (সলফ ; বরফ, অম্ল, কমলালেবু ও কঁচা ফলে, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

অন্ত্র।—চূর্ণচ্ছেদ্য, কর্দ্দমবৎ, ধীরে ধীরে নির্গত মল ; সরলান্ত্র বাহির হইয়া পড়িবে এপ্রকার অনুভব বশতঃ কুন্থন করিতে অসামর্থ্য (এলম)।

গোলার ন্যায় মল সহকারে অন্ত্রের আকুঞ্চন ও নিষ্ক্রিয়তা (ল্যাক)।

কেবল অনেকদূর পশ্চাৎদিকে ঝুঁকিয়া মলত্যাগ করিতে পারা যায়, মল-ত্যাগে বড়ই যাতনা হয়, এত যাতনা হয় যে চক্ষু দিয়া জল পড়ে; বোধ হয় যেন মলদ্বারের মুখাবরক-পেশীর পশ্চাৎদিকের উপরিভাগে একটা পিণ্ড রহিয়াছে।

সরলান্ত্রে তীব্র সূচী-বেধের ন্যায় বেদনা

মলদ্বার হইতে রস-স্রাব, উহার লোণা মৎস্যের রক্তের ন্যায় দুর্গন্ধ (কষ্টি, হেপ)

মূত্র-যন্ত্র —বৃক্ক প্রদেশে উগ্র বেদনা (পৃষ্ঠ বেদনা), অধিক মূত্রস্রাবে উহার উপশম (লাইকো)

বৃক্ক-শূল ; অশ্মরী (calculus) নিঃসরণ অনুভব সহকারে মূত্রবাহী নালীতে দারুণ বেদনা (বার্ব্বি, লাইকো, ও সিম) ; বরফ খাইবার স্পৃহা

রাত্রিতে শয্যা মূত্র —প্রতিদিন রাত্রিকালে শয্যায় এমোনিয়ার

গন্ধবিশিষ্ট লোহিত বর্ণ প্রচুর মূত্র-ত্যাগ, অধিক কাথা বহিলে বা অধিক খেলা করিলে, ও উত্তাপ বা শীতলতার আতিশয্যে উহার বৃদ্ধি; সর্বাপেক্ষা সুনির্বাচিত ঔষধ নিষ্ফল হইলে; এবং সাইকোসিস-দোষের পূর্ব-বৃত্তান্ত থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

মূত্র-ত্যাগ কালে মূত্রাশয় ও অন্ত্রের যন্ত্রণা-পূর্ণ কুন্থন।

জনন-যন্ত্র।—ঋতু।—অতি শীঘ্র, প্রচুর, গাঢ়, রজঃ; রক্তের দাগ সহজে ধুইয়া উঠান যায় না (ম্যাগ কা)।

জরায়ুর রক্তস্রাব।—বিরজ কালে সপ্তাহ পর্যন্ত ঘন সংযত দুর্গন্ধ রক্তের প্রবাহ; নড়িলে চড়িলে হুড় হুড় করিয়া রক্তপাত; তৎসহ জরায়ুর উৎকট রোগ।

দারুণ-রজঃ-শূল, জানুদ্বয় উপরের দিকে আকর্ষণ এবং প্রসব-বেদনার অনুরূপ ভয়ঙ্কর কুন্থন; প্রসব-বেদনার ন্যায় পদদ্বয় কোন অবলম্বে চাপ দিতে হয়।

ভগের ওষ্ঠের ও যোনির দারুণ কণ্ডূয়ন, চিন্তা করিলে উহার বৃদ্ধি প্রাপ্তি। স্তন ও স্তন-বৃন্তে স্পর্শ-দ্বেষ।

(ঋতুকালে) স্তন দ্বয়ের বিশেষতঃ স্তন-বৃন্তের স্পর্শে তুষার সদৃশ শীতলতা, শরীরের অবশিষ্টাংশের উষ্ণতা।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাস-কাস।—এপিগ্লটিসের দুর্বলতা বা আক্ষেপ বশতঃ শ্বাস-রোধ; স্বর-যন্ত্রের এরূপ অবরুদ্ধতা যে উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল মুখের উপর ভর দিয়া শয়ন করিলে এবং জিহ্বা বাহির করিয়া রাখিলে উহার উপশম।

স্বর-যন্ত্রে ক্ষতবৎ স্পর্শ-দ্বেষ।

শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও আকুঞ্চন অনুভব; অনায়াসে নিশ্বাস গ্রহণ করা যায়, কিন্তু প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না (স্যাম্ব)।

কাস।—শুষ্ক, অবিরত উগ্র কাস; যাতনা, বোধ হয় যেন স্বরযন্ত্র হইতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ছিঁড়িয়া গিয়াছে; পিপার মধ্যে কাস দেওয়ার ন্যায় গভীর শূন্য-গর্ভ কাস; রাত্রিতে, মিষ্টদ্রব্য আহারে ও শয়ন করিলে, উহার বৃদ্ধি; আমাশয়ের (stomach) উপর ভর দিয়া শয়ন করিলে উপশম।

নিষ্ঠীবন।—সাওলাল, ফেনিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সবুজ বর্ণ, তিক্ত, গোলার ন্যায় নিষ্ঠীবন; আঠা আঠা কফ, অনায়াসে তুলিয়া ফেলিতে পারা যায় না।

প্রচ্ছন্ন ক্ষয়-রোগ, ফুসফুসের মধ্যখণ্ডে তীব্র বেদনা।

পৃষ্ঠ ও দেহ-শাখা —স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের ব্যবধান স্থলে পৃষ্ঠ বেদনা; সমগ্র মেরুদণ্ডে লম্বালম্বি স্পর্শ-দ্বেষ (চিনি-সল)।

দারুণ জ্বালাকর উত্তাপ, ঘাড়ের পিঠে উহার আরম্ভ এবং মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ, তৎসহ আকুঞ্চন বা স্তব্ধতা, অঙ্গ প্রসারণ করিলে উহার বৃদ্ধি

স্কন্ধের বাহুর শিখর দেশের আমবাত; হাতের আঙ্গুল পর্য্যন্ত বেদনার প্রসারণ, সঞ্চালনে বৃদ্ধি (দক্ষিণ, স্যাঙ্গ বাম, ফির)

কটিদেশীয় কশেরুকায় (l ı bəı v ıtəbıa·) বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ।

ত্রিকাস্থি (sacrum), কোকিল-চঞ্চু-অস্থি (coccyx) এবং বস্তক্ষণ-পৃষ্ঠে (back of hips) বেদনা, চারিদিকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিম্নপর্য্যন্ত উহার সঞ্চরণ

কুচকী হইতে জানু পর্য্যন্ত ও জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা; কেবল হাঁটিবার সময় বেদনা অনুভূত হয়

জঙ্ঘাদ্বয়ের গুরুত্ব, সীসের ন্যায় ভাব বোধ হয়; হাঁটিতে অতিশয় অবসাদ বোধ হয়, জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া আইসে।

নিম্নাঙ্গ সারারাত্রি বেদনা করে, উহাতে নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা জন্মে

জঙ্ঘাদ্বয় ও পদদ্বয়ের অত্যন্ত অস্থিরতা (জিঙ্ক)।

তড়িৎ সম্বলিত ঝড়কালে জঙ্ঘাদ্বয়ে ও বাহুদ্বয়ে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা

জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা, শয্যায় উহা স্থির রাখিতে পারা যায় না, আত্ম-সংযম পরিত্যাগ করিলে ■ নিদ্রা যাইতে শরীর শিথিল করিলে বেদনার বৃদ্ধি।

জঙ্ঘা ও পদের এবং হাত ও বাহুর সম্মুখভাগের শীতলতা।

জঙ্ঘার শিরায় ও পদের গ্রন্থিতে আকর্ষণ ও আকুঞ্চনবৎ অনুভব; জঙ্ঘ পৃষ্ঠ ও পদতলে খল্লী (কুপ)।

হাঁটিবার সময় গুল্‌ফ সহজে ঘুরিয়া যায় (কার্ব্বো-এন, লিড)।

<u>হাত-পায়ের জ্বালা,</u> উহা অনাবৃত রাখিতে ও পাখার বাতাস প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা (ল্যাক, সল)।

জঙ্ঘায় এবং বাহুতে স্নায়ু-শক্তির প্রায় সম্পূর্ণ বিলোপ, অত্যল্প মাত্র প্রয়াসে উহার অবসন্নতা

শরীরের প্রত্যেক সন্ধির বেদনাপূর্ণ শুষ্কতা

হস্তের অঙ্গুলের সন্ধির বিকৃতি; অঙ্গুলীর পর্ব্বের বৃহত্ত্ব ও স্ফীততা, গুড়গুড়াব স্ফীততা ও বেদনাবিশিষ্ট শুষ্কতা, পায়ের গোড়ালীর এবং গোদাবং স্থানের অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ; বায়ু-কোষের ন্যায় সকল সন্ধির স্ফীততা।

উপচয়। রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (হেলন, অক্স-এসি); উত্তাপে, আবরণে; প্রসারণে; ঝড় বজ্রকালে, অত্যল্প মাত্র সঞ্চালনে; মিষ্টদ্রব্য সেবনে; দিবালোক হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত (সিফিল বিপরীত); বৃদ্ধি

উপশম।—সমুদ্রকূলে (ন্যাটের বিপরীত); আমাশয়ের উপর ভর দিয়া শয়নে ও আর্দ্রকালে (কষ্ট, নক্স); হ্রাস

সম্বন্ধ।—(১) ভয় কালে, ইগির সহিত; হিমাঙ্গে, সিকে, ক্যাম্ফ, ট্যাব, ভিরের সহিত; বিচরণে অসমর্থতায়, পিক-এসি, জেলসের সহিত; এবং প্রাতঃকালীন অতিসারে, এলো ও সলফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) সলফরের পদদ্বয়ের জ্বালা এবং জিঙ্কের পদ ও অঙ্গের অস্থিরতা উভয়ই যুগপৎ মেডোরাইনমে পাওয়া যায়

মেনিয়াস্থিস।

(Monyanthes)

সিঙ্কোনা ও কুইনাইনের অপব্যবহার-জনিত রোগে মেনিয়াস্থিস উপযোগী।

শীতাবস্থার প্রাধান্য বিশিষ্ট জ্বর; উদরে ও হাত-পায় দারুণ শীতানুভব (ভিরে)

অনেক আক্রমণের পূর্ব্বে বা সহযোগে, যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে হৃৎপিণ্ডের নিকটে এরূপ উৎকণ্ঠা অনুভব।

শিরঃপীড়া।—ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে মস্তক-শিখরে প্রচাপন, হাত দিয়া শক্ত চাপ দিলে উহার লাঘব (ভিরে); প্রতি পদ-বিক্ষেপে যেন মস্তকের উপর কোন গুরুভার চাপিত হইতেছে এরূপ অনুভব (ক্যাক্টি, মন ল্যাক), উপরে উঠিবার সময় বৃদ্ধি (ক্যাক্ট); সচরাচর শিরো-বেদনার সহিত হাত পায়ের বরফবৎ শীতলতা (কাল্ক, সিপি)।

নাসা-মূলে ; বাহুদ্বয়ে ও হস্তাঙ্গুলীতে ; অস্থিশিথিলতা (tension) ; ত্বকেও আর্তি (tension) অনুভব।

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে বিশ্রামকালে ; শয়ন করিলে বৃদ্ধি।

উপশম।—নড়িলে-চড়িলে ও আক্রান্তস্থানে চাপ দিলে ; হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) ক্যাষ্ট,ক্যাম্ফ জেল, সিপি, ম্যাগ-মি, ও প্যারিসের সহিত তুলনা হয় (২) সেমিয়াম্বিসের পরে ক্যাম্ফ, ল্যাক, লাই, পলস, রুস, ভির, ভাল খাটে

মেলিলোটাস এলবা।

(Melilotus Alba)

রক্ত-সঞ্চয়, রক্তস্রাবে উহার উপশম।

শরীরের কোন অংশের বা যন্ত্রের রক্ত-বহানাড়ীর রক্তপূর্ণতা।

রক্ত-সঞ্চয় জনিত বা স্নায়বীয় প্রবল শিরঃপীড়া, নাক দিয়া রক্ত পড়িলে উহার শান্তি (বিউফো, ফেরি-ফস, ম্যাগ্নে-সল)।

টঙ্কার (convulsions) স্নায়বীয় শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদ-কালে টঙ্কার (বেল) শিশুর আক্ষেপ, প্রসূতিক্ষেপ (eclampsia), অপস্মার (epilepsy)।

প্রগাঢ় আরক্ত মুখমণ্ডলসহকারে ধর্ম-বিষয়ক বিষাদ ; উন্মাদ, প্রথমাবস্থায়, মস্তিষ্কের প্রদাহ ও উপদাহ ও শমনার্থ।

নাসিকা হইতে রক্ত-পাতের পূর্ব্বে মুখমণ্ডলের প্রগাঢ় আরক্ততা ও উদ্দীপ্ততা এবং ক্যারটিড ধমনীর দপদপ (বেল) ; রক্তপড়িলে সত্বরাধীন শান্তি

প্রত্যেক যন্ত্র হইতে রক্ত-পাতের পূর্ব্বে মুখমণ্ডলের অতিশয় আরক্ততা।

কোষ্ঠবদ্ধতা —আয়াসে ও যাতনায় মল-নিঃসরণ, মলদ্বারের আকুঞ্চন ; দপদপ ও পূর্ণতা ; অধিক মল সঞ্চিত না হইলে মল-ত্যাগের ইচ্ছা পরিশূন্যতা (এলম)।

উপচয়। – ঝড়-বৃষ্টির সমাগমে ; বৃষ্টি কালে ও পরিবর্তনশীল ঋতুতে, বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ। (১) শিরঃপীড়ার পর নাসিকা হইতে রক্তপাতে মেলিলোটাসে, উপকার না দর্শিলে, এমল ও এন্টি-ক্রুডের সহিত এবং রক্ত-সঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়ায়, আরক্ত মুখমণ্ডল, উত্তপ্ত মস্তকাদি লক্ষণে বেল, গ্লন ও ব্রায়োর সহিত উহার তুলনা করা যায়।

ম্যাগ্নিশিয়া কার্ব্বনিকা।

(Magnesia Carbonica)

যে সকল ব্যক্তির, বিশেষতঃ বালক-বালিকাদিগের কোপন প্রকৃতি, স্নায়বীয় ধাতু (ক্যাম) ও সমস্ত শরীরের অম্লগন্ধ (রিউম) তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

সমগ্র শরীর, বিশেষতঃ জঙ্ঘা ও পদদ্বয় শ্রান্ত ও ব্যথিত অনুভব।

বিদ্যুৎবৎ স্নায়ু-শূলের বেদনা, বামপার্শ্বে আধিক্য (কলো।—দক্ষিণ পার্শ্বে আধিক্য, ম্যাগ-ফ); বিশ্রামকালে বেদনার অসহ্যতা, উঠিয়া ইতস্ততঃ হাঁটিতে হয়; গর্ভাবস্থায় দন্তবেদনা, রাত্রিতে বৃদ্ধি

মস্তকের শিখরস্থানে চুল টানার ন্যায় বেদনা (কালী-না, ফস)।
প্রতি তৃতীয় সপ্তাহে সমস্ত লক্ষণের উপচয় (ঋতুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভাল বোধ হয়না, কালী-কা)।

ঋতুর পূর্ব্বে গল-ব্যথা (ল্যাক-ক্যান) প্রসববৎ বেদনা, কর্ত্তনবৎ উদর বেদনা, পৃষ্ঠ-বেদনা, দুর্ব্বলতা, শীত কেবল রাত্রিতে বা শয়িত অবস্থায় ঋতু-রক্ত নিঃসরণ, এবং জরায়ুর বেদনা না থাকিলে হাঁটিবার সময় উহার বিরতি (এম-মা, ক্রিয়ো —বিপরীত, লিলি); বিদাহী মলিন আলকাতরার মত, সহজে ধুইয়া ফেলিতে পারা যায়না এরূপ স্রাব।

গুটিকা-ধাতু-বিশিষ্ট পিতামাতার সন্তানসন্ততিদিগের মাংস আহারের অতিশয় আকাঙ্ক্ষা

অতিসার ; মলস্রাবের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ উদর-বেদনা, প্রতি তৃতীয় সপ্তাহে নিয়মিতরূপে উহার উপস্থিতি, ভাঙ্গপড়া পুকুরের জলের মত, সবুজ, ফেণিল মল ; মলে শাদা শাদা চর্ব্বির ন্যায় খণ্ড ভাসমান দৃষ্ট হয়, স্তনপায়ী শিশুদিগের মলের সহিত অজীর্ণ অবস্থায় দুগ্ধ নিঃসরণ।

অতৃপ্তিকর নিদ্রা, ঘুমাইতে যাইবার সময় অপেক্ষা ঘুম হইতে উঠিবার সময় অধিকতর শ্রান্তি অনুভব (ব্রাই, কোনা, হিপ, ওপি, সল্ফ, টিউব)।

উপচয়।—শীতলতায় ; বায়ুপ্রবাহে ; বাতাতপের পরিবর্ত্তনে ; স্পর্শে ; প্রতি তৃতীয় সপ্তাহে ; বিশ্রামে এবং ঋতুকালে দুগ্ধপানে, বৃদ্ধি

উপশম।—উষ্ণ বায়ুতে হ্রাস, কিন্তু শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি (লিড, টিউব।—শয্যার উষ্ণতায় হ্রাস, আর্স)।

সম্বন্ধ।—ক্যামোমিলার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ।

ম্যাগ্নিশিয়া ফসফরিকা।

(Magnosia Phosphorica)

ক্ষীণকায়, শীর্ণ-দেহ, অতিশয় স্নায়ু-প্রধান ; মলিনবর্ণ মুখাকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উত্তম উপযোগী

শরীরের দক্ষিণভাগের রোগ ; মস্তক, কর্ণ, মুখমণ্ডল, বক্ষঃস্থল, ডিম্বাশয়, বস্তিক-স্নায়ু (sciatic nerve) ইত্যাদির পীড়া (বেল, ব্রাই, চেলি, কালি-কা, লাই, পড)

বেদনা।—তীব্র, কর্ত্তনবৎ, খোঁচামারার মত, বিদ্ধবৎ, সূচী-বেধনের ন্যায়, যাতায়াতে বিদ্যুৎ সদৃশ (বেল) ; সবিরাম, আবেশ-কালে বেদনার প্রায় অসহ্যতা বশতঃ রোগীর মনস্থায়ী ক্ষিপ্ততাজনক ; সত্বর অবস্থান পরিবর্ত্তনশীল (ল্যাক, ক্যান, পলস), আকুঞ্চনবৎ অনুভবসংযুক্ত (ক্যাক্ট, আইওড, সল্ফ) ; আমাশয়, উদর ও বস্তি-গহ্বরের (pelvis) পীড়ায় শূলীবৎ (কলো, কোলিন) ; বেদনা

শীতল বায়ুতে; অনাবরণে; আক্রান্ত স্থানের স্পর্শে; শীতল জলে স্নানে বা প্রক্ষালনে; ও সঞ্চালনে, অতিশয় আশঙ্কা।

শ্রান্তি, ক্লান্তি ও অবসন্নতা, উঠিয়া বসিতে অসমর্থ।

শীতল জলে দাঁড়াইয়া থাকা অথবা শীতল কাদা লইয়া কাজ করা বশতঃ অসুখ (ক্যাল্ক)।

দন্তোদ্গম-কালে শিশুদিগের পীড়া, দন্তোদ্ভেদের সময় জ্বরশূন্য আক্ষেপ (জ্বর উত্তপ্ত মস্তক ও মুখ সহ আক্ষেপ, বেল)।

শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে আরম্ভ ও মস্তকোপরি প্রসারণ (সাইলি, সিপি); বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের শিরঃপীড়া; মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও প্রদীপ্ততা, চিত্তবিকার, পরিশ্রম বা কঠিন অধ্যয়ন বশতঃ উহার উৎপত্তি; পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে ১১টা অথবা অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; এবং চাপ ও বাহ্যিক উত্তাপ প্রদানে হ্রাস।

স্নায়ু-শূল।—মুখমণ্ডল, অক্ষি-কোটরের উর্দ্ধ বা নিম্নভাগ ও দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ু-শূল; চিড়িকমারা ও কাটার ন্যায় বেদনা, স্পর্শে, শীতল বায়ুতে ও চাপে উহার বৃদ্ধি, বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে উপশম।

দন্ত-শূল।—রাত্রিতে; শীঘ্র শীঘ্র অবস্থান পরিবর্ত্তনশীল দন্ত-বেদনা; আহারে ও পানে বিশেষতঃ শীতল দ্রব্য পানে উহার বৃদ্ধি; উত্তাপে হ্রাসপ্রাপ্তি (শীতলতায় হ্রাসপ্রাপ্তি, ব্রাই, কফ, ফির-ম্যগ)।

পরিষ্কৃত জিহ্বা সহকারে আমাশয়ের আক্ষেপ বা খল্লী, বোধহয় যেন শরীরের চারিদিকে একটা ফিতা কসিয়া টানা হইতেছে।

উদর-বেদনা।—আধ্মান-শূল, রোগীকে দ্বিভাঁজ হইয়া অবনত হইয়া থাকিতে হয়; উত্তাপ, ঘর্ষণ ও শক্ত চাপ প্রদানে উপশম জন্মে (কলোসি, প্লম্ব) ঘোড়া ও গাভীর বেদনায় কলোসিন্থ বিফল হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে।

ঋতু।—নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে; মলিন বর্ণ, রজ্জুবৎ রক্তস্রাব পূর্ব্বে বেদনার আধিক্য, রক্ত পতিত হইতে আরম্ভ হইলে উহার হ্রাস (ল্যাক, জিঙ্ক); বিদ্যুতের ন্যায় সঞ্চরণশীল তীক্ষ্ণ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে আতিশয্য, উত্তাপে ও অবনত হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে লাঘব; যোনিমুখের আক্ষেপিক অবরোধ।

শয্যা-মূত্র —স্নায়বীয় উপদাহ বশতঃ রাত্রিতে শয্যা-মূত্র ; পাণ্ডুবর্ণ প্রভৃতি মূত্র ; মূত্র-মার্গে শলাকা প্রবেশের পর।

খল্লী —গর্ভাবস্থায় লেখকদিগের, এবং পিয়ানো বা বেহালাবাদক-দিগের। হস্ত পদের খল্লী (খালধরা)।

উপচয় শীতল বায়ুতে, শীতল বায়ু বা শীতল বাতাসের প্রবাহে ; শীতলজলে স্নানে বা প্রক্ষালনে ; সঞ্চলনে ও সংস্পর্শে ; বৃদ্ধি।

উপশম। —অবনত হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে ; উত্তাপে ; উষ্ণতায় ; চাপনে (আংশিক বেদনার উত্তাপে উপশম, আর্স) হ্রাস।

সম্বন্ধ। —(১) বেল, কলো, কলোস, লাইকো, ল্যাক-ক্যান ও পলসের সহিত তুলনা হয় ক্যাম এই ঔষধের উদ্ভিজ্জ সমগুণ। (২) তপ্ত জলে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে কখন কখন ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়া দর্শে।

ম্যাগ্নিশিয়া মিউরিয়েটিকা।

(Magnesia Muriatica)

নারীদিগের রোগে জরায়ু রোগের সহিত সংসৃষ্ট, আক্ষেপিক ও হিষ্টিরিয়া-জনিত পীড়ায়। এবং যে সকল রোগীরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত অগ্নিমান্দ্য কিংবা পিত্ত-প্রকোপের আক্রমণ সহ্য করিয়াছে তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

শিশুগণের আয় সিত দন্তোদগম-কালে <u>দুগ্ধ জীর্ণ করিতে অসমর্থতা ;</u> দুগ্ধ আমাশয়ে বেদনা জন্মায় এবং অপরিপাচিত আকারে নির্গত হয় ; ক্ষুদ্রকায়, রিকেট রোগগ্রস্ত শিশু, মিষ্টদ্রব্য আহারের আকাঙ্ক্ষা।

স্পর্শ-দ্বেষ অনুভব, শব্দ অতিশয় অনুভূতি (ইগ্নে নক্স, থেরে)।

শিরঃপীড়া প্রতি দুই সপ্তাহে এক এক বার উপস্থিতি ; কপালে ও চক্ষুর চারিদিকে বেদনা, বোধ হয় যেন উহা ফাটিয়া পড়িবে ; নড়িলে চড়িলে ও অনাবৃত বায়ুতে বেদনার বৃদ্ধি ; শয়ন করিলে, সবলে চাপ দিলে, ও কাপড় জড়াইয়া উষ্ণ করিলে, হ্রাস (সিলি, ষ্ট্রণ)।

মস্তকের ঘর্ম-নিঃসরণের প্রবণতা (ক্যাল্ক স্যানিক, সাইলি)

মুখ-বিবরে ক্রমাগত শুভ্র ফেণার উৎপত্তি।

দন্ত-বেদনা ; খাদ্য এবং দন্তে লাগিলে উহার অসহ্যতা।

পলাণ্ডুর ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট উদ্গার (খাদ্যে রশুনের গন্ধ, সিপাশ) হাঁটিলে ও স্পর্শ করিলে যকৃতে প্রদাহবৎ বেদনা, যকৃতের দৃঢ়তা ও বিবর্দ্ধন, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি (মার্ক, ক্যালি-ক)

কোষ্ঠবদ্ধতা বৃহৎ, শক্ত ; গর্দ্দভ মেষের বিষ্ঠা সদৃশ, অংশে অংশে নিঃসারিত ; মলদ্বারের প্রান্ত-ভাগে বিখণ্ডিত ; মল (এম-মি, প্লাট-মিউ) দন্তোদ্গম-কালে শিশুদিগের কোষ্ঠ-কাঠিন্য।

অত্যুজ্জ্বল পীতবর্ণ, কেবল উদরের পেশীদ্বারা কুন্থন করিলে নিঃসারিত, মূত্র ; মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা।

ঋতু, প্রতি ঋতু-কালে অতিশয় উত্তেজনা, কৃষ্ণবর্ণ, সংযত রক্ত-প্রবাহ ; ঊরু পর্য্যন্ত প্রসারিত আক্ষেপ ও বেদনা ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, রাত্রিতে শয্যায় উহার বৃদ্ধি, এবং উহাতে হিষ্টিরিয়ার উৎপত্তি (এম্ব্রা, বর্ণো, জ্যাথ)।

প্রদর ; ব্যায়ামান্তে ; প্রতিবার মলত্যাগ-কালে, জরায়ুর আক্ষেপ সহকারে ; স্রাব নিঃসরণ তৎপরে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। ঋতুর দুই সপ্তাহ পরে প্রদরের উপস্থিতি (ব্যারা বোভ)।

পাদ-ঘর্ম্মের অতিশয় প্রবণতা (সিলি, স্যানি)।

–উপবেশন-কালে হৃৎকম্প ও হৃৎপিণ্ডের বেদনা, নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইলে উহার উপশম (জেল তুলনা করুন)।

উপচয়।— রাত্রিতে ; অশ্বারোহণে ; সমুদ্র-স্নানে (অতিশয় দুর্ব্বলতা) ও শীতলতায় ; বৃদ্ধি।

উপশম।—উষ্ণতায় ; শয্যায় ; ও ব্যায়ামে ; হ্রাস।

সম্বন্ধ।— বালক-বালিকাদিগের রোগে ক্যাল্কের সহিত তুলনা হয়।

রসটক্সিকোডেণ্ড্রন।

(Rhustoxicodendron)

আমবাতিক প্রকৃতির (রুমেটিক ডায়েথিসিস) ব্যক্তিদিগের পক্ষে রসটক্সের বিশেষ উপযোগিতা।

এলে ভিজিবার, বিশেষতঃ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইবার পরে ভিজিবার মন্দফল।

কোন অঙ্গ, পেশী বা কণ্ডরা (tendon) মচকাইয়া গেলে (ক্যাল্ক, নক্স ; বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া কোন বস্তু নাগাল পাইতে গেলে ; আর্দ্র মৃত্তিকায় শয়ন করিলে, এবং গ্রীষ্মকালে নদীতে বা হ্রদে স্নান করিলে যে সকল অসুখ উৎপন্ন হয় সেই সকল অসুখ।

শরীরের তন্তুময় বিধানের (fibrous tissue) বিশেষ আক্রান্ততা (রোডো, মস্তস্রাবী বিধান, ব্রাই); বাম ভাগ অপেক্ষা দক্ষিণভাগে আধিক্য।

মচকানবৎ বেদনা, কোন পেশী বা কণ্ডরা যেন উহার সংলগ্ন স্থান হইতে ছিঁড়িয়া গিয়াছে এরূপ বেদনা ; হাড়গুলি যেন ছুরি দিয়া চাঁচা যাইতেছে এপ্রকার বেদনা ; দুইপ্রহর রাত্রির পরে ও বৃষ্টির সময়ে বেদনা বৃদ্ধি পায়, আক্রান্ত স্থান স্পর্শে ব্যথিত বোধ হয়। বিশ্রামের পরে প্রথম নড়িতে-চড়িতে অথবা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার অব্যবহিত পরে খঞ্জতা স্তব্ধতা ও বেদনা, হাঁটিলে বা ক্রমাগত নড়িলে চড়িলে উহার হ্রাস

অতিশয় অস্থিরতা ; উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা (একন আর্স)। শয্যায় থাকিতে পারা যায় না, কোনাব শান্তির জন্য বারবার অবস্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয় (মানসিক উৎকণ্ঠা বশতঃ অস্থিরতা, আর্স) অস্থিরতা, অনেকক্ষণ একভাবে থাকিতে পারা যায় না।

পেশীর বাত, বাম পার্শ্বের গৃধ্রসী (সায়েটিকা) (কলো) ; হৃদ্রোগসহযোগে বাম বাহুতে বেদনা।

অনাবৃত বায়ুতে অতিশয় অনুভূতি ; শয্যা-বস্ত্রের নীচ হইতে হাত বাহির করিলে কাস উদ্রিক্ত হয় (ব্যারা, হিপ)

রাত্রিতে অতিশয় আশঙ্কা ; যেন কেহ বিষ খাওয়াইয়া মারিবে এরূপ ভয় ; শয্যায় থাকিতে পারা যায় না।

শিরঃপীড়া, মন নিয়োগ করিবার বা মাথা নাড়িবার সময় মস্তিষ্ক আলগা বোধ হয়   মস্তকে আন্দোলন অনুভব ; শিরঃপীড়া অত্যন্ত ; বিশেষ অত্যুগ্র বিয়ার পানজন্য উহার উৎপত্তি ; শয্যায় বিশ্রামকালে পর্য্যায়ক্রমে উপবেশনে, শয়নে, ও শীতলতায় বৃদ্ধি ; গাত্র উষ্ণতায় ও সঞ্চালনে উপশম প্রাপ্তি।

পাছাইতে বা হাঁটিবার সময় পিঠে ঘূর্ণন, শয়নে উহার বৃদ্ধি (শয়ন-কালে ক্লান্ত, এপিস , শয়ন হইতে উঠানে আধিক্য, [illegible])

অতি পরিশ্রম, দৌড় খাওয়া, সাঁতার দেওয়া বা আকস্মিক কার্য্যে অতির শ্রম করার দরুণ (আর্ণি)।

মুখের কোণে ক্ষত, মুখের চারিদিকে জ্বর-স্ফোট (জ্বর-ঠুঁঠা) , চিবুকে উদ্ভেদ (হ্যাট)।

গিলিবার সময় স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা   কটিতে বেদনা ও শুদ্ধতা, উপবেশনে বা শয়নে উহার আধিক্য ; সঞ্চালনে ও বা কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়নে উহার হ্রাস

শুষ্ক, আরক্ত, বিদারিত জিহ্বা, ত্রিভুজাকার আরক্ত অগ্রভাগ ; জিহ্বায় দন্তের দাগ পড়ে (চেলি , পড)।

জিহ্বা, মুখ-বিবর ও গল মধ্যের শুষ্কতা সহকারে অতিশয় পিপাসা।

প্রবাহিত, বিগলিত জল-শীতল বাহ্য অনবরত।

টাইফয়েড জ্বরের আরম্ভ সহকারে অতিসার ; অতিশয় অবসন্নতাসহ অনিচ্ছায় বিরেচন ; মলত্যাগ-কালে অঙ্গের পশ্চাদ্ভাগের নিম্নে ছেদনবৎ বেদনা

আক্রান্ত অংশের অবশতাসহ প… [illegible] …তে ; জলে ভিজিয়া বা ভিজা মাটিতে শয়ন করিয়া ; এবং পরিশ্রম প্রসব, অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবা কম্পজ্বর বা টাই… জ্বর হইতে উহার উৎপত্তি ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আংশিক পক্ষাঘাত ; অক্ষি… পক্ষাঘাত।

বিসর্প, বাম হইতে দক্ষিণে বিসর্পণ ; ফোস্কাসংযুক্ততা ; পীতবর্ণ ফোস্কা… অতিশয় স্ফীততা, প্রদাহ , জ্বালা কণ্ডূয়ন হুল-বেধন।

সবিরাম জ্বরে শীতাবস্থার পূর্ব্বে ও তৎকালে শুষ্ক, বিরক্তিকর কাস আস্বাদবিশিষ্ট কাস।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ভৈষজ্য-সুধার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল এবারে পুস্তকখানি লণ্ড [illegible] টিংএর শেষ সংস্করণের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং বিশেষ নামক ঔষধটী নূতন সংযোজিত হইয়াছে। দুরূহ শব্দগুলির পার্শ্বেই তাদের ইংরেজী শব্দ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে; আশা করা যায় ইহাতে ভনব শিক্ষার্থীর যথেষ্ট সাহায্য হইবে

কাগজের মূল্য প্রায় তিনগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, সেইজন্য পুস্তকের মূল্য কিঞ্চিৎ [illegible]ইতে বাধ্য হইলাম আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ আমার সকল ক্রটী ক্ষমা করিয়া স্বর্গীয় পিতৃদেবের এই পুস্তকখানি পূর্ব্ববৎ স্নেহের চক্ষে দেখিবেন। নিবেদন ইতি —

হোমিওপ্যাথি প্রচার কার্য্যালয়।
পাটুয়াটুলী, ঢাকা।
শ্রাবণ, ১৩২৮।

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র।

পৃঃ

তরুণরোগের সন্নিপাতাবস্থা প্রাপ্তি

উপচয়।—ঝড়ের পূর্ব্বে, শীতল, আর্দ্র কালে; রাত্রিতে বিশেষতঃ প্রহর রাত্রির সময় শীতল দ্রব্যে এবং বিশ্রামে; বৃদ্ধি

উপশম।—উষ্ণতায়, উষ্ণ, শুষ্ক কালে, বস্ত্রাবৃত হইলে, উষ্ণ বা উত্তপ্ত দ্রব্যে; সঞ্চলনে; অবস্থান পরিবর্ত্তনে; রুগ্নাঙ্গ সঞ্চালনে; হ্রাস।

রসটক্সের অতি-বিশেষ লক্ষণ এই যে অত্যল্প স্থল ব্যতীত বেদনা বিশ্রামকালে উপস্থিত ও বিবর্দ্ধিত হয় এবং সঞ্চালনে হ্রাস পড়ে। রসটক্স জনিত কণ্ডূয়ন ও জ্বালা অনেক সময় সিপিয়া দ্বারা সত্বর আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়, কয়েক-দিনের মধ্যেই ফোস্কাগুলি শুকাইয়া উঠে।

সম্বন্ধ।—(১) ব্রাইওনিয়ার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) এপিসের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ রসটক্সের পূর্ব্বে বা পরে এপিস ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য (৩) আর্ণ, ব্রাই, রোড, হ্যাট-সল ও সলফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

রাটানহিয়া।

(Ratanhia)

গর্ভের প্রথম কয়েক মাসে ভয়ঙ্কর দন্ত-বেদনা, দন্ত দীর্ঘীভূত বোধ হয়; শয়ন করিলে বেদনা বাড়ে তখন উঠিয়া হাঁটিতে হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা অতিশয় কুন্থন সংযুক্ত কঠিন মল; অর্শ-বলি নিঃসরণ, তৎপরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিরাম বেদনা ও মলদ্বারে জ্বালা (সলফ); অন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা; মলত্যাগের পর মলদ্বারে ও সরলান্ত্রে যেন কাচের চোঁচ ফুটিয়া রহিয়াছে এরূপ বেদনা (থুজা)।

মল-ক্রিয়ার পর নিদারুণ যাতনা; নরম মল ত্যাগের পরও জ্বালা (নাই-এসি)।

মলদ্বারের বিদারণ (fissure), সরলান্ত্রের অতিশয় অনুভূতি।

স্তন্যদায়িনী স্ত্রীদিগের স্তন-বৃন্তের বিদারণ (গ্রাফ সিলি)

সম্বন্ধ।—ক্যাষ্ট কার্ব্ব-এনি, আইরিস, সলফ ও থুজার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ

র‍্যাণঃনকিউলঃস বঃল্বোসঃস।

(Ranunculus Bulbosus)

মদিরাপানের কুফলে যে সকল ঔষধ অত্যন্ত ফলপ্রদ, র‍্যাননকিউলাস তাহার অন্যতম, অ[illegible] হিক্কা; মদাত্যয় (Delirium tremens)

দিবান্ধতা; চক্ষুর সম্মুখে কুজ্ঝটিকা; অক্ষি-গোলকে প্রেচাপন ও যাতনা (ফস)

যে সকল স্ত্রীলোক বসিয়া বসিয়া কাজ করেন তাহাদের স্কন্ধাস্থির প্রান্তভাগে পৈশিক বেদনা, অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা (এগার, ফস); সূচী কার্য্য, টাইপ-লেখা ও পিয়ানো-বাজান হইতে উহার উৎপত্তি (এক্ট)।

বক্ষ-প্রাচীরে স্নায়ু শূল, পেশী শূল; অথবা আঘাত জনিত, সূচীবেধন বা সঙ্কর্ষণবৎ তীব্র বেদনা, আবেশে ও বেগে উহার উপস্থিতি বাতাতপের পরিবর্ত্তনে উহার উদ্রেক বা প্রকাশ, প্রাদাহিক প্রকৃতি পৃষ্ঠবংশের উপদাহ হইতে উৎপত্তি (এগার)

অতিরিক্ত উত্তপ্ত অবস্থায় সহসা শৈত্য লাগিয়া অথবা তদ্বিপরীত কারণে উৎপন্ন প্লুরিসি বা নিউমোনিয়া (একন, ব্রায়)

কড়ায় স্পর্শ-দ্বেষ, যাতনা ও জ্বালা (স্যালিস-এসি)

পঞ্জর-মধ্য পেশীর বাত; বক্ষঃস্থলের স্পর্শ-দ্বেষ ও দুষ্টতা, স্পর্শে, সঞ্চালনে অথবা শরীর ফিরাইলে ঘুরাইলে উহার আধিক্য (ব্রাই), অল্প-কালে ও ঝড়-বৃষ্টির সময় উৎপত্তি (কঃস)।

কটি-দদ্রু; পঞ্জর-মধ্য-পেশীর স্নায়ু-শূলের পূর্ব্বে বা পরে উহার উৎপত্তি (মেজ); স্ফোটগুলির নীলাভ আকৃতিও থাকিতে পারে।

উপচয়।—স্পর্শে, সঞ্চালনে; বাতাতপের পরিবর্ত্তনে, বিশেষতঃ ঝড়-বৃষ্টি কালে (হ্রাস) বৃদ্ধি

সম্বন্ধ।—(১) একন, আর্ণি, ব্রাই, ক্লিম, ইউফর, ও মেজের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) সলফ ও ষ্টাফের সহিত বিষম-গুণ সম্বন্ধ।

রিউম।

(Rheum)

শিশুদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ দন্তোদ্ভেদ-কালে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

সর্ব্ব শরীরের অম্লগন্ধ, শিশুর গাত্র হইতে অম্লগন্ধ নিঃসরণ, প্রক্ষালন বা স্নানান্তেও উহা দূর হয় না (হিপ, ম্যাগ-কা)।

মল-বেগ ও অম্ল-মল সহকারে শিশুদিগের চিৎকার। সারা রাত্রি শিশুদিগের ক্রন্দন ও অবলুণ্ঠন (সোরি)।

শিশুর অধীরতা, বহু বস্তুর আকাঙ্ক্ষা, এবং ক্রন্দন, প্রিয় খেলার দ্রব্যে অপ্রবৃত্তি (সিনা, ষ্টাফে)।

মস্তকের কেশাবৃত অংশের অবিরত প্রভূত ঘর্ম, শিশু নিদ্রিত বা জাগ্রত থাকুক, স্থির বা সঞ্চালিত থাকুক, তাহার চুল সর্ব্বদা ভিজা থাকে, এই ঘর্ম অম্ল বা অনম্ল থাকিতে পারে (ক্যাল, স্যানিকি)

দন্তোদ্গমে কষ্ট; মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ ও মলের অম্লগন্ধ সহকারে শিশুর অস্থিরতা, কোপনতা ও বিরক্তিচিত্ততা।

নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু উহা খাইতে পারা যায় না, বিরাগ জন্মে।

উদর-বেদনা; এক বাহু বা জঙ্ঘা অনাবৃত করিলে তৎক্ষণাৎ উহার আধিক্য; তৎসহ অতিশয় অম্ল মল; দাঁড়াইলে বৃদ্ধি প্রাপ্তি; মল-ত্যাগে অনুপশম।

সম্বন্ধ।—(১) দুগ্ধ অসহ্য হইলে এবং শিশুর গাত্রে অম্লগন্ধ থাকিলে ম্যাগ-কার পরে অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) ক্যাম, কলোস, হিপ, ইপি, ম্যাগ-কা, পড, ষ্ট্যাফ, সল্ফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (৩) মলে অম্লগন্ধ থাকিলে কার্ব্বার্ক সংযুক্ত বা পরিশুদ্ধ ম্যাগনিশিয়ার অপব্যবহারের পরে রিউম দেওয়া যাইতে পারে।

রুমেক্স ক্রিস্পাস।

(Rumex Crispus)

গুটিকা-ধাতুর রোগ, জ্বর ও শৈশিক বিকার অত্যন্ত সংযুক্ত।

বিশুদ্ধ বায়ুতে অত্যন্ত অনুভূতি; সর্বদা; সায়ংকালে উহার আতিশয্য; ঠাণ্ডা লাগিলে আধিক্য, স্বরের অনিশ্চয়তা।

গল-গহ্বরে সুড়সুড়ি, উহাতে শুষ্ক ও কষ্টকর কাসের উদ্ভব।

শুষ্ক, অবিরত শ্বাসজনক কাস — বায়ু বা গৃহের পরিবর্তনে (ফস, স্পঞ্জ); সায়াহ্নে শয়নের পর; চলাফেরা স্পর্শে বা আচ্ছাদনে, বামপার্শ্বে শয়নে (ফস); অত্যন্ত শীতল বায়ু নিশ্বাসে; বৃদ্ধি প্রাপ্তি; বায়ু উষ্ণতর করিবার জন্য শয্যাবস্ত্র দ্বারা মস্তকাবরণ; অত্যল্প নিষ্ঠীবন বা একেবারেই নিষ্ঠীবনের অভাব।

শীতল বায়ুতে অথবা যাহাতে নিশ্বাসিত বায়ুর আয়তন বা ঘনতা বর্দ্ধিত তাহাতে কাসের বৃদ্ধি

গলার মধ্যে পিণ্ডবৎ অনুভব, ঢোক গিলিলে উহার অবতরণ, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার প্রত্যাবৃত্তি।

কাসিবার সময় স্বরযন্ত্রে ও কণ্ঠনালীতে অবদমন অনুভব (কষ্টি)।

কাসিতে কাসিতে অনিচ্ছায় মূত্র-নিঃসরণ (কষ্টি, নেট্রম, সিপি)

প্রত্যুষকালীন অতিসার; পূর্ব্বাহ্ন ৫টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত (এলো, ন্যাট-সল, পড, সল); বেদনাশূন্য, প্রভূত, দুর্গন্ধ মল; সহসা মল-বেগ প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মল-ত্যাগ করিতে যাইতে হয়

ত্বকের নানাস্থানে কণ্ডূয়ন; শীতলতায় উহার বৃদ্ধি, উষ্ণতায় হ্রাস; কাপড় ছাড়িবার সময়, অনাবৃত হইলে অথবা শীতল বায়ু লাগাইলে গাত্র-কণ্ডূয়ন (হিপ, ন্যাট-সল ওলিন)।

উপচয়।—শীতল বা ঠাণ্ডা বায়ুতে শয়নে (হাইও) বৃদ্ধি।

উপশম।—উষ্ণতায়; শীতল বায়ু বর্জ্জনার্থে মুখ-বিবর অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে, হস

সম্বন্ধ।—বেল, কষ্ট, ড্রস, হাইও, ফস ম্যাগ, সলফের সহিত তুলনা করা যায়।

রূটা গ্রেভিওলেন্স।

(Ruta Graveolens)

গণ্ডমালাজনিত অস্থির অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন, অস্থি ও অস্থিবেষ্টের ঘৃষ্টব্রণ ও অন্যান্য উপঘাত; বাত-কণ্টক ([illegible]), অস্থিবেষ্টের প্রদাহ, অস্থি-ভগ্ন (fracture) বিশেষতঃ অস্থির সাম-বিচ্যুতি (সিম্ফাই)

পতন বা আঘাতের পরে যেরূপ হয় সর্ব্ব শরীরে সেইরূপ ঘৃষ্টতা ও খঞ্জতা অনুভব; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ও সন্ধি স্থলে উত্তাপ আধিক্য (আর্ণ)।

শরীরের যে সকল অংশে ভর করিয়া শয়ন করা যায় তাহাতে ঘৃষ্টতার ন্যায় বেদনা (ব্যাপ্ট, পাইরো)।

অস্থিরতা শয়ন কালে পুনঃ পুনঃ অবস্থান-পরিবর্ত্তন (রুস)।

মচ্‌কিয়া যাওয়ার পর, বিশেষতঃ মণিবন্ধ-সন্ধির (wrists) ও গুল্ফ-সন্ধির (ankles) খঞ্জতা (পুরাতন বাতকণ্টক, বোভি, ষ্ট্রণ)।

বক্ষঃস্থলে উপঘাত প্রাপ্তির পরবর্ত্তী যন্ত্রণা (মিলি)

চক্ষুর মধ্যে ও উপরে অবিরাম বেদনা তৎসহ দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা, বোধ হয় যেন চক্ষু অতিরিক্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে, ঘটিকা-নির্ম্মাণে, ভাস্কর কার্য্যে (ন্যাট-মি); একাগ্রভাবে দৃষ্টিপাতে (সেনে) চক্ষু ব্যবহারের পরবর্ত্তী পীড়া

চক্ষুর প্রতি ব্যবহার, মন্দ আলোকে অতিরিক্ত ব্যবহার; সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য, রাত্রিতে অতিরিক্ত অধ্যয়ন প্রভৃতি হইতে দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা বা দুর্ব্বলতা, কুজ্ঝটিকাবৎ ঝাপসা দৃষ্টি, দূরে সম্পূর্ণ অস্পষ্টতা।

চক্ষুর জ্বালা, বেদনা ও অত্যাকৃষ্টতা (strained) অনুভব।

অগ্নির গোলার ন্যায় উত্তপ্ততা ; নীচের অক্ষিপুটের আক্ষেপ

উপঘাত প্রাপ্তির পরবর্ত্তী নিশ্চেষ্টতা, বা সংঘাত বশতঃ কোঁৎ বোধ (আর্ণ)।

মলত্যাগের চেষ্টা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ হাড়িশ বাহির হইয়া পড়া ; যৎসামান্যরূপে মস্তক অবনত করিলে ; প্রসবান্তে ও পুনঃ পুনঃ বিফল মল-বেগের পর উহার উপস্থিতি

মূত্রাশয় যেন সর্ব্বদা পূর্ণ রহিয়াছে উহাতে এরূপ চাপ অনুভব, মূত্রত্যাগের পরেও উহার বিদ্যমানতা ; মূত্র-বেগ উপস্থিত হইলে আর উহা ধারণ করিতে পারা যায় না, ধারণ করিলে পরে মূত্র-ত্যাগ করিতে কষ্ট হয়, স্বল্প, হরিদ্বর্ণ মূত্র ; অনিচ্ছায় মূত্র-নিঃসরণ

আঁচিল ; উহাতে স্পর্শসহ বেদনা, করতলে চেপ্টা, মসৃণ আঁচিল (অ্যাণ্ট-ক্রু, অ্যাণ্ট-মিউ।—কর-পৃষ্ঠে, ডল)।

পৃষ্ঠে ভরদিয়া শয়ন করিলে উপশমিত হয় এরূপ পৃষ্ঠ-বেদনা।

সম্বন্ধ।—(১) আর্ণি, আর্জ্জ-না, কোন, ইউফে, ফাইটো, রুটা ও সিম্ফাইটের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (২) আর্ণিকার পরে সন্ধি স্থলে ; এবং সিম্ফাইটমের পরে অস্থির উপঘাতে রুটা আরোগ্য-প্রক্রিয়ার সহায়তা করে।

রোডোডেণ্ড্রণ।

(Rhododendron)

যে সকল স্নায়বীয় ব্যক্তির ঝড়ের ভয় হয় এবং যাহারা বজ্রাঘাতে বিশিষ্টরূপে ভীত হইয়া থাকে ; ঝড়ের পূর্ব্বে বিশেষতঃ তড়িৎপূর্ণ ঝড়ের পূর্ব্বে যাহাদের অসুখ বৃদ্ধি পায় (অ্যাণ্ট-ক্রু, ফস, সোরি, সাইলি) তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

প্রতি বসন্ত ও শরৎকালে তীব্র পূর্ব্বদিকের বাতাসে দন্ত-বেদনা ; বাতাতপের পরিবর্ত্তনে, ঝড়-বজ্র-কালে, এবং প্রবল বাতাস-কালে উহার আধিক্য।

সন্ধি-স্থানের তরুণ পাদাহিক স্ফীততা; এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে উহার সঞ্চরণ রাত্রিতে উগ্রতা; বিশ্রামকালে এবং ঝড়ের সময় আধিক্য (ক্যালমিয়া)

সকল অঙ্গে আঘাতজনিত আকর্ষণ ও ছেদনবৎ বেদনা, বিশ্রামে এবং আর্দ্র, শীতল, ঝঞ্ঝা-বাত কালে উহার বৃদ্ধি (রুস)

অস্থাবির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনা রাখিলে নিদ্রা যাইতে বা নিদ্রিত থাকিতে পারা যায় না

পদের অঙ্গুষ্ঠ সন্ধিতে আমবাতজনিত তন্তুময় পদার্থের সঞ্চয় সংযুক্ত গাউট, সাধারণতঃ গুচ্ছন ( ) বলিয়া ভ্রম জন্মে (কলচি, লিড)।

প্রমেহ অথবা আমবাত জন্য অণ্ডকোষের স্ফীততা ও দৃঢ়তা (ক্লিম); অণ্ড-প্রদাহ, অণ্ড যেন সংপিষ্ট হইতেছে এরূপ অনুভব (অর, ক্যাম)।

উপচয়।—ঝঞ্ঝা বাত-কালে, আকাশে তড়িৎসংক্রান্ত পরিবর্ত্তনে, ঝড়-বজ্রের আগমনে; বৃদ্ধি। বাতাসের প্রাবল্যে লক্ষণের পুনরুপস্থিতি।

উপশম।—মস্তকে বস্ত্র জড়াইয়া উষ্ণ করিলে; এবং শুষ্ক উত্তাপ প্রয়োগে ও ব্যায়ামে, উপশম

সম্বন্ধ।—ব্রাই, কোন, ক্যাল্ক, লিড, নাইক, স্পি, রুসের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

লরোসিরেসস।

(Laurocerasus)

কপালে বায়ু-প্রবাহ জনিত শীতলতার ন্যায় শীতলতা

গল-নলী ও অন্ত্রের অভ্যন্তরে যাইবার সময় পানীয় দ্রব্যের শব্দ শুনা যায়।

অধিকাংশ রোগের সহিত বেদনা-পরিশূন্যতা (ষ্ট্রাম)।

জীবনী-শক্তির দ্রুত অবসাদন সংযুক্ত রোগ (কাম্ফ, ভিরে)।

প্রতিক্রিয়ার অসদ্ভাব, জীবনী-শক্তির বলের অভাব, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলের রোগে। সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও ক্রিয়া দর্শেনা

অনেকক্ষণস্থায়ী মূর্চ্ছার আবেশ। আহারান্তে ও সন্ধ্যাকালে দুর্দ্দম্য নিদ্রালুতা।

লাইকোপোডিয়ম্।

(Lycopodium)

যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল, শরীরের ঊর্দ্ধাংশ শীর্ণ, নিম্নাংশ অর্দ্ধ-শোথগ্রস্ত; যাহারা পাকাশয় এবং ফুসফুস ও যকৃতের রোগপ্রবণ (ক্যাল্ক ফস, সল), তাহাদের পক্ষে এবং বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে এই ঔষধ সমধিক উপযোগী

গাঢ়-মূল ক্রমশঃ বিবর্দ্ধনশীল, পুরাতন রোগ

প্রধানতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে প্রচাপন ও আকর্ষণবৎ অবিরাম বেদনা, অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত উহার আতিশয্য।

রোগের দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রান্তি, অথবা দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্বে গতি, গল-মধ্য, বক্ষঃস্থল, উদর ও ডিম্বাশয় সকল স্থানের রোগেরই এইরূপ প্রকৃতি।

দুর্ব্বল শীর্ণ শিশু; সুবিকশিত মস্তিষ্ক কিন্তু দুর্ব্বল রুগ্ন শরীর

শিশু সারাদিন কাঁদে সারারাত্রি ঘুমায় (জ্যালাপ ও সোরিন বিপরীত)।

ভয়, ক্রোধ, দুঃখ কিংবা সগুপ্ত অসন্তুষ্টি সংযুক্ত বৈরক্তি জনিত অসুখ (ষ্টাফ)।

লোভী, ঔদরিক, কৃপণ, দ্বেষী ভীরু স্বভাব রোগী

কোপনতা, নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে খিটখিটতা ও বিরক্তচিত্ততা, কুৎসিতত্তা, পদাঘাত করা ও চিৎকার করা; সহজে ক্রোধের উদ্রেক হয়, প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না বিবাদ-প্রবৃত্তি উগ্রতা

সমস্ত দিন অশ্রুপাত, রোগিণী আপনাকে সুস্থির করিতে পারেনা অতিশয় অনুভূতি, ধন্যবাদ দিলেও ক্রন্দন

মনুষ্য-ভীতি; নির্জ্জনতার ভয়; একাকী থাকিতে ভয় (লিলি, বিস, কালী-কা)।

পাণ্ডুর, মলিন, অসুস্থ মুখাকৃতি; নাসা-পার্শ্বের পাখার ন্যায় সঞ্চালন (এণ্ট-টার্ট দ্রষ্টব্য); রোগীকে বয়ঃক্রম অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধ দেখায়

প্রতিশ্যায়। শুষ্ক প্রতিশ্যায়, রাত্রিতে নাসিকার অবরুদ্ধতা, মুখদিয়া শ্বাস-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয় (এম-কা, নক্স, স্যাম্ব); অবরুদ্ধ নাসিকাদ্বারা কষ্টে সশব্দে শ্বাসক্রিয়া নাসিকা, নাসামূল ও তৎসম্মুখবর্ত্তী গহ্বর ঘর্ষণ করিতে করিতে শিশুর নিদ্রা হইতে চমকিত হইয়া উঠা, নাসা-রন্ধ্রে চিপিটিকা (কালী-বাই, টিউক)

ডিপথিরিয়া; গল-গহ্বরের ঈষৎ কপিশমিশ্রিত লোহিত বর্ণ, কৃত্রিম ঝিল্লির বামদিক হইতে দক্ষিণ তালু মূলে প্রসারণ, অথবা নাসিকা হইতে দক্ষিণ তালু-মূলে অবতরণ, নিদ্রান্তে ও শীতল পানীয় দ্রব্য পানে আধিক্য (উষ্ণদ্রব্য পানে আধিক্য, ল্যাক)।

সকল বস্তুরই অম্লাস্বাদ; উদ্গার, বুকজ্বালা মুখে জল-উঠা, অম্ল বমন (জ্বরের শীত ও উত্তাপাবস্থার মধ্যে)

কুক্কুরবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা; রোগী যতই খায় ততই খাইতে চায়; না খাইলে মাথা বেদনা করে।

আমাশয়িক রোগ;—অতিশয় বায়ু-সঞ্চয়, সর্ব্বদা পরিতৃপ্তি অনুভব; উত্তম ক্ষুধা, কিন্তু কয়েক গ্রাস আহার করিবামাত্র কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণতানুভব, (উদ্গারে পূর্ণতার হ্রাস না হইলে, সিঙ্ক) রোগীর উদর স্ফীত বোধ হয় ও পেট ডাকে নিম্ন উদরই বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয় (ঊর্দ্ধ উদর কার্ব্বো-ভে সমগ্র উদর সিন)

বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে; শেষ প্রসব কাল হইতে ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেলে কোষ্ঠবদ্ধতা শিশুদিগের কোষ্ঠ-কাঠিন্য; বিফল মল ও বৃত্তি, মলত্যাগ-কালে মলদ্বারের আকুঞ্চন ও বহির্গমন ও অর্শের বিকাশ

মূত্রে লোহিত রেণু; শিশুর শয্যাবস্ত্রে লোহিত রেণু (ফস); প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে শিশুর ক্রন্দন (বোরা); মূত্রত্যাগে পৃষ্ঠ-বেদনার শান্তি।

কৃত্রিম-মৈথুন ও অতি-মৈথুন বশতঃ যুবকদিগের ধ্বজভঙ্গ, উপস্থের ক্ষুদ্রতা, শীতলতা ও শিথিলতা; বৃদ্ধদিগের প্রবল লিপ্সা কিন্তু উপস্থের অসম্যক্ উত্থিতি; মৈথুন-কালে নিদ্রিত হইয়া পড়া; অকালে শুক্রনিঃসরণ।

যোনির শুষ্কতা ; মৈথুন-কালে ও তৎপরে উহাতে জ্বালা (লাইস) ; জরায়ুর বাতাধান ; তজ্জন্য মৈথুনের প্রতিবন্ধকতা।

প্রতিবার মলত্যাগ কালে জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তপাত।

ভ্রূণের পা উপরে উত্থিত হইয়া উল্লম্ফনবৎ গতি জন্মাইতেছে গর্ভিণীর এরূপ অনুভব।

দক্ষিণদিগের অন্ত্র-বৃদ্ধি (hernia), অনেকগুলি রোগী, বিশেষতঃ বালক-বালিকা এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

উপেক্ষিত বা কুচিকিৎসিত ফুসফুস-প্রদাহ (Pneu monia), দক্ষিণ ফুসফুসের ভূমিদেশের সবিশেষ আক্রান্ততা ; [আশোষণ (a bsorption) বা নিষ্ঠীবন প্রবর্দ্ধনার্থে]।

গভীর, শূন্য-গর্ভ (ফাঁপা) কাস, অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠিলেও শান্তি জন্মেনা।

এক পা উত্তপ্ত, অন্য পা শীতল (সিক, ডিজি, ইপি)।

রাত্রিতে ক্ষুধা অনুভব করিয়া নিদ্রা হইতে জাগরণ (সিনা, সোরি)।

উপচয়।—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮টা ; আহারের পরে ; শীতল আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্য সেবনে ; ঝিনুক ও লবণাক্ত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণে, বৃদ্ধি।

উপশম।—শীতল হইলে ; মস্তক অনাবৃত করিলে, উষ্ণ আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্য সেবনে, ও পরিধেয় বস্ত্র শিথিল করিয়া দিলে ; হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) আইওডিনের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) ক্যাল্ক, কার্বো-ভে, ল্যাক, সলফের পর লাইকো ভাল খাটে। (৩) লাইকোর ক্রিয়া গভীর মূল ও দীর্ঘস্থায়ী। এই ঔষধে উপকার দর্শিতে আরম্ভ করিলে ইহার পুনঃ প্রয়োগ বিহিত নহে (৪) সুস্পষ্ট সাদৃশ্য না থাকিলে পুরাতন রোগের চিকিৎসার প্রারম্ভে লাইকো ব্যবহার করা পরামর্শসিদ্ধ নহে ; প্রথমে অন্য কোন সোরা-দোষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করাই ভাল। (৫) পলাণ্ডু ; রুটী ; মদিরা, তাম্রকূটের ধূমপান বা না দোক্তা খাওয়ার মন্দ ফল (আগ) ; লাইকো দ্বারা নিবারিত হয়।

লাইসীন।

(Lyssin)

জল-ঢালা বা প্রবাহিত জল দেখিলে বা উহার শব্দ শুনিলে সমুদয় পীড়ার উপচয়।

জলাতঙ্ক-রোগ বা উন্মত্ত কুক্কুরের দংশনের আতঙ্ক; উন্মাদ জন্মিবার আশঙ্কা।

সদ্য-ব্রণের (wound) ঈষৎ নীল বিবর্ণ (ল্যাক)।

অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি জনিত পীড়া (নিবৃত্তি জনিত—কোনা)।

মনোভাব বা বিরক্তিজনক সংবাদে রোগীর সর্ব্বদা মন্দাবস্থা প্রাপ্তি।

সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারা যায়না (জেল, গ্লন, ল্যাক; ন্যাট)।

টঙ্কার। অত্যুজ্জ্বল বা প্রতিক্ষিপ্ত (reflected) আলোক ও জল বা দর্পণ দর্শনে (ষ্ট্রাম), কোন প্রকার তরল পদার্থের বিষয় চিন্তা করিলে, এবং অত্যল্প স্পর্শে বা বায়ু-প্রবাহে; আক্ষেপের উৎপত্তি।

শিরঃপীড়া।—উন্মত্ত ও অনুন্মত্ত কুকুরের দংশন বশতঃ শিরঃপীড়া; মনোবিকার বা মানসিক পরিশ্রম জনিত পুরাতন শিরঃপীড়া; প্রবাহিত জলের শব্দে অথবা উজ্জ্বল আলোকে উহার বৃদ্ধি।

মুখে ও গলায় দুশ্ছেদ্য, রজ্জুবৎ আঠা-আঠা, ফেনিল লাল, অবিরত থুথু-ফেলা (হাইড্রা)

গলা-বেদনা, সতত গলাধঃকরণের ইচ্ছা (ল্যাক-ক্যান, মার্ক)।

গিলিতে কষ্ট, এমন কি তরল পদার্থ গিলিতে গল-নলীর আক্ষেপ; জল গিলিতে মুখ-রোধ।

প্রবাহিত জল দর্শনে অবিরত মূত্র-প্রবৃত্তি (ক্যান্থ, সলফ); চিনিসংযুক্ত, স্বল্প আবিল মূত্র।

কন্দ (জরায়ুর স্থান বিচ্যুতি); বহু বৎসরের অনেক রোগিণীর আরোগ্যলাভ।

অপত্য-পথের অতিশয় অনুভূতি, তজ্জন্য রমণ-ক্রিয়ার যাতনা।

উপচয় —জলের দর্শন বা শব্দ ; উজ্জ্বল পদার্থ আলোক (ষ্ট্রাম) ; ও শকটারোহণে বৃদ্ধি (কক ।—শকটারোহণে হ্রাস নাইট্রাম)।

সম্বন্ধ —হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগে, বেল, ষ্ট্রাম, হাইও, ষ্ট্রামোর সহিত লাইসীনের তুলনা হয়।

লিডাম।

(Lodum)

আমবাত ও গ্রন্থি-বাত প্রকৃতিতে ; এবং উগ্র মদিরা অপব্যবহৃত শরীরের এই ঔষধ উপযোগী (কলচি)।

আইরিসের (উপতারা) শস্ত্রোপচারের পর চক্ষুর সম্মুখের কক্ষে (anterior chamber) রক্তস্রাব।

চক্ষু ও চক্ষুর পাতার মুষ্টিবৎ বিশেষতঃ উপরিকে ও বিকৃত-রক্ত সঞ্চয় ; অক্ষি-পল্লব ও শুক্লমণ্ডলের (conjunctiva) কালিমা

আমবাত ও আমবাত জনিত গ্রন্থিবাতে, নিম্নাঙ্গে উহার আরম্ভ ও উপরের দিকে উত্থিত (নীচের দিকে নামন, ক্যালমিয়া) ; বিশেষতঃ কলচিকমের অপব্যবহার বশতঃ নিস্তেজ অবস্থায় পরিণতি, সন্ধিস্থানে বেদনাযুক্ত অর্ব্বুদ বা চূর্ণময় পদার্থের সঞ্চয় ; তরুণ ও পুরাতন সন্ধি-বাত।

বাম স্কন্ধ ও দক্ষিণ বস্তি-সন্ধির আক্রান্তি (ফেরাম এন্ট-টার্ট, ষ্ট্রাম)।

আক্রান্ত স্থানের শীর্ণতা প্রাপ্তি (গ্রাফ)।

তোদন, ছেদন, ও দপদপবৎ বেদনা ; নড়িলে চড়িলে সন্ধির বেদনার আতিশয্য ; রাত্রিতে শয্যা ও শয্যাবস্ত্রের উষ্ণতায় আধিক্য (মার্ক) ; কেবল বরফের জলে পা রাখিলে উহার উপশম (সিকে)।

যাহারা সকল সময়েই শীতল থাকে তাহাদের অসুখ ; সর্ব্বদা শীতল ও শীত অনুভব ; স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপের অভাব (সিপি), আহতস্থান স্পর্শে সবিশেষ শীতল।

শরীরাংশ অপরের স্পর্শে শীতল, কিন্তু রোগী উহা শীতল অনুভব করেনা।

কোন কোন রোগে অঙ্গে উত্তাপ ও জ্বালা জন্মে বলিয়া শয্যার উষ্ণতা অসহ্য হয়

জানু পর্য্যন্ত পদদ্বয়ের স্ফীততা। মচকিয়া যাওয়ার মত অসহ্য বেদনা সহকারে গুল্‌ফের স্ফীততা ; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির স্ফীততা ও ব্যথিততা ; পায়ের গুড়গুড়ার মুষ্টিবৎ স্ফীততা

পদ ও গুল্‌ফের দারুণ কণ্ডুয়ন, কণ্ডুয়ন করিলে ও শয্যার উষ্ণতায় উহার বৃদ্ধি (পল, রস)।

সহজে গুল্‌ফ ও পা মচকিয়া যাওয়া (কার্ব্বো-এ)।

শুষ্কাগ্র অঙ্গ, মূষিক-দংশন (হাইপার); প্রেক, কীটের হুল-বেধ, বিশেষতঃ মশক-দংশন জনিত বিদ্ধব্রণ

ব্রাণ্ডিপায়ীদিগের ন্যায় কপালে ও গালে লাল লাল পীড়কা বা গুটিকা, স্পর্শ করিলে উহাতে চিট্‌ মিট্‌ করা।

উপঘাতের পর দীর্ঘকালস্থায়ী বিবর্ণ ; কৃষ্ণ ও নীলবর্ণ স্থান হরিদ্বর্ণ হয়।

উপচয়।—উত্তাপে বৃদ্ধি ; শয্যার উত্তাপ সহ্য করিতে পারা যায় না ; মধ্য-রাত্রিকালে উহা অসহ্য হইয়া উঠে, তজ্জন্য শয্যায় গাত্র-বস্ত্র ফেলিয়া দিতে হয় (সিলিস বিপরীত)। সন্ধিস্থল নাড়িলে চাড়িলে ; পা ফস্কিয়া গেলে ; ও মদিরাপানে ; বৃদ্ধি।

উপশম —গাত্র-সংলগ্নে চলে রাত্রিকালে সন্ধি-স্থানের গ্রন্থি-বাতজ চূর্ণময় অর্ব্বুদের ভয়ানক জ্বালার শান্তি।

সম্বন্ধ।—উপঘাতের দীর্ঘকালস্থায়ী ফলে কোনায়মের সহিত ; এবং অভিঘাত্ত, আর্ণ, ক্রোট, হেমে বেলিস ও রুটার সহিত লিডমের তুলনা হয়

লিলিয়ম টাইগ্রিণম।

(Lilium Tigrinum

প্রধানতঃ বামপার্শ্বের আক্রান্তি (ল্যাক, থুজা)।

ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয়ের পীড়া সহকারে রোগিণীর মুক্তিসংক্রান্ত যাতনা (লাইং, নল, ভিরে), সান্ত্বনা প্রদানে উহার আতিশয্য

মাথার চাঁদিতে উন্মত্তবৎ অনুভব ; মনোভাবের গোলযোগ।

চিত্তের গভীর অবসাদ ; অশ্রুপাত নিবারণ করিতে পারা যায় না ; অতিশয় ভীরুতা, ভয়পূর্ণতা, ও অধিক অশ্রুস্রাবিতা ; রোগিণীর জন্য যাহা করা যায় তাহাতে ঔদাস্য।

রোগসম্বন্ধে উৎকণ্ঠা লক্ষণগুলি সাংঘিক রোগজ্ঞাপক বলিয়া আশঙ্কা করা ; স্ত্রী-পুরুষ উভয় প্রকার রোগীতেই এই লক্ষণের সুস্পষ্টতা

জরায়ুর উপদাহের সহিত পর্য্যায়ক্রমে অভিসম্পাত, আঘাত ও কুৎসিত চিন্তা করিবার (এনাক, ষ্ট্যাফ-ক্যান) প্রবৃত্তি

উদাসীনতা, অথচ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারা যায়না ; অস্থিরতা, অথচ হাঁটিতে ইচ্ছা হয়না, কাম-প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিবার জন্য কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিতে।

কিছু করিতে ইচ্ছা, ব্যস্ত-সমস্ত ভাব অথচ উদ্দেশ্যহীনতা ; লক্ষ্য-শূন্য দ্রুতগতি (আর্জ্জ-না)

ভয় —একাকী থাকিতে ভয়, উন্মাদ, ও আরোগ্য অনিবার্য্য হয় ; রোগ আরোগ্য পাইবে না বলিয়া আশঙ্কা, আসন্ন বিপদ বা রোগের আশঙ্কা।

জরায়ুর উপদাহ অথবা স্থান-চ্যুতি জনিত শিরোবেদনা বা মানসিক রোগ মনোবৈলক্ষণ্য ও হৃৎপিণ্ডের উপদাহিতা।

অসমান ভূমিতে হাঁটিতে অপারগতা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা ; সতত উহার স্থানপরিবর্ত্তন (কালী-বাই)।

বারবার মূত্র-বেগ ; মূত্র-ধারণা করিলে বস্তিস্থলে রক্ত-সঞ্চয় অনুভব।

উদরে ও বস্তি-কোটরে কুন্থনবৎ আবেগ অনুভব (বোধ হয় যেন

সমস্ত যন্ত্র বাহির হইয়া পড়িবে (ল্যাক-ক্যান, মিউরেক্স, সিপি); ভগ-দেশ হাত দিয়া উচ্চ করিয়া রাখিলে উপশম ; তৎসহ হৃৎকম্প।

ঋতু।—যথাকালের পূর্ব্বে স্বল্প, মলিন, দুর্গন্ধ রজঃ; কেবল নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইবার সময় উহা নিঃসৃত হয়; বিচরণে বিরত হইলে রজ নিঃসরণেরও বিরতি জন্মে (কষ্ট।—শয়নে বিরতি, ক্রিয়োজ, ম্যাগ-কা)।

হৃৎপিণ্ড যেন পাক সাঁড়াসি দ্বারা চাপিয়া ধরা হইয়াছে এপ্রকার অনুভব (ক্যাক্ট); বোধ হয় যেন সমস্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে গিয়াছে ; উহা বিদীর্ণ হইবার ন্যায় পূর্ণ বোধ হয়, সোজা হইয়া হাঁটিতে পারা যায়না।

সমগ্র শরীরে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব, রক্ত-বহা নাড়ীগুলি ফাটিয়া যেন রক্ত পড়িবে উহাদের এরূপ ভোগারিতা অনুভব (ইস্কিউ)।

হৃৎকম্প, বিশেষ।—হৃদগ্রের (apex) নিকটে শান্তি, ক্লান্ততা, ও উৎকণ্ঠা অনুভব ; বাম বক্ষে তীব্র বেদনা ; রাত্রিতে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইতে হয় ; নাড়ীর অনিয়মিত গতি ; হাত-পা শীতল ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত, আহারের পরে, ও যে কোন পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি (বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, ল্যাক)।

হৃৎপিণ্ডের দ্রুতস্পন্দন, প্রতি মিনিটে ১৫০ হইতে ১৭০ বার স্পন্দন।

সরলান্ত্রে চাপবশতঃ (কন্দসহযোগে) অবিরত মল ও মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা।

ডিম্বাশয়, গর্ভাশয় ও পেলভিসের বিধান-তন্তুর দুর্ব্বল অবস্থা, উহা হইতে জরায়ুর সম্মুখাবর্ত্তন, বিপরীতাবর্ত্তন ও অসম্যক সঙ্কোচন (হেলন, সিপি); প্রসবের পর ধীরে ধীরে আরোগ্য প্রাপ্তি, তৎসহ প্রায় সর্ব্বদাই সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা বশতঃ মল-কৃচ্ছু।

সম্বন্ধ।—এক্ট, এগার, ক্যাক্ট, হেলন, মিউরেক্স, ন্যাট-ফস গ্রাট, সিপি, স্পাজ, ও টারার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

ব্যবহার না করা; শব্দের শেষ অক্ষর বা অক্ষরগুলি ফেলিয়া যাওয়া; পাঠ বা অধ্যয়ন করিতে মনোনিবেশ করিতে না পারা; অতিশয় স্নায়বীয়তা (বোভ, গ্রাফ, ল্যাক, স্কাট-কা, সিপি)

নৈরাশ্য। রোগিণী মনে করে যে তাহার রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হইবে না; তাহার কোন আত্মীয়-স্বজন জীবিত নাই; তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই যে কোন মুহূর্ত্তে সে অশ্রুপাত করিতে পারে (এষ্ট, অরু, ক্যাল্ক, ল্যাক)

কোপনতা, খিটখিটে স্বভাব; শিশু সকল সময়েই, বিশেষতঃ রাত্রিতে ক্রন্দন ও চিৎকার করে (জ্যালা, নক্স, সোরি)

একাকী থাকিতে ভয় (কালী-কা); মৃত্যু-ভয় (আর্স); উন্মাদ হইবার আশঙ্কা (লিলি); নীচের তলায় পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা (বোরা)।

পুরাতন "নীলবর্ণ" অবস্থা ("ব্লু" কণ্ডিশন); প্রত্যেক বস্তু এত কৃষ্ণবর্ণ দেখায় যে উহা হইতে আর অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে না (লাই, পল্স)।

যৎসামান্য উত্তেজনায় ক্রোধের, অভিশাপের ও শপথের আবেশ (লিলি, নাই-এসি), দারুণ কুৎসিততা; ঘৃণাপূর্ণতা

গাঢ়, শুভ্র শ্লেষ্মা নিঃসরণ সহকারে মস্তকের প্রতিশ্যায়।

এক নাসা-রন্ধ্রের অবরুদ্ধতা, অন্য নাসা-রন্ধ্রের বিমুক্ততা ও স্রাব-নিঃসরণ; এই অবস্থার পর্য্যায়শীলতা; স্রাবের বিদাহিতা, নাসিকা ও ওষ্ঠের অবদরণ (এরম, সেপা)।

ডিপথিরিয়া ও টন্সিলাইটিস, এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে লক্ষণের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন।

ঋতু সহকারে গলব্যথা ও কাশের আরম্ভ ও শেষ। গলায় শ্বেত বা পীতবর্ণ তালীর (patches) মত স্থান। বেদনার কর্ণপর্য্যন্ত সঞ্চরণ।

গল-মধ্য।—বহির্দ্দিকে স্পর্শ-দ্বেষ (ল্যাক); খালি ঢোক গিলিলে উহার বৃদ্ধি (ইগ্নে); অবিরত গলাধঃকরণের প্রবৃত্তি, উহাতে ব্যথিততা, প্রায় অসাধ্যতা (মার্ক); বেদনার কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারণ (হিপ, কালী-বাই); বাম পার্শ্বে আরম্ভ (ল্যাক)।

ডিপথিরিয়ার সদৃশ পদার্থের (deposit), উপদংশের ক্ষতের উজ্জ্বল, চিক্কণ আকৃতি।

অতি ক্ষুধা, কিছুতেই ক্ষুধার পরিতৃপ্তি জন্মে না; আহারের পূর্ব্বেও যেমন ক্ষুধা পরেও তদ্রূপ ক্ষুধা (ক্যাল্ক, ক্যাল্ক, সিনা, লাই, ষ্ট্রন)

উদরোর্দ্ধদেশে নিমগ্নতা। আমাশয়ে দুর্ব্বলতা।

ঋতু —নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে; অতি প্রভূত পরিমাণে; প্রবল প্রবাহে, উজ্জ্বল লোহিত, আঠা আঠা, বড় বড় রক্ত-নিঃসরণ (মলিন, কাল, রক্ত বড় বড় চাপ, কোক) স্তনদ্বয়ের স্ফীততা, ব্যথিততা, এবং ঋতুর পূর্ব্বে ও তৎকালে অতিশয় অনুভূতি (কোনা)।

অপত্য-পথ (vagina) হইতে বায়ু নিঃসরণ (ব্রোম, লাই, নক্স-ম, স্যাঙ্গ)

স্তন —স্তনের প্রদাহ ও বেদনা, অত্যল্প সংঘর্ষে ও শয্যার ঝাঁকানিতে উহার বৃদ্ধি; সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে বা নামিতে স্তনদ্বয় দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে হয় (ব্রাই)।

স্তন-দুগ্ধ শুকাইয়া ফেলিবার জন্য প্রায় সকল রোগিণীর পক্ষেই এই ঔষধ উপকারী (এসাফ – স্তন-দুগ্ধের পুনরুৎপত্তি বা বিবৰ্দ্ধনার্থে, ল্যাক-ডি)

শয়নে শ্বাস-রোধ হইবে রোগিণীর এরূপ অনুভব; সে জন্য তাহাকে উঠিয়া হাঁটিতে হয় (নস-কা, গ্রিণ্ড, ল্যাক)।

কোন অপরিজ্ঞাত কারণে স্তন্যদান-কালে দুগ্ধের বিলোপ (এসাফ)

বাম পার্শ্বে শয়নে হৃৎকম্পের প্রাবল্য, দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিলে লাঘব (ট্যাব)।

স্পর্শে, উপবেশন-কালে প্রচাপনে, অথবা হাঁটিবার সময় ঘর্ষণ লাগিয়া সহজে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা (সিনে, কফ, মিউর, প্লাট)।

হাঁটিবার সময় বোধ হয় যেন শূন্যে হাঁটা যাইতেছে, শয়ন সময়ে বোধ হয় যেন শয্যা স্পর্শ করা যাইতেছে না (এসার)

পৃষ্ঠ-বেদনা।—নিদারুণ, অসহ, ত্রিকাস্থি প্রদেশের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত, দক্ষিণ নিতম্ব হইতে দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ-স্নায়ু পর্য্যন্ত প্রসারিত; বিশ্রামে ও বিশ্রামান্তে প্রথম সঞ্চালনে বিবর্দ্ধিত; পৃষ্ঠ-বেদনা (রুস); মস্তিষ্কের ভূমিদেশ হইতে কোকিলচঞ্চু-অস্থি পর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশের অবিরাম বেদনা, স্পর্শে বা প্রচাপনে উহাতে অতিশয় অনুভূতি (চিন-সল, ফস, জিঙ্ক)

সম্বন্ধ।—(১) এপিস, কোনা, মিউরেক্স, ল্যাক, কালী-থাই পলস, সিপি, সলফের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (২) সাধারণতঃ এক মাত্রায়ই এই ঔষধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়া দর্শে। (৩) ল্যাক-ক্যানের গলক্ষতগুলির সদৃশ ঔষধ সম্ভবতঃ ভৈষজ্য-তত্ত্বে আর নাই। (৪) বর্ত্তমান সময়ে রেইসিগ, বেয়াড, সোয়ান প্রভৃতি আমেরিক চিকিৎসকগণ ডিপথিরিয়ায় ইহার উপকারিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন

ল্যাক ডি ফ্লোরেটংম।

(Lac de floratum)

ডনকিন মথিত দুগ্ধ দ্বারা ডায়াবিটিস (বহুমূত্র, ও ব্রাইটস্ ডিজিজ রোগের চিকিৎসা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই আভাস প্রাপ্ত হইয়া ডাঃ সোয়ান উহা হোমিওপ্যাথিক শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে উহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন এস্থলে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা গেল ইহার সকলগুলিই রোগীর আরোগ্যে সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে।

স্নায়ু-কেন্দ্রের প্রতিক্ষিপ্ত পীড়া (reflex affections) সহকারে পরিপোষণের দোষ ও ত্রুটি-বিশিষ্ট রোগ।

নৈরাশ্য; বাঁচিয়া থাকিতে যত্নশূন্যতা, মৃত্যুর ভয় নাই। শীঘ্র মরিতে যাইতেছে বলিয়া নিশ্চিত ধারণা।

আমেরিকার সবমন শিরঃপীড়া।—প্রাতে উঠিবার পর কপালে শিরঃপীড়ার আরম্ভ, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত প্রসারণ (ক্রাই), দারুণ দপদপ, বিবমিষা, বমন, অন্ধতা ও দুর্দ্দম্য কোষ্ঠ-রোধ (ইপিক্লিয়া, আইরিস, স্যাঙ্গ); গোলমাল, আলোক ও সঞ্চালনে (ম্যাগ-মি, সিলি); এবং ঋতু-কালে (ক্রিয়োজ, সিপি) বৃদ্ধি; অতিশয় অবসন্নতা, প্রচাপনে, ও কষিয়া মাথা বাঁধিলে (আর্জ্জ-না, পলস) হ্রাস; বর্ণশূন্য প্রভূত মূত্র।

গ্লোবাস হিষ্টেরিকাস (গুল্ম-বায়ু-গোলক)।—আমাশয় হইতে গলায় যেন একটা বড় গোলা উঠিতেছে এরূপ অনুভব, এবং উহাতে শ্বাস-রোধের উৎপত্তি (এসাফ, ক্যালমিয়া)।

বমন —নিরন্তর বমন, আহারের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই ; প্রথমে অপরিপাচিত, অতঃপর ভুক্তদ্রব্য, অনন্তর তিক্ত জল বমন , গর্ভাবস্থা'র বমন (ল্যাক-এসি, লোবি)

কোষ্ঠবদ্ধতা নিষ্ফল মল-বেগ (ন্যাক, নক্স), শুষ্ক ও শক্ত বিষ্ঠা (ব্রাই, ওপি) ; বৃহৎ, শক্ত মল, অতিশয় কুন্থন, উহাতে মলদ্বারের বিদারণ ; ক্রন্দনজনক যাতনা। (একজন স্ত্রীলোকের কোষ্ঠবদ্ধ রোগ ছিল, প্রত্যহ দশবার পিচকারী লইতে হইত, চারি পাঁচ সপ্তাহ পর্য্যন্ত একেবারেই মল-ত্যাগ হইত না, পনর বৎসর যাবৎ এই রোগ ছিল, অবশেষে এই ঔষধে আরোগ্য জন্মিয়াছিল)

ঋতু—বিলম্বিত ঋতু , শীতল জলে হাত রাখাতে ঋতু-বিলোপ (কোনা), ঋতু-কালে এক গ্লাস দুগ্ধ পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরবর্ত্তী ঋতু-কাল পর্য্যন্ত রজঃস্রাবের বিলুপ্তি (ফস তুলনা করুন)।

অতিশয় অস্থিরতা, নিদ্রাহীনতা বশতঃ দীর্ঘকাল-ব্যাপী অত্যন্ত যাতনা (কক, নাক্স-এসি)।

কিছু করা হউক বা না হউক সম্পূর্ণ অবসন্নতা অনুভব ; হাটিবার সময় অতিশয় ক্লান্তি।

অনুভূতি —আবৃত থাকিলেও যেন শীতল বায়ু গায় লাগিতেছে ; চাদর যেন আর্দ্র, রোগিণীর এপ্রকার অনুভব

শোথ। —যান্ত্রিক হৃদ্রোগ ; পুরাতন যকৃদ্রোগ ; ও অনেক দূর বিবর্দ্ধিত এলবুমিনুরিয়া হইতে উৎপন্ন ; এবং সবিরাম জ্বরের পরবর্ত্তী ; শোথ স্থৌল্য বা মেদ-রোগ , দেহের অপকৃষ্টতা প্রাপ্তি।

ল্যাকেসিস।

(Lachesis)

পিত্ত-প্রধান বিমর্ষ প্রকৃতি, মলিনবর্ণ চক্ষু এবং অস্থিরতা ও অলসতার প্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তি

তিলকা অলকাদি ও আরক্ত চুল বিশিষ্টা পিত্তপ্রধান-পাণ্ডুর নারী (ফস)। স্থূলকায় অপেক্ষা ক্ষীণ ও শীর্ণকায় ব্যক্তি; এবং রোগবশতঃ মানসিক ও শারীরিক পরিবর্ত্তন-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

নিবৃত্তরজস্কাদিগের পীড়া (climacteric ailments), অর্শ, রক্তস্রাব, উত্তাপাবেশ, (hot flushes) উত্তপ্ত ঘর্ম্ম; মূর্দ্ধাদেশে জ্বালাকর শিরোবেদনা; বিশেষতঃ রজ-নিবৃত্তি-কালে অথবা তৎপরে (স্যাঙ্গ, সলফ) উহার বিদ্যমানতা।

দীর্ঘকাল স্থায়ী শোক; দুঃখ, ভয়, বিরক্তি, প্রেম-বিদ্বেষ বা নিরাশ প্রেম জনিত পীড়া। (অরম ইগ্নে, ফস-এসি)।

রজোনিবৃত্তির উপদ্রব হইতে যে সকল নারীর বিমুক্তি লাভ হয় নাই, যাহারা সেই অবধি কখনও স্বাস্থ্য-সুখ ভোগ করে নাই তাহাদের পক্ষে ল্যাক উপযোগী।

শিরঃপীড়া,—শঙ্খস্থানে (temple) প্রচাপন বা বিদারণবৎ বেদনা, নড়িলে চড়িলে, চাপ দিলে, মাথা নোয়াইলে, শয়নে ও নিদ্রার পরে উহার বৃদ্ধি; রোগিণীর নিদ্রা যাইতে ভয় হয় কেননা তাহার এই প্রকার মাথাধরা সহকারে জাগরিত হইতে হয়

মদিরাপানের পরে, চিত্ত-বিকারে; বিলুপ্ত বা অনিয়মিত ঋতু বশতঃ রজোনিবৃত্তি কালে; মস্তকে রক্তের প্রধাবন।

বামপার্শ্বিক সন্ন্যাস মূর্দ্ধাদেশে ভার ও চাপ। (সিপি), মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে সীসের ন্যায় চাপ ও ভার (পেট্রো)

মদ্যপায়ীদিগের শিরঃপীড়া বা অর্শ; বিসর্প বা সন্ন্যাসরোগের প্রবণতা প্রধানতঃ বামপার্শ্বের আক্রান্তি; ডিম্বাশয়, অণ্ডকোষ, বক্ষঃস্থল, মুখমণ্ডল ও গল-মধ্যাদির বামপার্শ্বে রোগের আরম্ভ ও দক্ষিণপার্শ্বে গতি।

গলা, আমাশয়, ও উদরে স্পর্শে অতিশয় অনুভূতি; গ্রীবা বা কটির চারিদিকে দৃঢ় বস্ত্রাদি সহ্য হয় না; গলায় বা উদরে রাত্রিকালে শয্যাবস্ত্র বা গাত্র-বস্ত্রের স্পর্শ সহ্য করিতে পারা যায় না উহাতে এক-প্রকার অস্বচ্ছন্দতা জন্মে, কিন্তু এপিস বা বেলেডোনার ন্যায় স্পর্শ-দ্বেষ জন্মে না অর্থাৎ ছন্‌ছন্‌ করে না

উত্তাপ ও শীতের আতিশয্যে অতিশয় দুর্ব্বলতা জন্মে।

সমস্ত লক্ষণ, বিশেষতঃ মানসিক লক্ষণ, নিদ্রার পরে বৃদ্ধি পায়, অথবা বৃদ্ধি পাইয়া রোগীকে নিদ্রা হইতে জাগায়; বৃদ্ধি না পাওয়া পর্য্যন্ত রোগী নিদ্রা যায়; অসুখী, ব্যাকুলিত, ও বিমর্ষ ভাব, প্রাতে জাগরণান্তে উহার বৃদ্ধি।

মানসিক উদ্দীপনা, চিত্তের অস্বাভাবিক অবস্থা, প্রায় ভবিষ্যৎবাণীর ন্যায় অনুভব; উদ্দীপ্ত কল্পনা; অতিশয় বহুভাষিত (এগার, ষ্ট্রাম); সকল সময় কেবল কথা বলিতেই ইচ্ছা; একভাব ছাড়িয়া দিয়া শীঘ্র শীঘ্র অন্য ভাবের কথা বলা; এক একটী কথায় এক একটী গল্পের সূচনা করা।

কোষ্ঠবদ্ধতা;—নিশ্চেষ্টতা, সরলান্ত্রে মলের অবস্থিতি, অথচ বেগশূন্যতা মলদ্বারের আবরণ-পেশীর আকুঞ্চন অনুভব (কষ্ট, নাই-এসি)

নিয়মিত সময়ে ঋতু, অতিরিক্ত, অল্পকাল স্থায়ী, অল্প, ক্ষীণ স্রাব; রক্ত-স্রাবে সকল বেদনার শান্তি; ঋতু-কালে সর্ব্বদাই ভাল থাকা (জিঙ্ক)।

অর্শ;—অল্প রজঃ সহকারে; রজোনিবৃত্তি কালে; আকুঞ্চন বশতঃ রক্ত-সঞ্চালন অবরুদ্ধ; ও ঊর্দ্ধদিকে সূচী-বেধবৎ যন্ত্রণা সংযুক্ত অর্শ (নাই-এসি)

মুখ বা নাকের নিকটে কোন ক্ষুদ্রতম বস্তু উপস্থিত হইলেও শ্বাসের প্রতিবন্ধকতা; ও একটু দূরে পাখা রাখিয়া আস্তে আস্তে বাতাস দিতে বলা (তাড়াতাড়ি বাতাস দিতে বলা, কার্ব্বো-ভেজি)।

নিদ্রিত হইয়া পড়িবামাত্র শ্বাসের স্থগিততা (এম কা, ল্যাক-ক্যা, গ্রিণ্ডি, ওপি)

অতিশয় শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা, সর্ব্ব শরীর কম্পন, দুর্ব্বলতা বশতঃ অবিরত অবসন্নতা ; প্রাতঃকালে উহার আতিশয্য (সলফ, টিউব)।

অপস্মার (epilopsy) ;—নিদ্রাবস্থায় রোগের আক্রমণ (বিউফো) ; শারীরিক তরল পদার্থের অপক্ষয়, কৃত্রিম মৈথুন, ও প্রেম-সন্দিগ্ধতাজনিত অপস্মার ; ঋতুকালে উপস্থিত অপস্মার (সিড)

রক্তস্রাব প্রবণ শারীরিক প্রকৃতি ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিঘাত হইতে সহজে ও অধিক পরিমাণে রক্তপাত (ক্রোট, ক্রিয়োজ ; ফস) ; মলিন অসংযত রক্ত (ক্রোট, সিকে) টাইফয়েড্ ও ইয়ালো জ্বরে রক্তস্রাব, অতিশয় অবসন্নতা (ক্রিয়োজ)

স্ফোটক কার্ব্বঙ্কল, অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট ক্ষত (টার) ; দূষিত ব্রণ ; শয্যা-ক্ষত ; উহার মলিন, ঈষৎ নীল বেগুনি আকৃতি ; উৎকটতা জন্মিবার সম্ভাবনা।

বিষাক্ত অভিঘাতের ; ও শবচ্ছেদের মন্দ ফল (পাইরো)

মূত্রাশয়ে যেন একটী গোলক (ball) গড়াইতেছে এরূপ অনুভব। পূর্ব্ববর্ত্তী শরৎকালে কুইনাইন সেবনে অবরুদ্ধ জ্বরের পতিবৎসর বসন্তকালে প্রত্যাবৃত্তি (কার্ব্বো-ভেজি, সলফ)।

সুপ্তি, মৃদুপলাপ, নিমগ্ন মুখাকৃতি, নিম্ন-হনুর পতন, জিহ্বার শুষ্কতা, কৃষ্ণবর্ণ, ও কম্পন ; কষ্টে জিহ্বা বাহির করা যায় অথবা বাহির করিবার সময় আটকিয়া যায় ; চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের পীত বা কমলালেবুর বর্ণ ; ঘর্ম শীতল, বর্ণে পীতবর্ণ চিহ্নকর ও রক্তাক্ত (লাই), এই সকল লক্ষণে টাইফাস ও টাইফয়েড জ্বর

বামপার্শ্বে আরব্ধ ও দক্ষিণপার্শ্বে প্রসারিত ডিপথিরিয়া ও টন্সিলাইটিস (ল্যাক-ক্যান, সাবাড), মলিন বেগুনি আকৃতি (নাজা) ; উত্তপ্ত পানীয় দ্রব্য পানে, ও নিদ্রান্তে বৃদ্ধি ; গিলিবার সময় অতরল অপেক্ষা তরল দ্রব্য গিলিতে অধিকতর যাতনা (বেল ব্রাই, ইগ্নে) গলার আকৃতি দেখিয়া যেরূপ বোধ হয় তদপেক্ষা অধিকতর অবসাদ

উপচয়।—নিদ্রান্তে. অম্ল মদিরা, সিঙ্কোনা, ও পারদ সেবন জন্য,

স্পর্শে। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে; শীতোত্তাপের অত্যাধিক্যে, সূর্য্যের তাপে। বসন্তকালে; ও গ্রীষ্মকালে; বৃদ্ধি

উপশম।— উষ্ণতায় হ্রাস

সম্বন্ধ।— (১) হিপ, ল্যাক, নাই-এসির সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ (২) এসেট-এসি ও কার্ব্ব-এসির সহিত বিষম-গুণ সম্বন্ধ (৩) সবিরাম জ্বরে ল্যাকেসিস ব্যবহারে জ্বরের প্রকার পরিবর্ত্তিত হইলে ল্যাকের পরে ন্যাট-মিউ ভাল খাটে।

ষ্ট্যানম।

(Stannum)

মন ও শরীরের অত্যন্ত অবসন্নতা। আমাশয়ে নিমগ্নতা ও শূন্যতা অনুভব (চেলি, ফস, সিপি)।

সর্ব্বদা ক্রন্দনের ন্যায় বিমর্ষতা ও নিরাশ্যতা অনুভব, কিন্তু ক্রন্দন করিলে উহার আতিশয্য (ন্যাট, পলস, সিপি); শ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ নীচের তলায় নামিতে, কিন্তু উপরের তলায় বেশ উঠিতে পারা যায় (বোরা - ক্যাল্কের বিপরীত)।

শিরঃপীড়া কিংবা স্নায়ু-শূল (neuralgia); মৃদুভাবে বেদনার আরম্ভ এবং ক্রমে ক্রমে চরম সীমা (highest point) পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; অনন্তর ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্তি (প্লাট)।

উদর বেদন; শক্ত চাপ দিলে, অথবা উদর স্কন্ধদ্বয়ের আড়াআড়ি রাখিলে উহার উপশম (কলো), দীর্ঘক্রিমি; ক্রিমি নিঃসরণ।

নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, অতিরক্ত প্রভৃত রজঃস্রাব; ঋতুর পূর্ব্বে বিমর্ষতা ঋতু-কালে হনুর অস্থিতে বেদনা

প্রদর; অতিশয় দুর্ব্বলতা; বক্ষঃস্থল হইতে যেন দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হইতেছে এরূপ অনুভব [উদর ও বস্তি-গহ্বর (pelvis) হইতে, ফস, সিপি]।

গুদ-ভ্রংশ, মল-ত্যাগ-কালে উহার আধিক্য (অতিসার সহকারে আতিশয্য, পড়); এত দুর্ব্বলতা, যে বসিবার পরিবর্ত্তে রোগিণী আসনে (chair) পতিত হয়।

প্রাতঃকালে কাপড় পরিবার সময় কয়েকবার বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লইতে হয়।

প্রাতঃকালে; ও খাদ্যদ্রব্য পাকের গন্ধ হইতে বিবমিষা ও বমনের উৎপত্তি (আর্স, কলচি)।

গান করিবার বা স্বর-চালনা করিবার সময় স্কন্ধের ত্রিকোণাকার পেশীতে (deltoid) ও বাহুদ্বয়ে বেদনা ■ দুর্ব্বলতা

বক্ষঃস্থলে অতিশয় দুর্ব্বলতা; কথা বলিলে, হাসিলে, উচ্চ স্বরে পড়িলে, ও গান করিলে উহার বৃদ্ধি · এত দুর্ব্বলত যে কথা বলিতে পারা যায় না।

গভীর, ফাঁপা, বিখণ্ডিত, শ্বাস-রোধকর, কাস; কম্পকর; এক এক আবেগে তিনবার উপস্থিত, কাস (দুইবার উপস্থিত, মার্ক); সন্ধ্যাকালে শয্যায় থাকা কালীন শুষ্ককাস; বক্ষঃস্থলে শূন্যতানুভব।

অণ্ডের শ্বেতাংশসদৃশ, প্রভূত নিষ্ঠীবন, উহার ঈষৎ মিষ্ট ও লবণা-স্বাদ (কালী-আই. সিপি); অম্ল, পচা, ভাপসা; পীত-মিশ্রিত হরিদ্বর্ণ পূয (ভারী, সবুজ, লোণা পূয, কালী-আই) দিবাভাগে নিঃসরণ

স্বরভঙ্গ; গভীর, কর্কশ, শূন্য-গর্ভ স্বর, কাসিলে অথবা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিলে উহার সাময়িক উপশম

ভাপসা-গন্ধ; প্রত্যহ রাত্রি চারিটার পরে ঘাড়ে ও কপালে, অতিশয় দৌর্ব্বল্যকর ঘর্ম্ম।

উপচয়।—হাস্যে, গানে, আলাপনে, স্বর-চালনে; দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে; ■ উষ্ণ দ্রব্য পানে (শীতল দ্রব্য পানে, স্পঞ্জ) বৃদ্ধি।

উপশম।—কাসিলে অথবা নিষ্ঠীবন তুলিলে স্বরভঙ্গের উপশম; ■ চাপ প্রদানে হ্রাস (কলো)

সম্বন্ধ।— (১) পলসেটিলার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ।

(২) কষ্টিকমের পরে, এবং ক্যাল্ক, ফস, সিপি, সল, টিউবের পূর্ব্বে ইহা ভাল খাটে

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

(Staphisagria)

কৃত্রিম মৈথুন ও অতি মৈথুন জনিত মানসিক লক্ষণ।

অত্যন্ত মানসিক সংস্কারে (mental impression) অতিশয় অনুভূতি; যৎসামান্য কার্য্যে কিংবা দোষশূন্য কথায় বিরক্তি।

অন্যের বা নিজের কৃতকার্য্যে রুষ্টতা, উহার ফলাফল ভাবিয়া শোক প্রকাশ

ইন্দ্রিয়-সেবার অপব্যবহার বশতঃ চিত্তের ঔদাস্য, বৈরাগ্য, নিরুৎসাহ স্মৃতি দৌর্ব্বল্য (এনাকা, অর, গ্র্যাট ফস-এসি)

অহঙ্কার, হিংসা বা বিরক্তি জনিত অসুখ।

মন্দ প্রকৃতির বালক-বালিকাদিগের কোন দ্রব্যের জন্য ক্রন্দন, এবং উহা প্রাপ্ত হইলে অসন্তুষ্ট চিত্তে প্রত্যাখ্যান বা দূরে নিক্ষেপ করা (ক্রিয়োজ)।

অপমানিত হইয়া ক্রোধ সম্বরণ করিয়া রাখা এবং অসুস্থ হইয়া কম্পিত ও অবসন্ন শরীরে গৃহে ফিরিয়া যাওয়া (নক্সের বিপরীত)।

কপালে একটা গোলাকার বর্ত্তুলের ন্যায় অনুভব, মাথা ঝাঁকিলেও সেই স্থানে দৃঢ়রূপে উহার অবস্থিতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রজনিত উপঘাত, শস্ত্রোপচারের পরবর্ত্তী উপঘাত, ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় বেধনবৎ বেদনা।

কৃত্রিম মৈথুন; অতি-মৈথুন, শুক্রক্ষয়; বিরক্তি; দুঃখ, অনুচিত অপমান; বিরক্তি বা সংযত অসন্তুষ্টি সংযুক্ত রুষ্টতা জনিত মন্দফল (অরম)।

স্নায়বীয় চঞ্চলতা, অধিক-কঠিন পরিশ্রমের পরবর্ত্তী অবসন্নতার ন্যায় অবসন্নতা

অক্ষিপুটে বা উপরের অক্ষিপুটে একটীর পর আর একটী অঞ্জনী, এবং তৎপরে শক্ত শক্ত স্থানের অবশেষ (কোনা, থুজা)

দন্ত-বেদনা —ঋতুকালে দন্ত-বেদনা ; সুস্থ ও ক্ষয় প্রাপ্ত উভয় প্রকার দন্তেই বেদনা ; খাদ্য দ্রব্য ও পেয় দ্রব্যের স্পর্শে ব্যাথিততা, কিন্তু দংশন বা চর্ব্বণে বেদনাশূন্যতা ; মুখ-বিবরে শীতল বায়ু আকর্ষণ করিলে (এন্ট-ক্রুড, মাক) ; এবং শীতল পানীয় দ্রব্য পানে ও আহারান্তে উহার বৃদ্ধি।

দাঁত কাল, উহাদের ভিতর দিয়া কাল কাল রেখা দৃষ্ট হয় ; পরিষ্কৃত রাখিতে পারা যায় না ; খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে ; প্রান্তদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (মূলদেশের ক্ষয়প্রাপ্তি, মেজ, থুজা), শীতাদ (scurvy) জনিত শরীরবিকার।

আমাশয় ভুক্তদ্রব্যে পূর্ণ থাকিলেও অত্যন্ত ক্ষুধা।

আমাশয় ও উদর যেন শিথিলিত হইয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এপ্রকার অনুভব (এগার, ইপি, টাবে)

তামাক সেবনের স্পৃহা।

শস্ত্রক্রিয়া দ্বারা মূত্রাশয় হইতে প্রস্তর বাহির করা বা ডিম্বাশয়চ্ছেদের পরে ; ও উদরচ্ছেদের পরে (বিস হিপ) উদর-বেদনা

বিবাহিতা যুবতীদিগের, সঙ্গমান্তে ; ও কষ্টসাধ্য প্রসবের পর (ওপি) মূত্র বেগ, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মূত্র-ত্যাগের স্থানে বসিয়া থাকিতে হয় ; যখন প্রস্রাব করা যায় না, তখন মূত্র মার্গে জ্বালা ; বৃদ্ধদিগের মূত্রাশয়ের মুখশায়ীগ্রন্থির উপসর্গে মূত্র-ত্যাগের পর বেগ ও বেদনা ; মূত্রাশয়-ভ্রংশ (prolapse of bladder)

সঙ্গমেন্দ্রিয়ের বেদনা বিশিষ্ট অনুভূতি, বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গের এতই অনুভূতি যে উহার উপর বস্ত্রের স্পর্শ সহ্য হয়না (প্লাট)

কৃত্রিম মৈথুন ; অবিরত রমণ-বিষয়ক বর্ণনা ; সর্ব্বদা রতিসুখের ভাবনা

শুক্র-মেহ ; নিমগ্ন মুখাকৃতি ; অপরাধিত, লজ্জিত দৃষ্টি ; শুক্র-পাতান্তে পৃষ্ঠ-বেদনা ও দুর্ব্বলতা ; সঙ্গমেন্দ্রিয়ের অবসন্নতা ও শিথিলতা অথবা শীর্ণতা

কাস; কেবল দিবাভাগে, অথবা কেবল আহারান্তে কাস, মাংস আহারের পর; এবং বিরক্তি ও কষ্টের পর উহার আধিক্য; দাঁত মাজিলে কাসের উদ্রেক

শীতকালে ক্রুপসদৃশ কাস সহকারে পর্য্যায়ক্রমে গ্রীষ্মকালে সায়েটিকা; তামাকের ধূমে কাসের উদ্রেক (স্পঞ্জ)।

পৃষ্ঠ বেদনা, রাত্রিতে শয্যায় এবং প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে উহার আধিক্য।

সন্ধি-স্থানে; বিশেষতঃ হস্তের অঙ্গুলী-সন্ধিতে বাতজনিত চূর্ণময় পদার্থের সঞ্চয় (কলোফ, কলাস, লাই); স্বেদ ও পুয সংস্কারে অঙ্গুলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির প্রদাহ

সারা দিন নিদ্রালুতা, সারারাত্রি নিদ্রাহীনতা, সমস্ত শরীরে ব্যথা

শুষ্ক, সরস, ফুলকপির মত; ও পারদ অপব্যবহারের পর উৎপন্ন; ডুমুরবৎ আঁচিল বা উপমাংস (নাইট্রিক, স্যাব, থুজা)

জ্বরে, আক্রমণের কয়েক দিন পূর্ব্বে অতি ক্ষুধা

পামা (Eczema)।—চাপটিকাগুলি হইতে পীতবর্ণ, ঝাঁঝালো রস-ক্ষরণ, ঐ রস লাগিয়া নূতন স্ফোটের উৎপত্তি; কোন একস্থান চুলকাইলে উহার কণ্ডূয়নের নিবৃত্তি, কিন্তু অন্য স্থানে উপস্থিতি।

উপচয়।—রাত্রিতে; প্রাতে; শুক্রাদি তরল বস্তুর অপক্ষয় বশতঃ, অতি মৈথুন নিবন্ধন; কৃত্রিম মৈথুন জন্য; তাম্রকূট সেবনে, আক্রান্ত স্থানের অল্পমাত্র স্পর্শে; মানসিক পীড়ার, রাগ, বিরাগ, ও শোক-দুঃখে; বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—(১) রাণবল্‌বের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ। উহা এই ঔষধের পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহৃত হয় না। (২) কষ্ট, কলো, ইগ্নে, লাই ও পলসের সহিত তুলনা হয়। (৩) কলো ও ষ্ট্যাফ একটীর পর আর একটী ভাল কাজ করে। (৪) কষ্টের পরে কলো, কলোর পরে ষ্ট্যাফ ভাল ফল দর্শায়।

ষ্ট্রামোনিয়ম।

(Stramonium)

রক্ত-প্রধান যুবক-যুবতীদিগের রোগে (একন, বেল,); বিশেষতঃ কোরিয়া রোগগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের পক্ষে; এবং উন্মাদ, জ্বর, ও প্রলাপে; ষ্ট্রামোনিয়ম বিশেষ উপযোগী।

প্রলাপ বাচালতা, সর্ব্বদা কথা বলা, গানকরা, পদ্য রচনা করা, উন্মত্তবৎ বক্ বক্ করিয়া বকা বেলেডোনা ও হাইওসায়েমাসের সহিত ষ্ট্রামোনিয়মের প্রলাপের সাদৃশ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রভেদ আছে ষ্ট্রামোনিয়মের প্রলাপ অধিকতর প্রচণ্ড, উন্মাদ অধিকতর তরুণ, কিন্তু রক্ত-সঞ্চয় হাইওসায়েমাস অপেক্ষা অধিকতর ও বেলেডোনা অপেক্ষা অনেক অল্পতর, কখনও পক্কত প্রাদাহিক অবস্থার সমীপবর্ত্তী নহে

বহুভাষিতা; অবিশ্রান্ত কথা বলিতে প্রবৃত্তি (সিকু, ল্যাক); অবিরত ও অসঙ্গত আলাপন ও হাস্য করণ, ঋতুবিলুপ্তি সহ প্রার্থনা করা, বিনয় ও অনুনয় করা

সজ্ঞাসংযুক্ত টঙ্কার (নক্স —সংজ্ঞাশূন্য, বেল, সিকু, হাইও, ওপি), জ্যোতিঃ, জল, ও দর্পণ দর্শনে উহার পুনরুপস্থিতি (বেল, হাইস)।

আলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা ও আসঙ্গলিপ্সা (Desire for light and company); একাকী থাকা সহ্য করিতে পারা যায় না (বিস); অন্ধকারে ও নির্জ্জনে বৃদ্ধি প্রাপ্তি; অন্ধকার গৃহে হাঁটিতে পারা যায় না।

আকুঞ্চিত মুখাকৃতি সহ নিদ্রা হইতে জাগরণ, যেন প্রথম যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ভয় জন্মিয়াছে.

অবাস্তব বস্তু দর্শন করিয়া রোগীর ভয়প্রাপ্তি

প্রলাপাবস্থায় পলায়নের প্রবৃত্তি (বেল বাই, ওপি, হ্যুস)।

রোগিণী যেন দুইজন বা দ্বিগুণিত, অথবা অনুপ্রস্থভাবে (crosswise) শয়িত, তাহার ঈদৃশ নানাবিধ কল্পনা (পেট্রো)

মস্তক যেন হঠাৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এরূপ অনুভব (ব্যাপ্টি)

প্রসারিত, সমুন্নত, সমজ্জ্বল চক্ষু; সুবিস্তৃত প্রসারিত কনীনিকা, উহার চৈতন্যশূন্যতা, অক্ষি ও অক্ষিপুটের আকুঞ্চন।

শিশুকে তিরস্কার করিলে তাহার কনীনিকার প্রসারণ।

শীতল হস্ত-পদ সহকারে মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা ও আরক্ততা; গণ্ডদ্বয়ের সীমাবদ্ধ আরক্ততা, মুখমণ্ডলে রক্তের উচ্ছ্বাস, হাস্যবৎ আক্ষেপিক মুখবিকৃতি।

অধিকাংশ রোগের সহিত বেদনা-পরিশূন্যতা (ওপি)।

জলাতঙ্ক, জলের ভয়, তরল পদার্থে অত্যন্ত অপ্রবৃত্তি (বেল, লাইসি); গলার আক্ষেপিক আকুঞ্চন

গদগদভাষণ (তোতলামি) একটী কথা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়; কথা বলিতে অতিশয় চেষ্টা আবশ্যক হয়; মুখমণ্ডলের বিকৃতি জন্মে (বোভ, ইগে, স্পিজি)।

বালিশ হইতে মাথা তুলিলেই বমন জন্মে; উজ্জ্বল আলোক দেখিলেও বমন হয়।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পেশীর অথবা পেশীপুঞ্জের, বিশেষতঃ শরীরের ঊর্দ্ধাংশের পেশীর স্পন্দন কোরিয়া।

অধিকাংশ রোগের সহিত বেদনার অবিদ্যমানতা; বেদনাহীনতা, বিশেষ লক্ষণ (ওপি)

নিদ্রালুতা, অথচ নিদ্রা হয় না (বেল, ক্যাম, ওপি)।

উপচয়।- অন্ধকারে; একাকী থাকিলে; উজ্জ্বল বা চিকণ (shining) দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে; স্পর্শে; নিদ্রান্তে (এপিস, ল্যাক, ওপি, স্পঞ্জ); ও গিলিবার সময়; বৃদ্ধি।

উপশম।— লোক সংসর্গে; উজ্জ্বল আলোকে; ও উষ্ণতায়; হ্রাস।

সম্বন্ধ।— (১) বেল, কুপ, হাইও ও লাইসিনের পরে প্রায়ই ষ্ট্রামোনিয়ম উপযোগী হয় (২) ঋতুর অবরোধ বশতঃ জরায়ুর রক্তস্রাবে ষ্ট্রামোনিয়ম-

সূচক প্রলাপ-লক্ষণের বিদ্যমানতায় ষ্ট্রামো বিফল হইলে সিকেলি শীঘ্র ক্রিয়া করে (জ্বর ও পচন-প্রবণতায়, পাইরো) (৩) স্বপ্ন-শুক্র-কালে পুনঃ পুনঃ বেলেডোনা প্রয়োগ করাতে অতি-ক্রিয়া জন্মিলে ষ্ট্রামো ব্যবহৃত হয়

সালফার।

(Sulphur)

গণ্ডমালা-ধাতু-দোষ-গ্রস্ত, শৈরিক রক্ত-সঞ্চয়, বিশেষতঃ যকৃতের শিরাসংক্রান্ত রক্ত-সঞ্চয়-প্রবণ ব্যক্তি

যাহারা তাড়াতাড়ি নড়ে-চড়ে সত্বর উত্তেজিত হইয়া উঠে বা অবসন্ন হইয়া পড়ে, যাহাদের শরীরে রক্তের প্রাধান্য, ত্বকে বাতাতপের পরিবর্তনের অত্যন্ত অনুভূতি, এপ্রকার স্নায়বীয় প্রকৃতির ব্যক্তি। (হিপ, কার্বো-ক্যা, সোরি)।

যাহারা অবনীর্য (stooping) হইয়া উপবেশন বা বিচরণ করে; বৃদ্ধদিগের ন্যায় অবনত মস্তকে হাঁটে; এপ্রকার ক্ষীণ-কায় অবনত-স্কন্ধ ব্যক্তি।

সালফার জ্ঞাপক রোগী দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেনা; উহাতে অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয়

চর্ম্ম-রোগ-প্রবণ (সোরি) অপরিচ্ছন্ন মলিন ব্যক্তি।

প্রক্ষালনে অপ্রবৃত্তি স্নানের পরে সর্ব্বদাই মন্দ বস্থাপ্রাপ্তি।

এত অলস যে জাগিতে চাহেনা এত অসুখী যে বাঁচিতে চাহেনা

শিশুদিগের গাত্র-প্রক্ষালন বা স্নান সহ্য হয় না (শীতল জলে, এন্ট-ক্রুড); শীর্ণ-শরীর বৃহৎ-উদর শিশু; রাত্রিতে অস্থিরতা ও উদ্ধতা, পদাঘাত করিয়া বস্ত্রাদি ফেলিয়া দেওয়া (হিপ, স্যানি); কৃমির বিদ্যমানতা, কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট নির্ব্বাচিত ঔষধেও কোন ফল দর্শেনা।

যখন কোন রোগে বিশেষতঃ তরুণ রোগে সতর্কতা সহকারে নির্ব্বাচিত ঔষধেও সুফল দর্শেনা, তখন সচরাচর সলফার ব্যবহারে শরীরের প্রতিক্রিয়া-শক্তি সমুদ্রিক্ত হয়; রোগীর লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে (পুরাতন রোগে, সোরি)।

উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া উৎপন্ন গণ্ডমালাজনিত পুরাতন রোগ (কষ্টি, সোরি)

পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত রোগ; (রজোরোগ, প্রদরাদি); রোগ যখন বারবার প্রত্যাবৃত্ত হয় তখন রোগী যেন প্রায় সুস্থ হইতেছে এরূপ বোধ হয়।

চক্ষু, বক্ষ, নাক, উদর, ডিম্বাশয় বস্তি জঙ্ঘা প্রভৃতি এক এক অঙ্গে; কিম্বা রজোনিবৃত্তি কালে শরীরের কোন স্থানে উৎপন্ন অর্ব্বুদাদিতে রক্ত-সঞ্চয়।

মস্তক-শিখরে, চক্ষে আরক্ততা-পরিশূন্য মণ্ডলে; মুখ-বিবরের ফোস্কায়; প্রথমে দক্ষিণ দিকে পরে বামদিকে। গলশোথে, আমাশয়ে, সরলান্ত্রে; কণ্ডুয়ন-শীল অর্শবলি, ও বিদাহি মূত্র সহকারে মলদ্বারে, অগ্নির ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তরঙ্গের অনুরূপ (অর্শ), বক্ষঃস্থলে বদন পর্য্যন্ত উত্থিত; তাপাবেশ সহকারে সর্ব্ব শরীরে; ত্বকে; ও স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে (ফস); জ্বালানুভব।

অবসাদজনক ও দৌর্ব্বল্যকর (স্যাঙ্গ), এবং উত্তপ্ত মস্তক-শিখর ও শীতল পদ সমন্বিত, প্রতি সপ্তাহে বা প্রতিপক্ষে প্রত্যাগত; সবমন শিরঃপীড়া।

মস্তকের মধ্যস্থলে সতত উত্তাপ; দিবাভাগে পদদ্বয়ের শীতলতা, রাত্রিতে পদতলের জ্বালা, পদ-তল শীতল স্থলে রাখিবার চেষ্টা (সাঙ্গ, স্যানি); শীতল করিবার জন্য পদদ্বয় শয্যার বাহিরে রাখিতে হয় (মেড); রাত্রিতে জঙ্ঘা-পৃষ্ঠে ও পদ-তলে খল্লী।

দিবাকালে উত্তাপ বেগ, তৎসহ দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তির আবেশ, গাত্রের অল্প অল্প আর্দ্রতা সহকারে উহার অবসান।

রক্ত যেন ফাটিয়া বাহির হইবে ওষ্ঠাধরের একবার উজ্জ্বল আরক্ততা (টিউব)।

পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় আমাশয়ে দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা অনুভব (১০ টা বা ১১টার সময় শূন্যতানুভব ও আহারে উহার শান্তি নাট্রাম); জলখাবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারা যায়না। দিবাভাগে বারবার দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তির আবেশ (জিঙ্ক তুলনা করুন)।

দুই প্রহর রাত্রির পরে বেদনাশূন্য অতিসার; অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি বহির্দ্দেশে যাইতে হয় (এলো, সোরি); বোধহয় যেন অন্ত্র এত অতিরিক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, উহা উহার আধেয় (contents) ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন।।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য; শক্ত, গ্রন্থিল, দগ্ধবৎ শুষ্ক মল (সাইং); যাতনা-জনক বৃহৎ মল, বেদনা জন্মে বলিয়া শিশু মলত্যাগ করিতে ভয় পায়, অথবা বেদনা বশতঃ শিশু প্রথমে মল-ত্যাগের চেষ্টা করেনা; পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠ-রোধ ও অতিসার।

যে যে স্থানদিয়া মল-মূত্র প্রবাহিত হয় সেই সেই স্থানে যাতনা; অধিক পরিমাণে বর্ণশূন্য মূত্র-স্রাব; মলদ্বারের চারিদিকের আরক্ততা ও অবদরণ; শরীরের সকল দ্বারগুলিরই অতিশয় আরক্ততা; সকল স্রাবেরই বিদাহিতা, উহা যেখানে স্পর্শ করে সেখানেই অবদরণ জন্মায়।

ঋতু;—নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, অধিক দিন স্থায়ী, প্রভূত রক্ত অতি রজোরোগ, বিগত গর্ভস্রাব হইতে অসুস্থতা "অমাবস্যার সময় কেবল একমাত্রা ঔষধ ব্যবস্থেয়"—লিপি

স্ফোটক;—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দলেদলে স্ফোটকের উৎপত্তি; অথবা প্রথমটি আরোগ্য হইবামাত্র আর একটির উৎপত্তি (টিউব)

ত্বক্ —সুখকর-কণ্ডূয়ন; চুলকাইলে উপশম; চুলকাইতে ভাল লাগে; চুলকাইলে জ্বালা হয়; শয্যায় উত্তাপে বাড়ে (মার্ক); চর্ম্মের বলীতে ক্ষত (লাই)।

ঔষধাক্ত সাবান ও ধৌতাদি দ্বারা চিকিৎসিত চর্ম্ম-রোগ। মলম দ্বারা চিকিৎসিত অর্শ

মস্তিষ্ক, ফুসফুস-বেষ্ট, ফুসফুস, ও সন্ধিতে মস্ত-সঞ্চয় অথবা প্রদাহজনিত অন্যবিধ ক্ষরিত পদার্থের আশোষণে ব্রাইওনিয়া, কালী-মিউর, অথবা অপর সুনির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না দর্শিলে সলফার ব্যবহৃত হয়।

অপরিমিত সুরাপান জনিত পুরাতন বিষ-লক্ষণ; মদ্যপায়ীদিগের শোথ

ও অন্যান্য পীড়া; এক এক বার মদ্য পরিত্যাগ, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রতিগ্রহণ (সোরি টিউব)

রাত্রিকালীন শ্বাস-রোধের আক্রমণ, দ্বার ও জানালা খুলিয়া দিতে বলা; রাত্রিতে সহসা সম্পূর্ণ জাগরিত হইয়া উঠা; সায়াহ্নে সূর্য্যাস্তের পর তন্দ্রালুতা, সমস্ত রাত্রি নিদ্রাশূন্যতা।

সুখকর স্বপ্ন, গান করিতে করিতে জাগরণ

রোগী যাহা ভালবাসে তাহাই তাহার নিকট সুন্দর দেখায়; এমন কি নেকড়াও সুন্দর দেখায়

উদরে ক্ষণের গর্ভাবস্থায় ন্যায় সঞ্চালন (ক্রোক, থুজা)

উপচয়।—বিশ্রামে; দাঁড়াইলে; শয্যার উষ্ণতায়; প্রক্ষালনে স্নানে; ও পরিবর্ত্তন-শীল বাতাতপে (ব্রুঃ ম); বৃদ্ধি।

উপশম —শুষ্ক, উষ্ণকালে; ও দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে টিউবের বিপরীত; হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) এলো ও সোরির সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) সাধারণতঃ ধাতব ঔষধ অপব্যবহারের কুফল (৩) ক্যাল্ক, লাই, পলস, সার্স, সিপির সহিত অনুকূল সম্বন্ধ (৪) সলফ, ক্যাল্ক, লাই; অথবা সলফ, সার্স ও সিপি অনেক সময় উল্লিখিত পর্য্যায় অনুসারে পরপর ব্যবহৃত হয় (৫) সলফারের পূর্ব্বে সাল্ফোরিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। (৬) নিউমোনিয়া ও অন্যান্য তরুণ রোগে একোনাইটের পরে সলফার ভাল খাটে।

সাংলফিউরিক এসিড।

(Sulphuric Acid)

লঘুকেশ, বৃদ্ধ ও বিশেষতঃ বৃদ্ধাদিগের পক্ষে; এবং নিবৃত্তরজস্কাদিগের উত্তাপাবেশে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

অবাধ্যতাবশতঃ নয়, কিন্তু অনুপযোগিতা বশতঃ প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছা

অতিশয় ব্যস্ত-সমস্ততা অনুভব; প্রত্যেক বিষয়ই সত্বর সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন (আর্জ্জ-না)

ক্রমে ক্রমে ও ধীরে ধীরে বিবর্দ্ধিত বেদনা, চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া সহসা উহার নিবৃত্তি, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্তি (প্লম্ব)

স্থূল-মুখ অস্ত্রের চাপের ন্যায় বেদনা। উপঘাত প্রাপ্তির পরে, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের পক্ষে, গ্যাংগ্রীণ জন্মিবার সম্ভাবনা

সতর্কভাবে প্রক্ষালন করিলেও শিশুর গাত্রে অম্লগন্ধ (হিপ, ম্যাগ-কা, রিউম)।

কপালে যেন মস্তিষ্ক আলগা হইয়াছে এবং এপাশ হইতে ওপাশে পড়িতেছে এরূপ অনুভব (বেল, ব্রাই, রস, স্পাইজি)।

মুখ-বিবর, দন্ত-মূল, অথবা সমগ্র গণ্ড-গহ্বরের উপক্ষত (aphthae); দন্ত-মূল হইতে সহজে রক্তপাত; ক্ষতগুলির ব্যথিততা; শ্বাসে দুর্গন্ধ (বোর)

পুরাতন হৃদ্দাহ (বুক-জ্বালা); অম্ল উদ্গার, দাঁত টক হয় (রোব)।

মদিরার সহিত মিশ্রিত না করিয়া জল পান করিলে আমাশয়ের শীতলতা জন্মে।

প্রকৃত কম্পন ব্যতীত সর্ব্ব শরীরে কম্পানুভব; মদিরাপায়ীদিগের আভ্যন্তরিক কম্পন। *

উপঘাত প্রাপ্তির সন্নিকটস্থল, দুষ্টব্রণ উন্মোচিত ও নীলবর্ণ ত্বক; অবসন্নতা (এসেট-এসি)।

কালিমা (Ecchymosis); ক্ষত-চিহ্নের রক্তবৎ লোহিতবর্ণে বা নীলবর্ণে পরিণতি, ও বেদনাপূর্ণতা (হরিৎবর্ণে পরিণতি, লিড)।

পেটিকিয়া; পার্পুরা হেমরেজিকা; নীলবর্ণ দাগ; সীসবর্ণ, আরক্ত, কণ্ডূয়নশীল ফুস্কুড়ি।

শরীরের সকল দ্বার হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব (ক্রোট, মিউ-এসি, নাই-এসি, টেরে)।

---

* হেরিং বলেন যে সলফিউরিক এসিড একভাগ এলকোহল তিনভাগ, ১০ হইতে ১৫ বিন্দু, প্রতিদিন তিনবার তিন চারি সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে মদিরা-পানের প্রবৃত্তি প্রশমিত হয়।

পতন বা আঘাত বশতঃ মস্তিষ্কের সংঘর্ষ বা সংঘাত এবং উহাতে দেহের শীতলতা ও শরীরের শীতল ঘর্ম্ম-সিক্ততা।

কোন গভীর-মূল ধাতু-দুষ্টতা জনিত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা অন্য কোন লক্ষণ নহে (সোরি, সলফ)

সম্বন্ধ।—(১) পডসের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ (২) ঘুষ্টবৎ বেদনা, পাণ্ডুর চর্ম্ম এবং প্রভূত ঘর্ম্মে আর্নিকার পর ও কালমিয়ার ডিজেলের পরে ভাল খাটে (৩) আর্স, বোরা, ক্যালেণ্ড, লিড, রুটা, বিউম ও সিম্ফাইটমের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (৪) কোমলাংশের ঘর্ষণে ও বিদারণে সলফিউরিক এসিড ক্যালেণ্ডুলার সমকক্ষ (৫) বাণ্ডি পানজনিত অসুখে ব্যবহৃত হয়

সাইকিউটা ভিরোসা।

(Cicuta Virosa)

অতিশয় স্নায়বীয় প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের পক্ষে অপস্মার ও তাণ্ডব (কোরিয়া) জনিত আক্ষেপগ্রস্ত স্ত্রীলোকের পক্ষে; এবং দন্তোদ্গম-কালে, অথবা কৃমিজন্য শিশুদিগের আক্ষেপে; এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

টঙ্কার।—সর্ব্বশরীরের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভয়ঙ্কর বিকৃতিবিশিষ্ট প্রবল আক্ষেপ, স্পর্শে, ও গোলমাল বা কর্কশ শব্দে আক্ষেপের প্রত্যাবৃত্তি।

অপস্মার।—ডায়াফ্রামের প্রবল আক্ষেপ জনিত স্ফীততার ন্যায় আমাশয়ের স্ফীততা, চিৎকার-করণ; আরক্ত বদন; হনুস্তম্ভ; হিক্কা; চৈতন্যশূন্যতা ও অঙ্গ-বিকৃতি; রাত্রিকালে বারংবার উপস্থিতি; প্রথম প্রথম অল্পকাল, অনন্তর দীর্ঘকাল ব্যবধানের পর আক্ষেপের প্রত্যাবৃত্তি।

সূতিকাক্ষেপ।—কয়েক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বারংবার শ্বাস-রুদ্ধ হইয়া থাকা, শরীরের উদ্ধাংশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রান্ততা; প্রসবের পরেও উহার অবস্থিতি।

দন্তোদ্গম-কালে, দাঁত বা মাড়ি কড়মড় করা; দন্ত-কপাটী লাগিলে যেরূপ হয় চোয়ালের সেইপ্রকার আকুঞ্চন ফুলখড়ি (চক) ও অপাচ্য দ্রব্য আহারের অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি; শিশু কয়লা ব অঙ্গার অতি আগ্রহকারে আহার করে (এলম, সোরি)।

মস্তক, আমাশয়, বাহু, ও জঙ্ঘার অভ্যন্তর দিয়া প্রবল বিকম্প (shook) এবং তদ্দ্বারা সেই সেই স্থানে উৎক্ষেপের উৎপত্তি মস্তকের উত্তপ্ততা।

মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের সংঘর্ষ concussion, বিশেষতঃ পুরাতন অপকারক ফল; মাংসের ভিতর চোঁচ ফুটিয়া থাকাতে হনুস্তম্ভ (trismus) ও ধনুস্তম্ভ (tetanus) (হাইপার)।

পড়িবার সময় অক্ষরগুলি ঘূর্ণিত হয়, উপরে-নীচে যায় অথবা অদৃশ্য হয় (ককু)।

মস্তকে ও মুখমণ্ডলে পচ্যমান পীড়ক, উহা মিশিয়া গিয়া পীতবর্ণ, স্থূল চিপিটিকার উৎপত্তি।

কণ্ডূয়ন পরিশূন্য পামা, স্রাবে লেবুবর্ণ শক্ত চিপিটিকার উৎপত্তি।

উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া মস্তিষ্ক-রোগের উদ্ভব

উপচয়।—তামাকের ধূম হইতে (হগে); স্পর্শে; ও সংঘর্ষে (অরে); বৃদ্ধি।

উপশম।—অনাবৃত বায়ুতে হ্রাস।

সম্বন্ধ।—হাইড্রো-এসি, হাইপার, নক্স, ও ষ্ট্রীক'নয়ার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

সাইক্লেমেন।

(Cyclamen Europaeum)

শ্লেষ্মা ও রস-প্রধান ধাতুর যে সকল ব্যক্তির মৃৎপাণ্ডু (anomia), হরিৎ-পাণ্ডু (chlorosis) থাকে যাহাদের সহজে শ্রান্তি আসে সুতরাং কোন প্রকার পরিশ্রমে ও বৃত্তি আসে না; এবং যাহাদের শরীরস্থ যন্ত্রগুলির অথবা বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ক্ষীণতা বা স্থগিততা থাকে তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী

পাণ্ডুবর্ণ, বিকৃত ধাতু-রক্ত (ফির, পলস), তৎসংস্কারে শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, ঝাপসা দৃষ্টি

সংযত শোক ও বিবেকের যাতনা ; কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করা বা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করা নিবন্ধন ; অসুখ

বেদনা , যে যে স্থলে অস্থি ও চর্ম্মের সমীপবর্ত্তী সেই সেই স্থানে প্রচাপন, আকর্ষণ বা ছেদনবৎ যাতনা।

অতিশয় বিমর্ষতা ও বিরক্ত চিত্ততা ; খিটখিটে রাগিতা অপ্রফুল্লতা, মন্দপ্রবৃত্তি (বদমেজাজ ; অশ্রুস্রাবপ্রবণতা ; নির্জ্জনপ্রিয়তা বিমুক্ত বায়ুতে অপ্রবৃত্তি (পলসের বিপরীত)

প্রাতে উত্থানান্তে চক্ষুর সম্মুখে দীপ্তি-রেখা দর্শন অথবা দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা সংস্কারে রক্তহীন রোগী দের শিরঃপীড়া

চক্ষুর সম্মুখে নানাবর্ণের আলোক শিখা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, উজ্জ্বল সূচী দর্শন ; কুজ্ঝটিকা বা ধূমের ন্যায় অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি।

অল্প কয়েক গ্রাস আহার করিলেই পরিতৃপ্তি (লাই), তৎপরে আহারীয় দ্রব্য ভাল লাগেনা, গলায় ও তালুকায় বিবমিষা জন্মায়

লালা ও সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যের একপ্রকার লবণাক্ত আস্বাদ।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনেক পূর্ব্বে অতি প্রভূত, কৃষ্ণবর্ণ ও সংযত (অনেক বিলম্বে, অতি অল্প, পাণ্ডুবর্ণ, পলস) ; ঝিল্লীসংযুক্ত ; প্রবাহিত হইবার সময় উপশম পায় (উপচয়কর, এষ্ট, পলস) ; ঋতু

অনাবৃত বায়ুতে বসিলে, দাঁড়াইলে অথবা হাঁটিলে পাদ-মূলে জ্বালাবৎ বেদনা (এগার, কষ্ট, ফাইটো, ভেলে)।

উপচয়।—অনাবৃত বায়ুতে, শীতল জলে; শীতল জলে স্নানে ঋতু, রাত্রিতে উপবেশনে ও শয়নে; এবং রসাক্ত দ্রব্য ভোজনে; বৃদ্ধি

উপশম।—উষ্ণ গৃহে, গৃহের অভ্যন্তরে; ঋতু বিচরণে (শ্বেতপ্রদর, উপবেশনে বৃদ্ধি, বিচরণে হ্রাস, ক্যাষ্টি, কক); হ্রাস

সম্বন্ধ। – ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া জনিত রোগে পলস, সিপ্ত ও ফিনমের সহিত; এবং উদরে যেন কোন সজীব প্রাণী রহিয়াছে এই লক্ষণে ক্রোক, ও থুজার সহিত সাইক্লেমেনের তুলনা হয়

সার্সা পেরিলা।

(Sarsaparilla)

মলিনবর্ণ কেশ, লিথিক বা সাইকোটিক ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে সার্স বিশেষ উপযোগী

অতিশয় শীর্ণতা; ত্বকের কুঞ্চিততা কিংবা বলিবিশিষ্টতা (এব্রোট, আইওড, স্যাট, স্যানিক)

সাধারণতঃ পারদ, উপদংশ অথবা বিলুপ্ত প্রমেহ হইতে উৎপন্ন শিরোবেদনা ও অস্থি-বেষ্টের বেদনা।

বালক-বালিকাদিগের বৃদ্ধের ন্যায় মুখমণ্ডল; বৃহৎ উদর; শুষ্ক, শোথিত ত্বক্ (ব্যারা-কা ওপি)

শরীরের সকল অংশে দদ্রুজ উদ্ভেদ; উপদংশে পারদ অপব্যবহারের পর ক্ষত

অনাবৃত বায়ু লাগিয়া গাত্রে উদ্ভেদের উৎপত্তি; শুষ্ক পাঁচড়ার ন্যায় উদ্ভেদ, বসন্তকালে উহার উপস্থিত হইবার প্রবণতা, উহাতে চিপিটিকা-জন্মে।

মূত্র-ত্যাগ শেষ হইলে দারুণ, অসহ্য-প্রায় যাতনা (বার্বে, ইকু, মেডো, থুজা)।

প্রস্তর রেণু অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর নিঃসরণ; বৃক্ক-শূল; মূত্রাশয়ে অশ্মরি; রক্তাক্তমূত্র।

মূত্র —উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত কিন্তু উপদাহক (irritating মূত্র; স্বল্প আঠা আঠা, রেণুসংযুক্ত, প্রচুর, অনুভব ব্যতীত পরিত্যক্ত (কষ্ট) মূত্র; শুভ্রবর্ণ রেণু অধঃপাত

মূত্রাশয়ের বেদনাপূর্ণ স্পর্শকাতরতা ও স্পর্শবেগ; উপবিষ্ট অবস্থায় বিন্দু বিন্দু মূত্র পাত; দাঁড়াইলে বিমুক্তভাবে মূত্র স্রাব; মূত্রমার্গ হইতে বায়ু নিঃসরণ।

মূত্রে কিংবা শিশুর শয্যাবস্ত্রে রেণু; মূত্র-ত্যাগের পূর্বে ও মূত্রত্যাগ-কালে শিশুর চিৎকার (বোরা লাইকো)।

শীতলতা, আর্দ্র-কাল, অথবা পারদ সেবন বশতঃ অবরুদ্ধ প্রমেহ, তৎপরে আমবাত।

বায়ু-শূল কিংবা বৃক্ক-শূল; দক্ষিণ বৃক্ক (kidney) হইতে নিম্নাভিমুখে নিদারুণ বেদনা (লাই)

জননাঙ্গের অসহ্য দুর্গন্ধ; পাতলা রেতঃপাত; রক্তাক্ত শুক্র-স্রাব (লিড, মার্ক)।

স্তন-বৃন্তের সংহরণ (retraction), স্তনদ্বয় ক্ষুদ্র, শুষ্ক ও উত্তেজনা শূন্য (সিপি)

বাত, পারদ বা অবরুদ্ধ প্রমেহের পর অস্থি-বেদনা· রাত্রিতে, আর্দ্রকালে, অথবা জলে থাকিয়া কার্য্য করাইলে বেদনার আধিক্য

ঋতু-কালে কপালে কণ্ডুয়নশীল উদ্ভেদ (ইউজি স্ট্যান, সোরি)।

হাত-পায়ের চর্ম্মের বিদারণ; বেদনা ও জ্বালা, বিশেষতঃ হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের পার্শ্বের চর্ম্মের কঠিনতা ও দৃঢ়তা।

সম্বন্ধ।—(১) মার্ক ও সিপির সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ, ইহার যে কোনটী

সর্দার পক্ষে ভাল খাটে (২) বার্ব্ব, আইকো, ছোট মত ? গের সহিত সার্দার তুলনা হয় (৩) পারদ অপব্যবহারের পর প্রায়শঃ ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে

সিকেলি

(Secale Cornutum)

ক্ষীণা, দুর্ব্বলা, শীর্ণা, শরীর বিকারবিশিষ্টা নারী ; উত্তেজনশীল স্নায়বীয় প্রকৃতি ; ভস্মবৎ পাণ্ডুর, নিমগ্ন মুখাবৃত্তির পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী

অতি বৃদ্ধ, জীর্ণ ও ক্ষীণ ব্যক্তি।

পেশী-তন্তুর অতিশয় শিথিলতা বিশিষ্ট নারী শরীরের প্রত্যেক বস্তুরই অলগ্ন ও উন্মুক্ত বোধ হয়, ক্রিয়াশূন্যতা, রক্তবহা নাড়ীর শোণিততা (vessels ... ly); অধিক রক্তস্রাব, পাতলা, কাল জলবৎ রক্তের প্রচুর প্রবাহ রক্ত পুনঃ বিনষ্টতা

রক্তস্রাব-প্রবণ শারীরিক প্রকৃতি ; গর্ভস্রাব মাঝে উপস্থিত সপ্তাহ পর্যন্ত রক্ত-পাত (স্যাক ফস), দূষিত তরল রক্তস্রাব, উহার প্রবল পচন ও বণতা ; অঙ্গ ঝাঁঝি লাগার মত অনুভব ও অতিশয় দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী রক্তস্রাবাদি বশতঃ এই দুর্ব্বলতার অনুৎপত্তি।

হরিৎ, কপিল, দুর্গন্ধ প্রদর স্রাব

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বেদনাবিশিষ্ট, সবুজবর্ণ, পূযাধার স্ফোটক ; অতি ধীরে ধীরে উহার পক্কতা ও আরোগ্য প্রাপ্তি ; ইহা বড়ই দৌর্ব্বল্যজনক

রাক্ষসবৎ অস্বাভাবিক ক্ষুধা, অবসাদকর অতিসার সত্ত্বেও ক্ষুধা, লেমনেড ও অম্লদ্রব্য সেবনের আকাঙ্ক্ষা

অনিচ্ছায় নিঃসৃত প্রভূত, জলবৎ, পচা, কপিশ, অতি সবেগে বিনির্গত (গ্যাম্ব, ক্রোট), অতিশয় অবসন্নতা-জনক ; মূত্র বিলুপ্তি সংযুক্ত ; মলদ্বারের বিস্তৃত বিমুক্ততা বিশিষ্ট (এপিস, ফস) ; অতিসার।

বৃদ্ধাদিগের অবারিত মূত্র, বর্ণশূন্য জলবৎ রক্তাক্ত মূত্র।

শরীরের সকল অংশে জ্বালা বোধ হয় যেন গাত্রে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ পতিত হইতেছে (আর্স)

ত্বক্ বিশেষতঃ মুখ-বিবরের চর্মাদির পাণ্ডুবর্ণ, নিস্তেজতা, বিকৃতি; গাত্রচর্মের শীতলতা অথচ আবৃত থাকিতে অনিচ্ছা ওলাউঠায় পতনাবস্থা

শুষ্কাঙ্গ স্থানে অস্রাবী গ্যাংগ্রিন; বাহোত্তাপে উহার বৃদ্ধি

বৃহৎ কালশিরা রক্তপূর্ণ ফোস্কা; প্রায়শঃ গ্যাংগ্রিনের সূচনা।

স্পর্শে গাত্র-ত্বকের শীতলতা, অথচ রোগী গাত্রের আবরণ সহ্য করিতে পারেন না; ত্বকে বরফবৎ শীতলতা

অনিয়মিত প্রভূত, মলিন তরল পদার্থস্রাবী, উদরে প্রসব-বেদনাবৎ প্রচাপনকর বেদনা বিশিষ্ট; পরবর্তী ঋতু-কাল পর্যন্ত ক্রমাগত জলবৎ রক্তস্রাব সংযুক্ত; ঋতু।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে (স্রাব); অনেকক্ষণ স্থায়ী, কুন্থন-জনক, বলপূর্বক নিঃসরণবৎ বেদনা

অনিয়মিত; অতিদুর্বল; ক্ষীণ বা নিরস্ত; এসব বেদনা, সকলই অলস ও বিযুক্ত বোধ হয়, কিন্তু নিঃসারণী ক্রিয়া (expulsive action) দৃষ্ট হয় না; মূর্চ্ছা।

অতিরক্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী; অতীব যন্ত্রণাপ্রদ প্রসবান্তিক বেদনা; জরায়ুর বালি-ঘড়ির ন্যায় অথবা ডমরুবৎ সঙ্কোচন (hour-glass contraction)

ক্ষীণা, শীর্ণা, অবসন্না স্ত্রীদিগের স্তনদুগ্ধের বিলুপ্তি; স্তন উপযুক্তরূপে দুগ্ধ-পূর্ণ হয় না

ক্ষুদ্র, দ্রুত, অতি ক্ষীণ ও সচরাচর সবিরাম দোষযুক্ত, নাড়ী

উপচয় উত্তাপে; ও আবরণের উষ্ণতায়; আক্রান্ত সকল স্থানের সকল রোগেই উত্তাপে; বৃদ্ধি।

উপশম। শীতল বায়ুতে, শীতল হইলে; আক্রান্ত স্থান অনাবৃত করিলে; ও মর্দনে; হ্রাস।

সম্বন্ধ —(১)আর্সেনিকের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ, শীতোত্তাপের বিপরীত প্রকৃতি। (২) ওলাউঠায় কপ্চিমকের সহিত সাদৃশ্য (৩) প্রাসবান্তিক রক্ত-স্রাবে সিনেমনের সহিত সমগুণ সম্বন্ধ (৪) সিকেলি প্রসব-বেদনা বর্দ্ধিত করে; রক্তস্রাবের প্রভূততা ও সাংঘাতিকতা নিবারণ করে, ইহা স্থাপদে ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু আর্গটের (এলোপ্যাথিক) ব্যবহা সর্ব্বদাই বিপজ্জনক

সিড্রন।

(Cedron)

নারী; স্নায়বীয়, উত্তেজনশীল ধাতু, ও ভোগসুখাসক্ত প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের পক্ষে সিড্রন বিশেষ উপযোগী

রমণান্তে স্নায়বীয় অবসাদন, ও কোরিয়ার আক্রমণ স্ত্রীলোকে উহার সমধিক স্পষ্টতা। রমণান্তে দুর্ব্বলতা, পুরুষদিগের পক্ষে উহার স্পষ্টতা)।

একদিন পর একদিন পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় সবমন শিরঃপীড়া (প্রতিদিন, ষ্ট্যাট)।

অঙ্গে ছেদন ও স্পন্দনকর বেদনা

ঋতুকালে মুখ-বিবর ও জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা, অতিশয় পিপাসা, অপস্মার, যে দিন প্রথম ঋতু নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হয় ঠিক সেই দিনে অপস্মারের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায় প্রতি ঋতু-কালেই নিয়মিতরূপে টঙ্কার উপস্থিত হয়।

ঋতুর পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে প্রতিমাসে নিয়মিতরূপে শ্বেতপ্রদরের উপস্থিতি (কালী-কা), ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেত-প্রদর (কক)

ঋতুর পরে প্রভূত লালা-স্রাব।

কুইনাইন জনিত কর্ণ-নাদ সিড্রন সেবনে নিবারিত হয়।

ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায় ঠিক একই সময়ে জ্বরের উপস্থিতি।

উপচয় —সঞ্চলনে শীতের প্রত্যাবৃত্তি, ঝড়ের পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

উপশম —উষ্ণ পেয় দ্রব্যে; ও উষ্ণ গৃহে, হ্রাস

সিনা।

(Cina)

রুক্ষ কেশ, খিটখিটে স্বভাব, কোলে চড়িয়া বেড়াইবার ইচ্ছা, অথচ উহাতে অনুপশম; স্পর্শ করিতে দিতে ও কাহাকেও কাছে আসিতে দিতে অনিচ্ছা; আদর করিয়া গায় হাত বুলাইলে বিরক্তি; অনেক বস্তু চাওয়া, কিন্তু সেগুলি দিলে না লওয়া (এন্ট-টার্ট, ব্রাই ক্যাম, ষ্ট্যাফ), অস্বচ্ছন্দতা, যাতনাযুক্ততা; সকল সময় নাক খুঁটা ও বালিশে বা ধাত্রীর স্কন্ধে নাকঘষা (ম্যারম); নিদ্রা হইতে জাগিয়া করুণ ক্রন্দন; নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠা ও চিৎকার করা; দাঁত কড়মড় করা (সিকু স্পিজি); ক্রিমি (ম্যারম)

পাণ্ডুর বদন; মুখের ও চোখের চারিদিকের রুগ্ন আকৃতি; এক গাল লাল আর এক গাল ফেকাসে (ক্যাম)।

কুক্কুরবৎ ক্ষুধা, পূর্ণ আহারের একটু পরেই আবার ক্ষুধা, মিষ্ট দ্রব্যের স্পৃহা ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা, মাতার স্তনপানে অনিচ্ছা।

কাস; হাঁচি সংযুক্ত শুষ্ক কাস; প্রাতে আক্ষেপিক, গল-রোধকর কাস; প্রতি বসন্ত বা শরৎকালে প্রত্যাবৃত্ত কাস কাসের আবেশ উপস্থিত হয় বলিয়া শিশুর কথা বলিতে বা নাড়িতে চাড়িতে আশঙ্কা (ব্রাই)।

ত্যাগকালে মূত্র ঘোলা থাকে, খানিকক্ষণ থাকিলে দুধের মত, ও অর্দ্ধনিরেট হয়। শ্বেত ও ঘোলা; অনিচ্ছায় নির্গত মূত্র

স্নায়বীয়, দুর্বল গণ্ডমালাধাতু-দুষ্ট বালক ব্যক্তিদিগের সবিরাম জ্বর।

উপচয়।—রাত্রিকালে

সম্বন্ধ—(১) শিশুদিগের উপযোগিতায় এন্ট-ক্রুড, এন্ট-টার্ট, ব্রাই, ক্যাম, ক্রিয়ো, সিলি, ষ্ট্যাফের সহিত সিনার সমগুণ সম্বন্ধ (২) হুপিং-কাসে ড্রসেরা সেবনে উগ্রতর লক্ষণগুলির শান্তি আসিলে সিনা ব্যবহৃত হয়। (৩) সর্দ্দি লাগিয়া স্বর বিলুপ্ত হইলে একন ফস, ও স্পঞ্জিয়া ব্যর্থ হইলে সিনা দ্বারা উপকার দর্শে (৪) যুবকদিগেরপক্ষে যখন অন্যান্য ঔষধ প্রয়োজিত হয় তখন বালকদিগের রোগে বহুব্যাপক ঔষধ স্বরূপ সিনার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা উচিত

(৫) সিনা ব্যবস্থেয় বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াও তদ্দ্বারা কৃমি রোগে উপকার না দর্শিলে কখন কখন স্যান্টোনাইন প্রয়োগে আরোগ্য জন্মে (মেনস, স্পাও)

সিপিয়া।

(Sepia)

মলিনবর্ণ চুল, 'দৃঢ়' দেহ-তন্তু, কিন্তু মৃদু ও শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট (পাল্স) ব্যক্তিদিগের পক্ষে সিপিয়া উপযোগী

স্ত্রীলোকের রোগে বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়, প্রসূতাবস্থায় ও স্তন্যদান কালে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় সেই সকল রোগে, অথবা আকস্মিক অবসাদ ও শ্রান্তিসংযুক্ত রোগে (মিউরেক্স, নক্স-ম) সিপিয়া ব্যবহৃত হয়।

সিপিয়া "রজকের ঔষধ," অর্থাৎ কাপড় ধৌত করিবার পরে যে সকল অসুখ জন্মে বা বৃদ্ধি পায় তাহাতে এই ঔষধ প্রয়োজিত হয়

অন্যান্য স্থান হইতে পৃষ্ঠে বেদনার প্রসারণ (স্যাবাইনার বিপরীত) উহার সহিত কম্প (শীত, পালস)

শীতল বায়ুতে সবিশেষ অনুভূতি, সহজে শীতোৎপত্তি শারীরিক উত্তাপের অসদ্ভাব, বিশেষতঃ পুরাতন রোগে (তরুণ রোগে, লিডম)।

ভিজিবার পরে; উত্তাপ বা শীতের আতিশয্য হইতে, গাড়ীতে চড়িলে, ভজনালয়ে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিবার সময়, সহজে মূর্চ্ছার উৎপত্তি।

ঋতু-কালে; গর্ভাবস্থায়, স্তন্যদান-সময়ে, এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, অতিসার, অর্শ, প্রদর ও জরায়ুর রোগ সহযোগে; অভ্যন্তরদেশে একটা গোলার ন্যায় অনুভব।

শিরঃপীড়া সহকারে মস্তক-শিখরে শীতলতা (ভিরে —উত্তাপ, ক্যাল্ক, গ্রাফ, সলফ)। অতিশয় পেটুকতা (লাই)

ভয়, বমনে ও মস্তকের উপর উত্তাপাবেশ সহকারে; প্রকৃত বা কল্পিত বিপদ সম্বন্ধে; সন্ধ্যার প্রাক্কালে, উৎকণ্ঠা।

অতিশয় বিমর্ষতা ও বিলাপ। জরায়ু-রোগ সহকারে একাকী থাকিতে আশঙ্কা (লোকের ভয়; বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভয়।

আপনার পরিবার, কার্য্য-কর্ম্ম (কেন্ট-গ্রিস মস-কাস) ও প্রিয়তম ব্যক্তিদিগের প্রতি; ঔদাস্য

(বোভা ও ফ্লোর এসি) আলস্য, কার্য্য বা ক্রীড়া করিতে, এমন কি কোন বিষয় চিন্তা করিতে মন করিতেও অপ্রবৃত্তি

ঋতু-কালে স্বল্প রজ-স্রাবসহ, হিষ্টিরিয়া প্রবণতা, অনুভূতি-প্রবণ, সুকুমারী নারীদিগের; স্পন্দন বা বিদারণবৎ; ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া নড়িলে চড়িলে মস্তক অবনত করিলে, ও মানসিক পরিশ্রমে উহার বৃদ্ধি এবং বাহ্যিক চাপ-প্রদানে ও ক্রমাগত সবলে সঞ্চালনে উহার হ্রাস

পুরাতন শিরঃপীড়ার পরে অথবা রজোনিবৃত্তিকালে অতিশয় কেশপতন।

মুখমণ্ডলের, ও চক্ষুর শ্বেতমণ্ডলের পীতবর্ণ, বক্ষঃস্থলে পীতবর্ণ চিহ্ন; গণ্ডদ্বয় ও নাসিকার ঊর্দ্ধভাগের অনুপ্রস্থে ঘোড়ার জিনের অনুরূপ পীতবর্ণ দাগ; জরায়ু-রোগ জ্ঞাপক বদন।

গলবস্ত্র অত্যন্ত দৃঢ় বোধ হয়, সর্ব্বদাই উহা ঢিলা করিয়া দিতে হয় (ল্যাক)।

শরীরের উপরিভাগে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে হার্পিজ সার্সিনেটস্ (দদ্রু বিশেষ) (সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত অঙ্গুরীর আকার দদ্রু, টেলু)

উদরোর্দ্ধ স্থানে কষ্টপ্রদ শূন্যতা, "যেন কিছুই নাই" এরূপ অনুভব আহার করিলেও উহার অনুপশম (চেলি, মিউরেক্স, ফস)

জননীদিগের স্থূলোদরতা (বালক-বালিকাদিগের সল্ফ)।

জিহ্বার মলিনতা কিন্তু প্রত্যেক ঋতু-কালে উহার পরিচ্ছন্নতা ঋতু-স্রাবের বিরতির পর পুনরায় উহার প্রত্যাবৃত্তি, নিম্ন ওষ্ঠের স্ফীততা ও বিদারণ

কোষ্ঠ-কাঠিন্য:—গর্ভাবস্থায় (এলম); শক্ত, গ্রন্থিল, বর্ত্তুলাকার, অপ্রচুর, আয়াসে নিঃসারিত, মল; মলত্যাগকালে ও তৎপরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মলদ্বারে বেদনা (নাই-এসি, সল); মলদ্বারে ভার বা বর্ত্তুলবৎ অনুভব, মলত্যাগেও উহার অনিবৃত্তি

মূত্র।—মূত্রের লোহিতাভ, কর্দ্দমবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ, উহা আধার পাত্রে লাগিয়া থাকে, দেখিলে বোধ হয় যেন দগ্ধ হইয়াছে; মূত্রের এত দুর্গন্ধ যে উহা গৃহে রাখিতে পারা যায় না (খানিকক্ষণ থাকিলে দুর্গন্ধ, ইণ্ডিয়ম)।

শয্যা-মূত্র, শিশু নিদ্রিত হইবামাত্র শয্যা ভিজাইয়া ফেলে (ক্রিয়োজ),

প্রথম-নিদ্রাকালে শয্যায় মূত্র-ত্যাগ

লালা-মেহ (গ্লীট); বেদনা-শূন্য, পীতাভ, বস্ত্র চিহ্নকর স্রাব; পাতে মূত্র-দ্বারের মুখের সংযোজনা, দুর্দ্দম্য, দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ (কালি আইওড) জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা

যোনিতে ঊর্দ্ধদিকে প্রবল সূচীবেধবৎ যাতনা; জরায়ু হইতে নাভী পর্য্যন্ত ছুরি দিয়া কর্ত্তনের ন্যায় বেদনা

জরায়ু ও যোনির বহির্গমন; প্রচাপন ও আবেগ, যেন বস্তি-গহ্বর হইতে সকলই বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভব; উহা নিবারণ করিবার জন্য উরুর উপর উরু রাখিয়া বসিতে হয়, উহার সহিত শ্বাস কষ্ট থাকে (এগারি, বেল, লিলি, মিউরেক্স স্যাপি)

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের সহিত সংসৃষ্ট, নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে বা পরে প্রকাশিত, স্বল্প বা অত্যধিক রজঃ, রজোভাব বা অতিরজঃ;—প্রায় সর্ব্বপ্রকারের রজোবৈষম্য।

গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বিবমিষা; আহার্য্য দ্রব্য দেখিলে বা উহার বিষয় চিন্তা করিলে বিবমিষার উদ্রেক (নক্স), খাদ্যদ্রব্য রন্ধনের গন্ধে বিবমিষা জন্মে (আর্স, কলচি)।

শ্বাস-কৃচ্ছ্র, উপবেশনে, নিদ্রান্তে, ও গৃহের অভ্যন্তরে উহার বৃদ্ধি, নর্ত্তনে বা দ্রুত ভ্রমণে হ্রাস

জীবনী-ক্রিয়ার বিকৃত বিবৃদ্ধি; অত্যল্পমাত্র নড়িলে চড়িলে উত্তাপাবেশ; তৎসহ উৎকণ্ঠা ও শ্রান্তি; তৎপরে সর্ব্ব শরীরে ঘর্ম্ম; নিবৃত্ত-রজস্কতা (ল্যাক, গ্র্যাফ, সলফ টিউব), বস্তি-গহ্বর-স্থিত যন্ত্র হইতে উত্তাপের উত্থিতি।

চর্ম্মের কণ্ডূয়ন; নানা অঙ্গের কণ্ডূয়ন; বাহ্য জননাঙ্গের কণ্ডূয়ন; কণ্ডূয়নে উপশম জন্মেনা, বরং জ্বালায় পরিবর্ত্তিত হয় (সলফ)।

উপচয়।—অপরাহ্ণে বা সায়াহ্নে; শীতল বায়ুতে অথবা শুষ্ক পূর্ব্বদিকের

বাতাসে; সঙ্গমাতিশয্যে; বিশ্রামে; শরৎ, শীত ও গ্রীষ্ম সময়ে; ঝড়বজ্রের পূর্ব্বে; বৃদ্ধি।

উপশম। শরীর ঢাকাতে, ঢাকা বস্ত্র প্রয়োগে, ও প্রবল শারীরিক পরিশ্রমে; কাশ। অনেক লক্ষণ বিশেষতঃ মস্তক, হৃৎপিণ্ড ও বস্তি গহ্বরের লক্ষণ বিশ্রাম ও ব্যায়াম উভয়েই বর্দ্ধিত ও উপশমিত হয়।

সম্বন্ধ —(১) ন্যাট্রাম মিউরের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) ল্যাকেসিসের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ, ল্যাকেসিসের পূর্ব্বে ব পরে সিপিয়া ব্যবহৃত হয় না। পলসেটিলার সহিতও প্রতিকূল সম্বন্ধ, পলসেটিলার সহিত কখনও সিপিয়া পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয় না। (৩) সিলিশিয়া ও সলফারের পরে প্রায়ই সিপিয়া উপযোগী হয়। (৪) সিপিয়ার এক মাত্রার আরোগ্য-ক্রিয়া অনেক সময় বহু সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে। (৫) অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবনের মানসিক ফল এই ঔষধে নিবারিত হয়। (৬) বসিয়া বসিয়া থাকায় ও অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের কুফলে এই ঔষধ উপকারী।

সিফিলাইনম্

(Syphilinum)

অন্ধকার হইতে দিবালোক পর্য্যন্ত বেদনা; গোধূলী সময় হইতে আরম্ভ ও দিবালোকে পরিসমাপ্তি (মার্ক, ফাইটো)।

ক্রমে ক্রমে বেদনার বৃদ্ধি ও হ্রাস (ষ্টান); স্থান-পরিবর্ত্তনশীল বেদনা তজ্জন্য রোগীর বারংবার অবস্থান-পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

রাত্রিতে সমস্ত লক্ষণের আতিশয্য (মার্ক), সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

উদ্ভেদ —নিস্তেজ, আরক্ত, তাম্রবর্ণ চক্র, শীতল হইবার সময় নীলবর্ণধারণ। সর্ব্বশরীরের অত্যন্ত শীর্ণতা (এব্রাট, আইওড)।

হৃৎপিণ্ড।—রাত্রিতে হৃৎপিণ্ডের ভূমিদেশ হইতে শিখর-দেশ পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা (শিখর হইতে ভূমি পর্য্যন্ত, মোডা ; ভূমি হইতে বক্ষাস্থি বা স্কন্ধ পর্য্যন্ত, স্পিজি)

স্মৃতিহীনতা পুস্তক, ব্যক্তি ও স্থানের নাম স্মরণ রাখিতে পারা যায় না, গণিতের গণনা করায় আয়াস (difficulty) ভোগে

অনুভূতি —যেন উন্মাদ হইবে ; যেন পক্ষাঘাত জন্মিবে এরূপ অনুভব, উদাস্য অনুভব।

নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতা ভোগে বলিয়া রাত্রির ভয়ঙ্কর ভয় ; উহা সহ্য হয় না, বরং মৃত্যু শ্রেয়ঃ বোধ হয়।

জাগরণান্তে অবসন্নতাজনিত ভয়ঙ্কর যাতনার আশঙ্কা (ল্যাক)।

প্রদর ; প্রভূত স্রাব, নেকড়া ভিজিয়া, গুড়মুড়া পর্য্যন্ত বাহিয়া পড়ে (এলম)।

স্নায়বীয় প্রকৃতির শিরঃপীড়া উহাতে রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা ও প্রলাপ ; অপরাহ্ন চারিটার সময় আরম্ভ, ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত আতিশয্য এবং দিবালোকে নিবৃত্ত (রাত্রি ১১ বা ১২ টার সময় বিবৃদ্ধি, থাই।, কেশ-পতন।

নবজাত শিশুদিগের তরুণ চক্ষু-প্রদাহ ; চক্ষুর পাতার স্ফীততা নিদ্রাকালে উহার সংযোজনা, রাত্রিতে বেদনার তীব্রতা, রাত্রি ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উহার আতিশয্য, প্রভূত পূয নিঃসরণ ; শীতল জলে প্রক্ষালনে উপশম।

, অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত।—উপরের তীর্য্যক্ পেশীর (Superior oblique) পক্ষাঘাত, চক্ষুর পাতা অবনত হইয়া থাকাতে নিদ্রিতের ন্যায় দৃষ্ট হয় (কষ্ট, গ্রাফ)।

যুগল-দৃষ্টি, এক প্রতিরূপের নিম্নে অন্য প্রতিরূপ দৃষ্ট হয়।

দন্ত।—দন্ত-মূলের প্রান্তভাগে দন্তের ক্ষয় প্রাপ্তি ও জোড়িয়া, পড়া দন্ত খর্ব্ব হইয়া যাওয়া, উহার প্রান্ত-ভাগ করাতের দাঁতের ন্যায় কাটা-কাটা ; দন্তের আকৃতির খর্ব্বতা প্রাপ্তি, অগ্রভাগগুলির একই বিন্দুর অভিমুখে গাজ (ষ্ট্যাফ)

যে কোন আকারে এলকোহল পানের আকাঙ্ক্ষা।

পিতৃদোষ জনিত মদিরা-দোষের প্রবণতা (এসাফ, সোরি, টিউবার কুল, মেড-ওরি)।

অনেক বৎসর ব্যাপী উগ্র মূত্র-কৃচ্ছ, মূত্রনালী সংকুচিত (strictures) দ্বারা অবরুদ্ধবোধ হয়, কিন্তু রাত্রি দিনে মূত্র নিঃসরণের যাতনা প্রসব-বেদনার ন্যায় অনুভূত হয় (ক্যাক-ক্যা, টিউব)

মলদ্বারে ও মলনালে বিদারণ (fissures) (থুজা); মলদ্বার বাহির হইয়া পড়া, উহা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব, রোগের দুর্দম্যতা।

অধঃ-সন্ধি, বা স্কন্ধের ত্রিকোণ পেশীর (deltoid) সংযোগ-স্থলে আমবাত, বাহু পার্শ্বের দিকে উঠাইলে উহার আধিক্য (রাসটক্স।—দক্ষিণ স্কন্ধ, স্যাঙ্গ, বাম, ফির)

উপদংশজ রোগে অত্যন্ত নির্বাচিত ঔষধেও স্থায়ী উপশম বা উপকারের অভাব

উপদংশগ্রস্ত যে সকল রোগীর কঠিন উপদংশ (chancre) স্থানিক ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসিত হইয়াছে এবং উহার ফলস্বরূপ যাহারা অনেক বৎসর পর্যন্ত নানা প্রকার রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছে, অন্য কোন ঔষধের সহিত সুস্পষ্ট সাদৃশ্য না থাকিলে চিকিৎসার প্রারম্ভে এই ঔষধ ব্যবহারে প্রায়ই তাহাদের উপকার দর্শে

উপচয়।—রাত্রিতে, গোধূলী সময় হইতে দিবালোক পর্যন্ত বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—অস্থি-রোগে ও উপদংশীয় পীড়ায় অরম, এসাফ, ক্যালী-আই, মার্ক, ও ফাইটোল সহিত সমগুণ সম্বন্ধ।

সিম্ফাইটাম।

(Symphytum)

ভগ্নাস্থির সংযোজনায় এই ঔষধে সুসাধ্যতা জন্মে (ক্যাল্ক-ফস); কণ্টক-বেধনবৎ বিশেষ বেদনা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; ভগ্নাস্থি সংযোগের মূল কোমল উপাদানের উৎপত্তির অনুকূলতা জন্মে

তয়াস্থির বিচ্ছেদ-স্থানের উপদাহিতা; আঘাত অস্থোগ্য প্রাপ্তির পরে অস্থি-বেষ্টের বেদনা।

ভৌতিক উপঘাত (m cha ical injuries), অস্থি-কোষকে আঘাত, দুষ্টতা, খোঁচা

স্থূল-মুখ দ্রব্যের আঘাতের পরে চক্ষে বেদনা, বরফের গোলায় চক্ষে আঘাত লাগা, মাতার চক্ষে শিশুর হাতের মুষ্টির খোঁচা (চক্ষুর চতুর্দিকস্থ কোমল বিধানতন্তুতে খোঁচা, আর্ণ)।

সম্বন্ধ —(১) আর্ণ, ক্যালেণ্ড, ক্যান্থ সস, গ্লোনি-এসি, হিপ, ও সিলির সহিত সমগুণ সম্বন্ধ। (২) কণ্টক-বেধনবৎ বেদনায় এবং উপঘাতের পরে অস্থি-বেষ্টের স্পর্শ-দ্বেষের অবশিষ্টতায় আর্ণিকার পরে সিম্ফাইটাম ভাল খাটে

সিলিশিয়া।

(Silicea)

স্নায়বীয়, কোপন-স্বভাব, রক্ত প্রধান; গণ্ডমালা-ধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে সিলিশিয়া উপযোগী।

খাদ্য দ্রব্যের গুণ বা পরিমাণের ত্রুটিবশতঃ নহে কিন্তু সমীকরণের (assimi-lation) অসম্যকতা নিবন্ধন শরীরের পরিপোষণের অভাবে অপরিপুষ্টি (ব্যারা-কা, ক্যাল্ক); এবং অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক অনুভূতি।

বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট, গণ্ডমালা-দোষ দুষ্ট, রিকেট-রোগ-গ্রস্ত বালক বালিকা; ব্রহ্মরন্ধ্র ও সেবনী সন্ধির বিমুক্ততা, মস্তকে সমধিক ঘর্ম (ক্যালকেরিয়া অপেক্ষা নিম্নতর অংশ), বাহ্যিক আবরণে মস্তক উষ্ণ রাখিবার আবশ্যকতা (সানিক), বৃহৎ উদর দুর্বল গুল্ফ হাঁটিতে শিখিতে বিলম্ব।

১ অসমুজ্জ্বল মুখাকৃতি; সূক্ষ্ম, শুষ্ক ত্বক; পাণ্ডুর মুখমণ্ডল, শিথিল পেশিবিশিষ্ট দুর্বল শরীর

পায়ের ঘর্ম্মের বিলুপ্তি (কুপ্রাম, সোরি); মস্তক বা পৃষ্ঠে শীতল বায়ু-প্রবাহ লাগান, ও দেহ-বীর্য্যের টীকা গ্রহণ (থুজা) বশতঃ রোগ; প্রথম কর্ম্মক-দিগের বহোরোগ, তৎসহ শক্তির সম্পূর্ণ-অভাব

স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপের অভাব, সর্ব্বদাই শীত, এমনকি ব্যায়াম-কালেও শীত (লিড, সিপি)

স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, কোন বর্ণনীয় কর্মার বিকৃত বিরুদ্ধ সংস্কারে অবসন্নতা; কঠিন পরিশ্রম ও আবদ্ধ থাকা বশতঃ উহার উৎপত্তি; প্রান্তি শয়ন করিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি, ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা উহার পরাভব।

কোমল বিধান-তন্তু, অস্থি-বেষ্ট অথবা অস্থি প্রভৃতির পুযোৎপত্তির প্রতি সিলিশিয়ার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, এতদ্দ্বারা স্ফোটকাদিতে পুযোৎপত্তি জন্মিয়া উহা পক্ক হয় অথচ ব্রণাদির অতিরিক্ত পূযস্রাব হ্রাস প্রাপ্ত হয়। প্রধানতঃ কোমল বিধান-তন্তুর আক্রমণ ক্যালেণ্ড, হিপ)

শিশুদিগের অবাধ্যতা; অবিমৃশ্যকারিতা, সদয়ভাবে কিছু বলিলেও ক্রন্দন (এণ্টি-টা, ষ্ট্যানম, আইওড)।

অস্থিরতা, অত্যাল্প শব্দে চমকিত হইয়া উঠে।

আকুলতা, নম্রতা সাহসহীনতা

মানসিক পরিশ্রমে অতিশয় আয়াস; লেখা পড়ায় শ্রান্তির উৎপত্তি, চিন্তা করিতে পারা যায় না।

শারীরিক উত্তাপের অভাব সর্ব্বদাই শীত বোধ, এমনকি শারীরিক শ্রমেও শরীর উত্তপ্ত হয় না

পৃষ্ঠবংশজ শিরোঘূর্ণন, গ্রীবা-পৃষ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত উহার উত্থিতি; যেন সম্মুখ দিকে পড়িতে হইবে এরূপ অনুভব, ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে শিরোঘূর্ণন (পলস।—নিম্নদিকে দৃষ্টিপাতে ক্যালমি, স্পাইজি)

যৌবনকালের কোন উৎকট পীড়ার পর হইতে পুরাতন সবমন শিরঃপীড়া (সোরি); ঘাড় হইতে মস্তকের শিখর পর্য্যন্ত উহার উত্থিতি, বোধ হয় যেন পৃষ্ঠবংশ হইতে সমাগত হইয়া এক চক্ষে, বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষে উহার স্থিতি (বাম চক্ষে, স্পাইজি); বায়ু-প্রবাহে কিংবা মস্তক অনাবৃত

ক্ষরিয়া রাখিলে উহার বৃদ্ধি ; চাপদিলে ও উষ্ণবস্ত্রে জড়াইয়া রাখিলে হ্রাস (ম্যাগ-মি, ব্রিন , প্রভৃতি সু-স্রাবে উপশম

সর্ব্বদা ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতু-কালে কোষ্ঠবদ্ধতা (ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতু-কালে অতিসার, এম-কা, বোভি) , সরলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার ন্যায় মল-ত্যাগে সরলান্ত্রের পক্ষাঘাতবৎ অতিশয় কুন্থন , মলের খানিকটা বাহির হইয়া পুনরায় ভিতরে প্রবেশ (থুজা) সরলান্ত্রে অনেকক্ষণ মলের অবস্থিতি ।

বক্ষোলক্ষণের সহিত পর্য্যায়ক্রমে গুহ্যভ্রংশ (বার্ব্ব, ক্যাল্ক-ফ)

প্রত্যেকবার সন্তান স্তন-পান কালে অপত্য-পথ হইতে রক্ত-স্রাব (ক্রোট-টিগ তুলনা করুন)

স্তন-বৃন্ত থলির আকারে আকৃষ্ট হয় (সার্স)

স্বপ্ন-সঞ্চরণ (নিশিপাওন), নিদ্রিত অবস্থায় উঠিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ, অনন্তর পুনরায় শয়ন (কালী-ব্রোম)

অস্বাস্থ্য ত্বক ; প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপঘাতে পূযোৎপাত (গ্রাফ, হিপ, মার্ক, পেট্রো) ।

হস্ত ও পদের অঙ্গুলীর নখের পঙ্গুতা (এন্ট-ক্রু)

পা অনাবৃত রাখিলে শর্দ্দি লাগে (কোনা, কুপ)

হাত, পা, পায়ের অঙ্গুল এবং কক্ষ-তলের ঘর্ম্ম ; দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম ।

প্রতিদিন সায়াহ্নে ঘর্ম্মবর্জ্জিত পদদ্বয়ের ক্ষয়, পচামাংসের ন্যায় অসহ্য দুর্গন্ধ ।

ম্যাগ্নিটাইজড্ হইবার (অয়স্কান্ত-শক্তি-সঞ্চারের) ইচ্ছা, উহাতে উপশম (ফস) ।

বিধান-তন্ত্র হইতে মাছের কাঁটা, সূচী, হাড়ের চোঁচ প্রভৃতি শৈল্য নিষ্কাশনে এতদ্দ্বারা সহায়তা হয়

অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির নালী ক্ষত কুণী (ম্যাগ-ফস, মারম) ; আঙ্গুল-হাড়া । রক্ত-স্ফোটক ; কার্ব্বঙ্কল ; সকল প্রকার ক্ষত নালী-ক্ষত, উহাতে বেদনা, দুর্গন্ধ, উচ্চ পাশুর প্রান্ত (high spongy odgos), ও মাংসাঙ্কুর ; মল-দ্বার-বিদারণ (গুহ্য-বিদারী), মলত্যাগান্তে অতিশয় যাতনা ।

গ্রীবা, কণ্ঠ, কর্ণ স্তন, বক্ষ প্রভৃতির গ্রন্থির প্রদাহ ও পূযোৎপত্তি

উপচয় —শীতলতায় ঋতু-কালে, অমাবস্যার সময়ে; অনাবৃত হইলে, বিশেষতঃ মস্তক অনাবৃত রাখিলে এবং; শয়ন করিলে বৃদ্ধি।

উপশম —উষ্ণতায় বিশেষতঃ মস্তকে বস্ত্র জড়াইলে, আমাশয়িক লক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লক্ষণের উপশম আমাশয়িক লক্ষণ শীতল আহারে বর্দ্ধিত হয় (কাট)

সম্বন্ধ।—(১) থুজা ও স্যানিকিউলার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) সিলিশিয়ার পরে লাইকো, সিপি, ফ্লোরিক এসিড ও হিপার ভাল খাটে (৩) সিলিশিয়ার সহিত হিপ, পিক-এসি, কাল্‌-ফস, হাইপার ষ্টটা, স্যানিকিউ, ও গেটিসবর্গের তুলনা হয় (৪) ক্যাল্ক, গ্রাফ, হিপ নাই-এসি, ও ফসের পরে সিলি ভাল খাটে। (৫) তরুণ অবস্থায় পলস ও পুরাতন অবস্থায় সিলির সাদৃশ্য-সম্বন্ধ

সেলেনিয়াম।

(Selonium)

সুন্দর মুখাকৃতি। এবং বদন, হস্তদ্বয়, ও উরুদ্বয় পদদ্বয়, ও এক এক অঙ্গের শীর্ণতা।

কার্য্যে অতিশয় বিস্মৃতি, কিন্তু নিদ্রাকালে স্বপ্নে উহার স্মরণ।

শিরোবেদনা —মদিরাপায়ীদিগের শিরোবেদনা; ব্যভিচারের পর; লেমনেড, চা ও সুরাপানের পর, প্রতিদিন অপরাহ্ণে; শিরঃপীড়া

মস্তক, ভ্রূ, গোঁফ, ও জননাঙ্গের কেশ-পতন

প্রতিশ্যায়ের অতিসারে পরিসমাপ্তি।

রাত্রিতে ক্ষুধা (সিনা, সোরি,); উগ্র মদিরা পানের স্পৃহা, প্রায় অদম্য আকাঙ্ক্ষা

কোষ্ঠবদ্ধতা। শক্ত, অবরুদ্ধ মল, হাতদিয়া বাহির করিতে হয়

(এলো, ক্যাল্ক ফ্যানিকিউ, সিপ, সিলি), গুরুতররোগে, বিশেষতঃ আন্ত্রিক (enteric) জ্বরের পর উহার উৎপত্তি

মূত্র।—লোহিত, মলিন, স্বল্প ; ও স্থূল, লোহিত, রেণুময় অথবা তিক্ত পদার্থ বিশিষ্ট মূত্র, বিচরণ-কালে অনিচ্ছায় বিন্দু বিন্দু মূত্র পাত

লিঙ্গ সংযুক্ত ধ্বজভঙ্গ, কামুকীয় চিন্তা, কিন্তু শারীরিক অসামর্থ্য (আকস্মিক ধ্বজভঙ্গ, ক্লোর)।

ধীর, অপ্রচুর উদগম অনেকক্ষণ স্থায়ী পুলক সহকারে অতিদ্রুত শুক্রপাত ; সংসর্গের পর দুর্বলতা, বদমেজাজ, প্রায়শঃ অনিচ্ছায় বিন্দু বিন্দু শুক্র ও প্রষ্টেটিকরসের নিঃসরণ এবং উপবিষ্ট অবস্থায়, মলত্যাগ-কালে ও নিদ্রাকালে, উহার ক্ষরণ ; লালা-মেহ (gleet (ক্যালাড)।

কাম-প্রবৃত্তি পরিশূন্য প্রবল লিঙ্গোদগম, লিঙ্গমুণ্ডের উপরের দিকে আকৃষ্টতা (বার্ব নীচের দিকে আকৃষ্টতা, (ক্যাস্থ)

স্বর-নাশ (aphonia) —অধিকক্ষণ স্বরের ব্যবহারের পর স্বর-নাশ ; গান করিতে আরম্ভ করিবার সময় স্বরের ভগ্নতা ; পুনঃ পুনঃ গলা পরিষ্কার করিয়া স্বচ্ছ শ্বেতসারায় শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে হয় (আর্জ্জ-মে, ষ্ট্যাণ) টিউবারকিউলার ল্যারিঞ্জাইটিস।

দৌর্বল্য, সহজে অবসন্নতার উৎপত্তি ; মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম জন্য, টাইফয়েড, টাইফস বা অমিত চারের পরে উহার উদ্ভব।

শুইয়া থাকিবার ও নিদ্রা যাইবার দুর্নিবার ইচ্ছা ; সহসা শক্তির বিলোপ ; বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে

উষ্ণ শীতল অথবা আর্দ্র সকল প্রকার বায়ুর প্রবাহেই অতিশয় অপ্রবৃত্তি।

টাইফয়েড জ্বরের পর মেরুদণ্ডের অতিশয় দুর্বলতা, শয্যাক্ষত জন্মিবার আশঙ্কা

রোগাক্রান্ত স্থানের শীর্ণতা প্রাপ্ত

উপচয় —বায়ু-প্রবাহে ; সূর্য্যের তাপে, এবং লেমনেড, চা বা সুরাপানে ; বৃদ্ধি।

উপশম —মুখে শীতল জল বা শীতল বায়ু গ্রহণে ; হ্রাস

সম্বন্ধ।—(১) জনন ও মূত্র-যন্ত্রের লক্ষণে, এবং শ্বাস-যন্ত্রের লক্ষণে ফস্ফরাসের সহিত; গায়ক ও বক্তাদের স্বরযন্ত্র-প্রদাহে আর্জ্জেন্টম ও ষ্টানমের সহিত; এবং কঠিন মল, নিশ্চেষ্ট মলদ্বার লক্ষণে এলুমেনার সহিত সেলেনের তুলনা হয়। (২) ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যে ক্যালাডি, ষ্ট্যাফি, ও ফস-এসিড পরে সেলেন ভাল খাটে (৩) পানদোষে উত্তেজক ঔষধ বা মদ্যক দ্বারা পীড়া জন্মিয়া গেলে অনেক সময়ই সেলেনের প্রয়োজন পড়ে

সোরিণম।

(Psorinum)

সোরা ধাতু দুষ্ট-ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী

পুরাতন রোগ-চিকিৎসায় যখন সুনির্ব্বাচিত ঔষধে কোন উপকার বা স্থায়ী ফল দর্শে না (তরুণ রোগে সালফ) এবং যখন রোগীতে সল্ফার উপযোগী মনে হয় কিন্তু সল্ফার ব্যবহারে কোনও ফল পাওয়া যায় না

তরুণ রোগের ভয়ঙ্কর আক্রমণের পরে প্রতিক্রিয়ার অভাব।

পাণ্ডুর, সুকুমার ও রুগ্ন শিশু। শিশু রুগ্ন অবস্থায় দিবরাত্রি কোনও সময় ঘুমায় না, কেবল জ্বালাতন করে, খিট খিট করে ও ক্রন্দন করে (জ্যালাপ); সুস্থ প্রকৃতির বালক বালিকা, সারাদিন খেলা করে; অশান্ত, বিরক্তিপ্রদ, সারারাত্রি চিৎকার কারী শিশু (লাইকোর বিপরীত)

শারীর-রসের ক্ষয় বশতঃ; তরুণ রোগের পরবর্ত্তী শারীরিক যন্ত্রাদির বিকার ব্যতীত বা স্বয়ম্ভূত, অথবা দৃশ্যমান কোনও কারণ ব্যতীত; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও গ্লানি

স্নান করা সত্ত্বেও শরীরে দুর্গন্ধ

সমগ্র দেহের বেদনা, সহজেই শরীর ঘৃষ্ট ও আঘাতিত হইয়া থাকে।

শীতল বায়ুতে বা বাতাতপের পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত অনুভবাধিক্য প্রখর গ্রীষ্মকালেও পশমের টুপী, ওভার কোট বা শাল ব্যবহার

ঝড়ের সময়ের তীব্রতানুভব ; ঝড় বজ্রকালে বা উহার কতক দিবস পূর্ব্ব হইতেই অস্থিরতা বোধ (ফস) ; গ্রীষ্মকালে অন্তর্হিত ও শীতকালে প্রত্যাবৃত্ত শুষ্ক, সশল্ক উদ্ভেদ।

পাঁচড়া বা অপর কোনও চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া নানাবিধ উপসর্গ উৎপন্ন হইলে এবং মলকার ব্যবহারে উপশম না হইলে ; সংসামান্য মানসিক আবেগে emotion) উৎপন্ন ভয়ানক, রোগ

রোগাক্রমণের পূর্ব্বদিন অস্বাভাবিকরূপ ভাল বোধ।

তীব্র সোরা বিষ-দুষ্ট রোগী ; স্নায়বিকতা, অস্থিরতা, সহজেই চকিততা।

অতিসার, প্রদর, ঋতু, ঘর্ম্ম প্রভৃতি সকল স্রাবেরই শবের ন্যায় দুর্গন্ধ।

উৎকণ্ঠা, ভয়পূর্ণতা, পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ।

ধর্ম্মবিষয়ক বিষণ্ণতা ; অত্যন্ত অবসাদ, আত্মহত্যার দুঃখ জনক চিন্তা ; মুক্তি সম্বন্ধে (মেলি) ও আরোগ্য সম্বন্ধে নৈরাশ্য

হতাশা।— রোগী মরিয়া যাইবে বলিয়া এবং তাহার কারবারে লোকসান হইবে বলিয়া ভীত হয় ; রোগের চরমকালে হতাশা ; নিজের জীবন ও তাহার আত্মীয় স্বজনের জীবন দুঃসহ করিয়া তোলা।

তীব্র কণ্ডূয়ণ সহকারে আরোগ্যাশা পরিশূন্যতা।

শিরঃপীড়ার পূর্ব্বে চক্ষুর সম্মুখে ঝিলমিলি দর্শন, দৃষ্টির ক্ষীণতা বা অন্ধতা (ল্যাক-ডি, কালী-বাই) ; কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু অথবা মণ্ডল দর্শন

শিরোবেদনার সময়ে সর্ব্বদাই ক্ষুধাবোধ ; আহারকালে বেদনার হ্রাস ; উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া অথবা ঋতু বন্ধ হইয়া শিরোবেদনা ; নাসিকা হইতে রক্ত পাতে বেদনার হ্রাস (মেলি)।

শুষ্ক, চাকচক্য পরিশূন্য, সহজেই জড়াইয়া যায়, জটা বাঁধিয়া যায় (লাই) রূপ, চুল। কেশ রোগ (Plica polonica পোল্যাণ্ড দেশীয় কেশ-রোগ বিশেষ) (ব্যারা, সার্স, টিউব)।

শুষ্ক, সশল্ক-বা আর্দ্র, দুর্গন্ধ, পূয-পূর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট, মস্তক-ত্বক ; পীড়কা হইতে একপ্রকার আঠা আঠা, দুর্গন্ধ রসক্ষরণ (গ্রাফ, মেজ)।

অক্ষি-পুটের প্রদাহ সংযুক্ত তীব্র আলোক-দ্বেষ, চক্ষু মেলিতে অসামর্থ্য; বালিশে মুখ গুঁজিয়া শয়ন।

কর্ণ।—কানের উপরে ও পশ্চাতে আর্দ্র ফুস্কুড়ি এবং অবদরণ, দুর্গন্ধ আঠা আঠা স্রাব নিঃসরণ (গ্রাফ)।

কর্ণস্রাব।—পাতলা, রসানির মত, পচামাংসের ন্যায় ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ স্রাব; হাম বা স্কার্লেটিনার পরবর্ত্তী পুরাতন কর্ণস্রাব।

ব্রণ।—সাধারণ ও গোলাপী সকল প্রকারের, ঋতুকালে, কফি, চর্ব্বি, চিনি ও মাংসে উপচয়। সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও যখন উপকার হয় না বা ক্ষণিক উপশম জন্মায়।

মধ্য রাত্রিতে ক্ষুধানুভব; কিন্তু না খাইয়া পারা যায় না (সিনা সলফ)।

পচা ডিমের গন্ধ বিশিষ্ট উদ্গার (আর্ণ, এণ্টিম-টা গ্রাফ)

তালুমূল-প্রদাহ (Quinsy), টনসিলের অতিশয় স্ফীততা; গিলিতে কষ্ট ও বেদনা; জ্বালা ও দগ্ধবৎ অনুভব; গিলিবার সময় কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত, কর্ত্তন ও ছেদনবৎ তীব্র বেদনা (বেদনা শূন্য, বা নাকা, ; প্রভূত, দুর্গন্ধ লালা; গলায় শক্ত লেগা, অবিরত থক্ থক্ করিতে হয়। এই ঔষধ এই রোগের তরুণ আক্রমণেই যে কেবল উপশমপ্রদ এমন নহে, তালুমূল-প্রদাহ-প্রবণতার মূলোচ্ছেদেও এই ঔষধ কার্য্যকারী।

শবগন্ধি নিশ্বাস, মটরের আকারের, পনীরের ডেলারমত দলাদলা শ্লেষ্মা থক্ থক্ করিয়া কাসিয়া উঠাইতে হয় (কালী-মি)

অতিসার।—সহসা, প্রবল (এলো, সলফ); জলবৎ কপিশবর্ণের, পচা, শবেরমত গন্ধ বিশিষ্ট মল; অনিচ্ছায় নির্গত, রাত্রি ১টা হইতে ৪টার মধ্যে উপস্থিত; সাংঘাতিক তরুণ রোগের পরবর্ত্তী; দন্তোদ্গমকালে; বালক বালিকাদিগের ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় অতিসার।

কোষ্ঠবদ্ধ।—কটিবেদনাসহকারে, দুর্দ্দমনীয়; সরলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা বশতঃ সমুৎপন্ন; কোষ্ঠকাঠিন্য; সলফার বিফল হইলে এই ঔষধে উপকার হয়।

মূত্রাশয়ের আংশিক পক্ষাঘাত বশতঃ পূর্ণিমার সময়ে উপস্থিত, এক্জিমা-রোগে আক্রান্ত পারিবারিক ইতিবৃত্ত সম্বলিত দুর্দ্দমা, অবারিত মূত্র

বহুবৎসরের পুরাতন প্রমেহ, উহা আরোগ্যও হয় না প্রশমিতও হয় না; সুনির্বাচিত ঔষধেও ফল না দর্শিলে।

বৃহৎ, দুর্গন্ধ, সংযত (চাকাচাকা) খণ্ড; জরায়ুতে (Mucium) তীব্র বেদনা; দৌর্বল্য। রজঃ নিবৃত্তির সময়ে, শ্বেতপ্রদর

গর্ভাবস্থায় দুর্দম্য বমন রোগের অতিক্রান্ত গর্ভকালীন যখন সুনির্বাচিত ঔষধে কোনও উপকার হয় না, গর্ভস্থ শিশুর সোরাধাতুদোষ দূর করিতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

সকল যন্ত্রণার শান্তি সহকারে (ক্যালাড, থ্যাট-মি) তরুণ রোগের পরবর্ত্তী প্রভৃত ঘর্ম্মস্রাব

শ্বাসরোগে (হাঁপানি) শ্বাস কৃচ্ছ্র :—বিমুক্তবায়ুতে উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি (লরো); শয়ন করিলে ও দুই বাহু দুইদিকে অতিদূরে প্রসারিত করিয়া দিলে উপশম (আর্সেনিকের বিপরীত); নিরাশা, রোগী মনে করে সে আর বাঁচিবে না। প্রতি শীতকালে কাসের আক্রমণ।

ওষধিগন্ধজ—জ্বর (Hay fever)।—শ্বাসকাস সোরা বা পামার ইতিবৃত্ত সহকারে প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপ মাসের একইদিনে প্রত্যাবর্ত্তন রোগের গ্রীষ্মকালের আক্রমণ নিবারণার্থে ও রোগের ধাতুদোষ খালনার্থে পূর্ব্ব শীতকালে চিকিৎসিত হওয়া আবশ্যক

কাসি।—একজিমা অথবা পাঁচড়া বসিয়া যাইবার পরে বহুবৎসরের পুরাতন প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগরণান্তে ও শয্যায় শয়নে বিবর্দ্ধিত (কস, টিউব) হরিৎ, পীত বা লবণাক্ত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট পূযবৎভাব; নিষ্ঠীবন ত্যাগের পূর্ব্বে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাসিতে হয়; এরূপ কাস।

চর্ম্ম —চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইবার অস্বাভাবিক প্রবণতা (সলফ); উদ্ভেদে সহজেই পূযোৎপত্তি (হিপার) প্রবণ শুষ্ক, নিষ্ক্রিয়, কচিৎঘর্ম্ম সংযুক্ত নোংরা মনেহয় কখনও প্রক্ষালন করা হয়না এরূপ কর্কশ, আঠা আঠা, তৈলসিক্তবৎ; গন্ধক ও সীসার মলম ব্যবহারের মন্দফল সংযুক্ত; চর্ম্ম।

দুর্দম্য কণ্ডূয়ন, অথবা চোর ডাকাত ও বিপদের ভয়পূর্ণ স্বপ্ন (থ্যাটমি) সংযুক্ত নিদ্রাহীনতা

সোরা বা সোরাধাতুদোষের জন্যই যে কেবল সোরিণম ব্যবহৃত হইবে তাহা নহে; অপরাপর ঔষধের মত লক্ষণ সমষ্টির সহিত মিলাইয়া ইহা ব্যবহার করিতে হয়, এবং তখনই আমরা ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

সম্বন্ধ — সলফর ও টিউবারকিউলিনামের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ

এলুমি বোরা হিপার, সলফ, টিউব সোরিণমের পরে ভাল খাটে।

গর্ভাবস্থার বমনে ল্যাকটিক এসিডের পরে; উপশমের আভিঘাতিক রোগে আর্নিকার পরে সোরিণম ভাল খাটে

স্তনের ক্যান্সারে সোরিণমের পরে সলফার ভালকাজ করে।

J. B Bell—"বিশুদ্ধ স্বর্ণ অথবা অতিশয় ঘৃণ্য যে কোনও বস্তু হইতেই ঔষধ প্রস্তুত হউক না কেন, উহার আশ্চর্য্য কার্য্যকারিতা শক্তির নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, উহা কোন্ বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানিবার কোনও আবশ্যক করে না।"

স্পঞ্জিয়া টোষ্টা

(Spongia Tosta)

গুটিকা-ধাতুতে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। পাণ্ডুর- চুল, শিথিল দেহ-তন্তু, সুন্দর মুখাকৃতি বিশিষ্ট (ব্রোম) বালক-বালিকা ও স্ত্রী-লোকদিগের পক্ষে স্পঞ্জিয়া বিশেষ উপযোগী।

গ্রন্থির স্ফীততা ও দৃঢ়তা, গলগণ্ড (ব্রোম)

ভীত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগরণ এবং শ্বাস-রোধ অনুভব; বোধ হয় যেন স্পঞ্জের অভ্যন্তর দিয়া শ্বাস-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে।

প্রত্যেক মানসিক উত্তেজনায় কাসের বৃদ্ধি

নিদ্রান্তে বা নিদ্রা যাইতে যাইতে বৃদ্ধি (ল্যাক)

গলা-ব্যথা, মিষ্টদ্রব্য আহারে উহার বৃদ্ধি গল গ্রন্থির স্ফীততা; তৎসহ রাত্রিতে শ্বাস-রোধের আক্রমণ। গলগণ্ড।

গল-মধ্যে স্বরযন্ত্র, কণ্ঠনালী বায়ু-নলী-ভুজ (bronchi) প্রভৃতি বায়ু-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অতিশয় শুষ্কতা —"যেন শৃঙ্গের ন্যায় শুষ্ক।"

কাস।—শুষ্ক, কুক্কুর-রববৎ, ক্রুপ-রোগের কাস; উখার ঘর্ষণসদৃশ ঝন্ ঝন্ শব্দ বিশিষ্ট, সাঁইসাঁই শুন্ শুন্ সংযুক্ত কাস, সকলই সম্পূর্ণ শুষ্ক, শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ শুনা যায়না।

কাশ —দেবদারুর তক্তার ভিতর দিয়া করাত টানার ন্যায় শুষ্ক, হিস্ হিস্ শব্দ বিশিষ্ট কাশ, মিষ্টদ্রব্য শীতল পানীয়, ধুমপান, মাথা নীচু করিয়া শয়ন ও শুষ্ক, শীতল বাতাসে উহার আধিক্য, পঠনে, গানে, আলাপনে, ও গলাধঃকরণে বৃদ্ধি, উষ্ণদ্রব্য আহারে বা পানে হ্রাস

ক্রুপ —আকুলিত সাঁইসাঁই শব্দ বিশিষ্ট, নিশ্বাস-কালে বিবর্দ্ধিত (প্রশ্বাসে বিবর্দ্ধিত, একন); ও দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে বর্দ্ধিত (প্রাতঃকালের পূর্ব্বে বর্দ্ধিত, হিপ), ক্রুপ।

হৃৎকম্প —যাতনা ও হাঁপানি সহকারে প্রবল হৃৎকম্প; মধ্যরাত্রির পরে শ্বাস রোধ ও ব্যাকুলতা সহকারে সহসা নিদ্রা হইতে জাগরণ; হৃদ্‌কপাটের অপ্রাচুর্য্য; (valvular insufficiency) ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতু-কালে উপস্থিতি।

হৃদ্‌শূল; আকুঞ্চক বেদনা, উত্তাপ, শ্রান্তি, শ্বাস-রোধ উৎকণ্ঠা ও ঘর্ম্ম, মধ্য-রাত্রির পরে বৃদ্ধি।

শুক্রবাহিনী নাড়ীর স্ফীততা ও ব্যথিতত্ব; অণ্ডকোষের স্ফীততা, দৃষ্টতা, ও নিষ্পেষণ, বিলুপ্ত প্রমেহ অথবা কুচিকিৎসিত অণ্ড-প্রদাহের পর উহার উৎপত্তি

সম্বন্ধ —(১) কাস ও ক্রুপরোগে, শুষ্কতার প্রাধান্য থাকিলে একন, ও হিপের পরে স্পঞ্জিয়া ভাল খাটে; শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করিতে আরম্ভ করিলে স্পঞ্জিয়ার পরে হিপার ভাল খাটে; নিষ্ঠীবন শিথিল হয় কিন্তু রোগীকে উহা গিলিয়া ফেলিতে হয়, এই লক্ষণে আর্ণ, কষ্ট, আইওড, ল্যাক, ও নক্স-মস সহিত স্পঞ্জিয়ার তুলনা হয়।

স্পাইজিলিয়া।

(Spigelia)

নীরক্ত, দুর্ব্বলীভূত; আমবাতিক শারীরিক প্রকৃতির ব্যক্তি; এবং ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ কৃমি বিশিষ্ট গণ্ডমালা ধাতু-দুষ্ট বালক বালিকাদিগের পক্ষে স্পাইজিলিয়া উপযোগী।

লঘু-কেশ; পাণ্ডুর, ক্ষীণ, শ্রান্ত, দুর্ব্বল ও কুঞ্চিত, পীত, মৃৎবর্ণত্বক্ বিশিষ্ট ব্যক্তি

স্পর্শে শরীরের যাতনাযুক্ত অনুভূতি; স্পৃষ্টস্থানে শীতলতা অনুভব, স্পর্শে সর্ব্ব শরীরের অভ্যন্তর দিয়া কম্পের সঞ্চার (কালী-কা)। সূচী আলপিন প্রভৃতি সূক্ষ্মাগ্র, ধারাল বস্তুর ভয়।

হৃৎপিণ্ডের আমবাতিক রোগ (ক্যাল্মিয়া, লিড, ন্যাজা); হৃদগ্র প্রদেশে হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনজনিত শব্দ ধমনীর অর্ব্বুদ (aneurism)।

স্নায়বীয় শিরোবেদন —নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিতি, মস্তিষ্কের ভূমিদেশে প্রাতে আরম্ভ, মস্তকের উপর প্রসারণ এবং বামদিকের চক্ষু, চক্ষু-কোটর ও শঙ্খস্থানে অবস্থিতি (দক্ষিণ পার্শ্বে স্যাঙ্গ, সিপি); স্পন্দনজনক, দপদপকর, প্রবল বেদনা।

সূর্য্যোদয়ে শিরঃপীড়া মধ্যাহ্নে উহার চরম বৃদ্ধি, সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্তি (ষ্ট্যাট, ট্যাব)।

অক্ষি-গোলকে অসহ্য প্রচাপনী বেদনা; সর্ব্বশরীর না ঘুরাইয়া চক্ষু ঘুরান যায়না, পা ফসকিয়া গেলে উহার বিশেষ আধিক্য।

চক্ষু যেন গহ্বর অপেক্ষা অতিরিক্ত বৃহৎ এরূপ অনুভব (এক্ট, কোম); স্পর্শে অতিরিক্ত অনুভূতি; মাথার চারিদিকে যেন বন্ধন রহিয়াছে এ প্রকার অনুভব (ক্যাক্ট, কার্ব্ব-এসি, সলফ,)

নাসিকার পশ্চাদ্ভাগের রন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ প্রচুর শ্লেষ্মা গলার অভ্যন্তরে পতন, তদ্দ্বারা রাত্রিতে গল-রোধের উৎপত্তি (হাইড্রা)

অক্ষি-গোলকের অভ্যন্তর দিয়া পশ্চাদ্দিকে মস্তকের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত তীব্র, বেধন, ও ভেদনবৎ শীতল আর্দ্র বৃষ্টিকালে উহার উৎপত্তি।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহার উপস্থিতি; বাম ভাগের চক্ষুকোটর, চক্ষু, হনুর অস্থি ও দন্তের আক্রান্তি, প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি, ছিঁড়িয়া যাওয়া ও জ্বালার ন্যায় বেদনা, গাত্রের মলিন আরক্ততা; শীতল, বৃষ্টি-কালে, ও চা পানে উহার উৎপত্তি।

তাম্র-কূটের ধূম-পান জনিত দন্ত-বেদনা; কেবল শয়ন করিয়া থাকিলে ও আহার-কালে উপশম (ম্যাণ্ট)। শীতল বায়ু ■ ভুলে বৃদ্ধি; উহার বিষয় চিন্তা করিলে প্রত্যাবৃত্তি

স্থূলান্ত্রের শেষ বক্রাংশে (sigmoid) অথবা সরলান্ত্রে কঠিন কর্কট (scirrhus) উহাতে অসহ্য নিদারুণ বেদনা (নমুনে•)

শ্বাস-কৃচ্ছ্র; দক্ষিণ পার্শ্বে অথবা মাথা উচ্চ করিয়া শয়নের আবশ্যকতা (ক্যাক্ট, স্পঞ্জ); বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধবৎ বেদনা।

নাড়ীর স্পন্দনের সহিত যুগপৎ সূচী-বেধবৎ বেদনা বিশিষ্ট বক্ষঃস্থলের রোগ সঞ্চলনে, ও শীতল অর্দ্র ঋতুতে উহার আতিশয্য

হৃৎকম্প; প্রবল, দৃশ্যমান ও শ্রুতিমান স্পন্দন; অত্যল্প মাত্র নড়িলে চড়িলে; ও সম্মুখদিকে অবনত হইলে উহার উপস্থিত। হৃদগ্রপ্রদেশে (apex) হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনজনিত শব্দ।

উদরের রোগ, ও কৃমি-রোগ সম্বন্ধে তোতলামি, প্রথম শব্দাংশ তিন চারিবার বলিতে হয়

উপচয়।—নড়িলে-চড়িলে, শব্দে, স্পর্শে, চক্ষু ঘুরাইলে; ঝাঁকি লাগিলে অথবা সংঘর্ষণে; বৃদ্ধি

উপশম।—মস্তক উচ্চ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে হ্রাস (আর্স, ক্যাক্ট, স্পঞ্জ)।

সম্বন্ধ।—হৃদ্রোগে, একন, আর্স, ক্যাক্ট, ডিজি, কালী-কা, নাজা, ক্যাল-মিয়া ও স্পাইজিলিয়ার সহিত স্পাইজিলিয়ার তুলনা কর।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ।

(Sanguinaria)

নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত সবমন শিরঃপীড়া, প্রাতে উহার আরম্ভ, দিবাভাগে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি ; মাথা যেন ফাটিয়া পড়িবে, অথবা চক্ষু প্রচাপিত হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভব ; নিদ্রান্তে উপশমপ্রাপ্তি ।

আমেরিকার সবমন শিরঃপীড়া, অন্ধকার গৃহে সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইয়া থাকিলে উহার হ্রাস (অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম বশতঃ শিরঃপীড়া, ইপি-জিয়া, সবমন শিরঃপীড়ার পরিশ্রম-কালে বৃদ্ধি এবং ঘর্ষণে, প্রচাপনে, ও সন্ধ্যাকালে হ্রাস, ইণ্ডিগো)

শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে আরম্ভ, উপরের দিকে প্রসারণ ও দক্ষিণ চক্ষুর উপরে অবস্থিতি (সিপি —বাম অক্ষি-কোটরের উপরে বা মধ্যে অবস্থিতি, স্পাইজি) ।

নিবৃত্ত-রজ কালে প্রত্যাবৃত্ত, শিরঃপীড়া ; প্রতি সপ্তম দিবসে উপ-স্থিতি (স্যাবাড, সিপি, সলফ ।—অষ্টম দিবসে, আইরিস) ।

যুগম্ভবের শায়ুশূল, নিহিত-জানু (kneeling down) হইয়া ভূতলে দৃঢ়রূপে মস্তক চাপিয়া রাখিলে উহার উপশম ; উপরের হনু হইতে সকল দিকে বেদনার প্রসারণ ।

ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া ও থাইসিস রোগে, অপরাহ্নে গণ্ডদ্বয়ের সীমা-বিশিষ্ট আরক্ততা ; কর্ণে জ্বালা ।

দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ স্কন্ধে বাতের বেদনা (বাম, ফির) ; বাহু উপরে উঠাইতে পারা যায় না, রাত্রিতে উহার বৃদ্ধি

দীর্ঘাস্থি, কর-পৃষ্ঠ প্রভৃতি যে যে স্থানের অস্থি অত্যল্প আবৃত তথায় বেদনা (রুস-ভেনি) ।

গল-কোষ ও গল-নালীতে জ্বালা । স্বরযন্ত্রের ও নাসিকার বহুপাদ (polypus) (স্যাঙ্গ, মেরি, টিউক) ।

নিবৃত্ত-রজস্কাদিগের পীড়া —তাপাবেশ ও শ্বেতপ্রদর ; করতল ও পদতলের জ্বালা ; শয্যায় গাত্রাবরণ ফেলিয়া দিতে হয় ; স্তনের বেদনাবিশিষ্ট বিবর্দ্ধন ; যখন ল্যাকেসিস ও সলফারে উপকার দর্শে না।

ওষধিগন্ধজ জ্বরের পরবর্ত্তী শ্বাস-রোগ, গন্ধে উহার বৃদ্ধি।

কাস —শুষ্ক কাস, তজ্জন্য রাত্রিতে নিদ্রা হইতে জাগরণ এবং যে পর্য্যন্ত না শয্যায় উঠিয়া বসা যায় ■ বায়ু-নিঃসরণ হয় সে পর্য্যন্ত উহার অবিরতি ; গণ্ডদ্বয়ের সীমাবদ্ধ আরক্তত ; নৈশ ঘর্ম্ম, অতিসার।

হুপ-শব্দ-কাসের পরে উগ্র কাস, রোগীর যতবার সর্দ্দি লাগে ততবারই কাস প্রত্যাবৃত্ত হয়।

যুবতী স্ত্রীদিগের, বিশেষতঃ স্বল্প রজ-কালে, মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ (বেলিস, ক্যাল্ক, ইউজিন, সোরি)।

সম্বন্ধ।—(১) সবমন্য শিরঃপীড়ায়, বেল, আইরিস, মেলিলোটসের সহিত ; বিরজ-কালের রোগে, ল্যাক ও সলফের সহিত ; পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস বা প্রচ্ছন্ন নিউমোনিয়ায় চেলি সলফ, ফস, ভিরে-ভির সহিত স্যাঙ্গুর তুলনা হয় (২) ক্যাম্বেটিনায় বেলেডোনা বিফল হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় (৩) ওপিয়মের মত্ততা নিবারণার্থে ইহার ব্যবহার হয়

স্যানিকিউলা।

(Sanicula)

নিম্নাভিমুখ গতিতে ভয় (বোরা)

শিশুর দুর্দ্দমনীয়তা ও অবাধ্যতা, ক্রন্দন ও পদাঘাত করণ ; বিরক্তচিত্ততা ও কোপনত, আর ব সত্বর হাস্য ; স্পর্শ করিতে দিতে অনিচ্ছা।

অবিরত কার্য্যের পরিবর্ত্তন।

নিদ্রা-কালে বালক-বালিকাদিগের মাথায় ও ঘাড়ের সমধিক ঘর্ম্ম ; উহাতে অনেকদূর পর্য্যন্ত বালিস ভিজিয়া যায় (ক্যাল্ক, সিলি)।

মস্তকের কেশাবৃতভাগে, চক্ষুর ভ্রূতে, এবং দাড়িতে শল্কবৎ প্রভৃত খুসকি।

কর্ণের পশ্চাতে ক্ষত এবং উহা হইতে শুভ্র ধূসর, আঠা আঠা রস নিঃসরণ (গ্রাফ. সোরি)

জিহ্বা।—বৃহৎ, কোলিত জিহ্বা উহাতে জ্বালা, শীতল রাখিবার জন্য বাহির করিয়া রাখিতে হয়; জিহ্বার উপর দদ্রু (ট্যাট-মি)

শকটারোহণ বশতঃ বিবমিষা ও বমন পিপাসা; বারবার অল্প অল্প জল পান, জল আমাশয়ে পৌছিবামাত্র বমন হইয়া পতন (আর্স, ফস)।

অবিরত ক্ষুধার পরিবর্তন (ল্যাক-ক্যান, পলস)।

অনিচ্ছায় মল ও মূত্র নিঃসরণ; দ্বারাবরণী পেশীর (sphincter) উপর নির্ভর করিতে পারা যায়না (এলো); অপানের বেগ-কালে, মল নিঃসৃত না হয় এজন্য জঙ্ঘাদ্বয় আড়াআড়ি করিয়া রাখিতে হয়।

কোষ্ঠ-বদ্ধতা।—যে পর্য্যন্ত অধিক মল সঞ্চিত না হয় সে পর্য্যন্ত মল-প্রবৃত্তি পরিশূন্যতা; অতি কুন্থনে আংশিক নিঃসারিত মলের পুনরায় ভিতরে প্রবেশ (সিলি, থুজা); অধিক পরিমাণে ধূসর বর্ণ, শুষ্ক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার মল নিঃসরণ হাতদিয়া বাহির করিতে হয় (সেলে

মল।—শক্ত, পরিত্যাগ করা অসাধ্য, মধ্যে চুনের ন্যায় ধূসরাভ শুভ্র গোলা সদৃশ; মলদ্বারের প্রান্ত হইতে খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত (ম্যাগ-মি) মল; মলে পনিরের গন্ধ।

অতিসার।—বিরেচনের প্রকৃতি ও বর্ণের পরিবর্তন; ওষধির ন্যায় আকৃতি; ফেণিল, ঘাসের ন্যায় সবুজবর্ণ, থানিক থাকিলে পর সবুজবর্ণ, ভাঙ্গ-পত্রা পুকুরের গাদের মত,—মল; আহারান্তে তাড়াতাড়ি মল-ত্যাগ করিতে যাইতে হয়।

স্নান করিলেও মলের গন্ধ যায়না (সলফ)।

মল দ্বারের সমীপবর্ত্তী ত্বকের অবদরণ (সলফ); মূলাধার (perineum) আবৃত করিয়া জননাঙ্গ পর্য্যন্ত উহার প্রসারণ।

কোনা মৎস্যের জলের ন্যায় উগ্রগন্ধবিশিষ্ট প্রদর (সরলান্ত্র হইতে কোনা-মৎস্যের জলের ন্যায় রস-ক্ষরণ, ক্যাপ্; কর্ণ হইতে, টেলু)।

দুর্ব্বলতা, বস্তি-গহ্বরের আধেয় (contents of pelvis) যেন বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ আবেগ (bearing down); হাঁটিলে, পদ-স্খলিত হইলে, বা

সংঘর্ষে উহার বৃদ্ধি, বিশ্রামে ও শয়ন করিয়া থাকিলে হ্রাস; অপর সম্মুখে হাত রাখিয়া জননাঙ্গ তুলিয়া ধরিবার ইচ্ছা (লিলি, মিউর) জরায়ুর স্পন্দন বোধ।

পদ-ঘর্ম—পদাঙ্গুলীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঘর্ম, ও তজ্জন্য উহাদের ক্ষত; দুর্গন্ধ ঘর্ম (গ্রাফ, সোরি, সিলি); যেন শীতল জলে পা ফেলা হইয়াছে পদতলে এরূপ ঘর্ম।

পদতলের জ্বালা, উহা আবৃত করিতে বা শীতল স্থানে রাখিতে হয় (লাক, মেডো, স্যাঙ্গ, সলফ)।

শিশু অত্যন্ত শীতকালেও পদাঘাত করিয়া কাপড় ফেলিয়া দেয় (হিপ, সলফ)।

ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল শীর্ণতা; শিশুকে অধিক বয়স্ক, মলিন, তৈলাক্ত ও ঈষৎ কপিশ বর্ণ দেখায়; উহার ঘাড়ের নিকটের ত্বক কুঞ্চিত হইয়া বলিতে বলিতে ঝুলিতে থাকে (এব্রোট, আওড, স্যাট-মিউ, সার্স)।

সম্বন্ধ।—এলম, এব্রোট, বোরা, ক্যাল্ক, গ্রাফ, স্যাট-মিউ, সিলি ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সোরা দোষঘ্ন ঔষধের সহিত সম্বন্ধ।

স্যাবাডিলা।

(Sabadilla.)

লঘু-কেশ, সুন্দর মুখাকৃতি, দুর্ব্বলীভূত শিথিল পেশীমণ্ডলীবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

বালক-বালিকাদিগের ক্রিমিজনিত রোগ (সিনা, সিলি, স্পাজি)

স্নায়বিক রোগ—স্পন্দন, আক্ষেপিক-কম্পন, ক্যাটালেপ্সি; ক্রিমিজন্য উৎপত্তি (সিনা, সোরি)।

সূত্র-ক্রিমিজনিত নারীদিগের কামোন্মাদ।

অনেক লক্ষণের দক্ষিণ হইতে বামদিকে গতি (লাই, লাভ); পা হইতে মাথায় শীতের উত্থিতি

ভ্রান্তি —যেন শোক হইয়াছে, অঙ্গগুলি যেন শীর্ণ হইয়াছে, রোগীর এরূপ ভ্রান্তি বায়ুজন্য উদরের স্ফীততা দেখিয়া রোগিণীর গর্ভ বলিয়া ভ্রম; রোগিণী মনে করে যেন তাহার কোন ভয়ঙ্কর গল-রোগ জন্মিয়াছে, উহাতে তাহার মৃত্যু হইবে।

সবিরাম জ্বরের ভোগকালে প্রলাপ (পড)

শিরঃপীড়া।—অতিরিক্ত চিন্তা করাতে, অতিরিক্ত মনোনিবেশ করাতে (আর্জ্জ না); ও পিন্-কৃমি (Pin-worm) হইতে উৎপন্ন, শিরঃপীড়া।

হাঁচি।—আক্ষেপিক, অ বেগে আবেগে উপস্থিত, হাঁচি; তৎপরে অশ্রুপাত; প্রচুর জলবৎ স্রাব নিঃসরণশীল নাসিকার প্রতিশ্যায়; মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা এবং অক্ষিপুটের আরক্ততা ও জ্বালা।

ডিপথিরিয়া, টন্সিল ইটিস (তালু-মূল-প্রদাহ); অপেক্ষাকৃত অনায়াসে উষ্ণদ্রব্য গিলিতে পারা যায়; সূচী-বেধবৎ যাতনা ও অন্যান্য অধিকাংশ লক্ষণ, বিশেষতঃ গল-লক্ষণের বাম হইতে দক্ষিণদিকে গতি (ল্যাকে, ল্যাক-ক্যান)

গলার মধ্যে যেন একখণ্ড চর্ম্ম শিথিলভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব, উহার উপর দিয়া গিলিতে হয় (পিণ্ডবৎ অনুভব ল্যাক)

গল-কোষ ও গল-গহ্বরের পরিশুষ্কতা।

ধকের পার্চমেণ্টের মত শুষ্কতা

উপচয়।—শীতলতায়; শীতল বায়ুতে বিশ্রাম-কালে, ও পূর্ব্বাহ্ণে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ।—(১) অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষণে, কলোসি, কল্চি, লাইকোর সহিত; এবং অনাবৃত বায়ুতে হ্রাসে পলস, ও স্যাবিনার সহিত স্যাবাডিলার তুলনা হয়; (২) প্লুরিসি রোগে ব্রাই ও স্নায়ু-বন্ধের পর স্যাবা ভাল খাটে, এবং একন ও ব্রাই বিফল হইলে পরেও এতদ্বারা উপকার দর্শে।

স্যাবিনা ।

(Sabina)

স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন পীড়া   সন্ধিবাতজ বেদনা ; বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের অভিমুখতা

গীত-বাদ্যে অসহ্যতা উহাতে স্নায়বিকতার উৎপত্তি, যেন অস্থি ও মজ্জা (marrow) অভ্যন্তর দিয়া সংপ্রবেশ (অপকাতের উৎপত্তি, থুজা) ।

প্রায় সকল রোগেই ত্রিকাস্থি হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত from sacr m to pubes কটিদেশে আকর্ষণী-বেদনা পৃষ্ঠ হইতে শরীরের চারিদিক দিয়া মণিপুর পর্য্যন্ত বেদনার গতি (ভাইবারনম) ।

গর্ভস্রাব বা অকাল-প্রসব জনিত পীড়া ; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ; আংশিক ফিকা লাল, আংশিক সংযত রক্তের প্রবাহ ; অত্যল্প সঞ্চলনে উহার আধিক্য (সিকেলি) ; বিশেষতঃ স্বতন্ত্র হ্রাস , ত্রিকাস্থি হইতে মণিপুর pubes) পর্য্যন্ত বেদনার সংপ্রসরণ ।

ঋতু ।—নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অতিরিক্ত দীর্ঘকালস্থায়ী ঋতু ; আংশিক তরল, আংশিক সংযত (ক্লিন) রক্ত ; (যাহাদের অতি অল্প বয়সে প্রথম রজোদর্শন হইয়াছিল, তাহাদের) , থাকিয়া থাকিয়া ঋতু-প্রবাহ নিঃসরণ , তৎসহ উদর-বেদনা ও প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা ; ত্রিকাস্থি হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত বেদনা ।

সংসর্গ-লালসার উত্তেজনা সহকারে ঋতু-কালের ব্যবধান-সময়ে রক্ত-স্রাব (এম্ব) ।

জরায়ুর দৌর্ব্বল্য বশতঃ অমরা-রোধ (ক্যান্থ , দারুণ প্রসবান্তিক বেদনা , কলো, সিকে ।

পূর্ব্বে গর্ভস্রাবিণী ; ও অল্পবয়সে প্রথম ঋতুবতী নিবৃত্ত রজস্কাদিগের অতিশয় রক্ত-স্রাব ।

গর্ভপাত বা অকাল-প্রসবের পর ডিম্বাশয় কিংবা গর্ভাশয়ের প্রদাহ ।

এই ঔষধে, জরায়ু হইতে অর্ব্বুদ কিংবা অন্যবিধ শৈল্য (foreign body) নিঃসারণের সহায়তা হয় (ক্যান্থ) ।

অসহ্য কণ্ডূয়ন ও জ্বালা সংযুক্ত ডুমুর-বৎ আঁচিল; উহাতে মাংসাঙ্কুরের (granulations) প্রাচুর্য্য (থুজা, নাইট্ এসি)।

উপচয়।—সামান্য সঞ্চালনে (সিকেলি); উষ্ণবায়ুতে অথবা উষ্ণগৃহে (এপিস, পলস); বৃষ্টি।

উপশম।—শীতল, বিমুক্ত, বিমল বায়ুতে হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) থুজার সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) উপদংশ ও সায়কদোষ-জনিত পীড়ায় থুজার পরে স্যাবি ভাল খাটে। (৩) ক্যান্থ, ক্রোক, মিলিফো, সিকে, ও টিলের সহিত স্যাবির তুলনা হয়।

স্যাম্বুকস্ নাইগ্রা।

(Sambuous Nigra)

গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের রোগে, বিশেষতঃ বায়ু-পথের (air-passages) রোগে এই ঔষধ উপযোগী।

সবল ও মাংসল ব্যক্তিদিগের সহসা শীর্ণতা প্রাপ্তি (আইওড, টিউবা)।

প্রবল চিত্ত-বিকার; উৎকণ্ঠা, শোক, অথবা সম্ভোগ-লিপ্সায় অতি-পরিতৃপ্তির মন্দ ফল (ফস-এসি, ক্যালি-ফস)

শরীরের নানাস্থানে, বিশেষতঃ জঙ্ঘায়, গুলফে, ও পদে জলপূর্ণ স্ফীততা।

শিশুদিগের শুষ্ক প্রতিশ্যায়; নাসিকার শুষ্কতা ও সম্যক অবরুদ্ধতা, উহার শ্বাসের ও স্তন-পানের প্রতিবন্ধকতা, নাকে গুণ্ গুণ্ করা (এম্‌কা, নক্স)।

শ্বাস-কৃচ্ছ্র; শিশু সহসা নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, তাহার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়, মুখমণ্ডল পীতবর্ণ ও নীলবর্ণ ধারণ করে, সে শয্যায় উঠিয়া বইসে; নীলবর্ণ হইয়া উঠে, শ্বাসের জন্য হাঁপায় (gasps for breath), অবশেষে শ্বাস ছাড়িতে পারে; রোগের আক্রমণ নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু পুনরায় উপস্থিত হয়; শিশু নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না (ক্লোর, মেফা); রোগের আক্রমণের মধ্যে নিদ্রা যায় (ল্যাক—এরম-ট্রাক, তুলনা করুন)।

ক্রুপরোগের শেষাবস্থায় যে প্রকার শ্বাস-রোধের আক্রমণ জন্মে তদ্রূপ শ্বাস-রোধের আক্রমণ।

ক্রন্দনপরায়ণ বালক-বালিকাদিগের শ্বাস-রোধ-কর কাস ; মধ্য রাত্রির সময় উহার আতিশয্য ; শুষ্ক-গর্ত্ত, গভীর শব্দবিশিষ্ট বক্ষঃস্থলের আক্ষেপ সংযুক্ত ; এবং নিয়মিত নিশ্বাস, ও দীর্ঘশ্বাস সম্বলিত প্রশ্বাস বিশিষ্ট ; কাস।

জ্বরের আবেশের পূর্ব্বে গভীর শুষ্ক কাস

জ্বর।—নিদ্রাকালে শুষ্ক উত্তাপ ; নিদ্রিত হইবার অব্যবহিত পরে ; শয়নের পরে ; পিপাসা-পরিশূন্য ; উত্তাপ। গাত্র উন্মুক্ত করিতে আশঙ্কা (জ্বরের সকল অবস্থায়ই আবৃত থাকিবার আবশ্যকতা—নক্স)।

জাগ্রৎ সময়ে, সর্ব্বশরীরে প্রভূত ঘর্ম্ম ; নিদ্রিত হইবামাত্র শুষ্ক উত্তাপের প্রত্যাবৃত্তি (নিদ্রা যাইবার জন্য চক্ষু বুজিবামাত্র ঘর্ম্ম সিষ্ক, কোনা)।

উপচয়।—বিশ্রাম কালে ; মধ্যরাত্রির সময় ; ও ফল আহারের পরে ; বৃদ্ধি।

উপশম। শয্যায় উঠিয়া বসিলে ; ও সঞ্চালনে ; হ্রাস। অধিকাংশ যাতনা বিশ্রাম কালে উপস্থিত ও সঞ্চালনে তিরোহিত হয় (ফ্লোরা)।

সম্বন্ধ—(১) সিষ্ক, ক্লোরা, ইপি, মেফা, সলফের সহিত ইহা তুলনা হয়। (২) আর্সেনিকের অপব্যবহার জনিত পীড়া স্যাম্বু দ্বারা উপশমিত হয়। (৩) ভয়-প্রাপ্তির সমাফলে ও ওপিয়মের পরে স্যাম্বু ভাল খাটে।

হাইওসায়েমাস।

(Hyosoyamus Nigor)

কোপন-স্বভাব, উত্তেজনশীল, স্নায়বীয়, হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত রক্ত-প্রধান ধাতুর ব্যক্তি।

হিষ্টিরিয়া বা মদাত্যয় (delirium tremens) প্রভৃতি রোগে যেরূপ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ অপ্রদাহিত প্রকৃতি বিশিষ্ট কিন্তু মস্তিষ্কের বিবর্দ্ধিত ক্রিয়াশীলতা সংযুক্ত রোগ।

টঙ্কার।—ভয় বা অস্ত্রের কৃমি জন্য বালক বালিকাদিগের টঙ্কার (সিনা)। প্রসব-কালে কিংবা সূতিকাবস্থায় টঙ্কার; আহারান্তে শিশুর বমন, তৎপরে সহসা চিৎকার করিয়া অচেতন হইয়া পতন।

আক্ষেপ —সংজ্ঞাশূন্যতা ও অতিশয় অস্থিরতা সহ আক্ষেপ; চক্ষু হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত শরীরের প্রত্যেক পেশীর স্পন্দন (সংজ্ঞাযুক্ত আক্ষেপ, নক্স)।

প্রলাপ। —অস্থিরতা, শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়া, পলাইয়া যাইবার চেষ্টা; অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দান; রোগী মনে করে যে সে ঠিক স্থানে নাই; সে নানাবিধ কাল্পনিক আচারের (doings) কথা বলে কিন্তু কোন অভাব জানায় না, এবং কোন অভিযোগ করে না।

প্রলাপে বেলেডোনা ও ষ্ট্রামোনিয়মের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায়ই হাইওসায়েমাস ব্যবহৃত হয়; এই ঔষধে বেলেডোনার লক্ষণের ন্যায় সর্ব্বদা মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয় এবং ষ্ট্রামোনিয়মের ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও উন্মাদবৎ প্রলাপ থাকেনা।

ভয়।—একাকী থাকিতে ভয়, বিষাক্ত হইবে; দংশিত হইবে ও বিক্রীত হইবে বলিয়া ভয়; খাইতে; ও কিছু দিলে তাহা লইতে ভয়।

ভগ্নপ্রেমের মন্দ ফল; তৎসহ বিদ্বেষ, ক্রোধ, অসম্বদ্ধ কথা, অথবা প্রত্যেক বিষয়েই হাস্য করিবার প্রবৃত্তি; তৎপরে অপস্মার।

কামোন্মাদ; লজ্জাহীনতা, আবৃত থাকিতে অনিচ্ছা, পদাঘাত করিয়া কাপড় ফেলিয়া দেওয়া, গুহ্যাঙ্গ উন্মুক্ত করা; অশ্লীল গান গাওয়া; বিবস্ত্র হইয়া শয্যায় শুইয়া থাকা ও বক্ বক্ করিয়া বকা।

কাস।—শুষ্ক, নৈশ, আক্ষেপিক কাস; শয়ন করিলে উহার বৃদ্ধি, ও উঠিয়া বসিলে হ্রাস (ড্রস); রাত্রিতে আহারান্তে, পানে, আলাপনে, ও গানে আধিক্য (ড্রস, কস।—শয়নে উপশম, ম্যাঙ্গ-সি)।

প্রসবের পরে মূত্রস্তম্ভ কিংবা অবারিত মূত্র-স্রাব সহকারে মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত; প্রসূতীদিগের মূত্র-ত্যাগে অনিচ্ছা (আর্ণ, ওপি)।

আক্ষেপিক রোগের অপস্মারের প্রকৃতির প্রবণতা।

কোপন-স্বভাব, উত্তেজনশীল ব্যক্তিদিগের উৎকট স্নিক্কো-

হীনতা ; কাযকর্ম্মের উপদ্রব হইতে উহার উৎপত্তি ; অনেক সময় কল্পিত কারণে উহার উদ্ভব।

জ্বর -নিউমোনিয় স্কার্লেটিনা, সত্বর উহার সন্নিপাতাবস্থা প্রাপ্তি, মস্তিষ্কের আবিলতা (sonsorium clond d) চক্ষের একতান দৃষ্টি, কিছু যেন ধরা যাইতেছে এরূপভাবে শূন্যে হস্ত প্রসারণ অথবা শয্যা-বস্ত্র খুঁটন মল-শর্করাবৃত-দন্ত, জিহ্বার শুষ্কতা ও গুরুতা, অনিচ্ছায় মল-মূত্র নিঃসরণ ; কণ্ডরা-স্পন্দন (subsultus tondinum)।

উপচয় ।—সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে ; ঋতু-কালে মানসিক পীড়ায় ; বিদ্বেষে, অসুখকর প্রেমে ; ও শয়ন করিলে বৃদ্ধি।

উপশম —মস্তক অনবত করিলে (শিরোনমন) ও উঠিয়া বসিলে (কাস) ; হ্রাস।

সম্বন্ধ —(১) বেল, ষ্ট্রাম, ও ভিরেট্রমের সহিত হাইওসের তুলনা হয় (২) হাইওসে উপকার না দর্শিলে অনেক সময় ফস প্রয়োগে কামোন্মাদের আরোগ্য জন্মে (৩) মদ্যপায়ীদিগের রক্ত-রসে হাইওস বিফল হইলে নক্স বা ওপি ব্যবহৃত হয় (৪) সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী বধিরতায় বেলেডোনার পরে হাইওস ভাল খাটে।

হাইড্রাষ্টিস ক্যানেডেন্সিস।

(Hydrastis canadensis)

আঠা আঠা শ্লেষ্মা-স্রাববিশিষ্ট দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তি

আমাশয়ের ও যকৃতের ক্রিয়ার সুস্পষ্ট বৈলক্ষণ্য সহকারে ধাতু-বিকৃতি ; অপরিমিত মদিরাপানে শরীরের ভগ্নতা।

কঠিন, সংলগ্ন ক্যান্সার ; উহার ত্বক্ কলঙ্কিত ও কুঞ্চিত ; ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ তীব্র বেদনা ; স্তন-বৃন্ত আকুঞ্চিত।

স্তন্যদানজনিত মুখ-ক্ষত ; জিহ্বার বৃহত্তরত্ব ও উহাতে দন্তাঙ্ক।

প্রদর ;—গাঢ়, আঠা আঠা, পীতবর্ণ, রজ্জুবৎ স্রাব ; উহা অপত্য-পথের (vagina) মুখ হইতে দীর্ঘ দড়ির ন্যায় ঝুলিয়া থাকে (বোভ, কালী-বাই)। ভগকণ্ডূয়ন।

নাসা-পথ হইতে গাঢ় পীতবর্ণ, রজ্জুবৎ, প্রভূত শ্লেষ্মা নিঃসরণ (কোরেল-ক)।

নাসিকার পশ্চাৎ-রন্ধ্র ও গল-কোষ হইতে কাসিয় পীতবর্ণ ও আঠা আঠা শ্লেষ্মা উত্তোলন ; মারকিউরি কিংবা ক্লোরেট-অব পটাশ সেবনের পর ক্ষত উপদংশ-জনিত গলা-বেদনা

হাইপারিকম

(Hypericum)

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার ভৌতিক উপঘাত (mechanical injury) পৃষ্ঠবংশের সংঘর্ষ (spinal concussion) পতনের পর কোকিল-চঞ্চু-অস্থিতে (coccyx) বেদনা।

বিদ্ধব্রণ, (punctured wound), ছিন্নব্রণ বা বিদারিত ব্রণ ; উহাতে স্পর্শ-দ্বেষ, বেদনা (লিড), বিশেষতঃ অনেক দিনের ব্রণ (দুষ্টব্রণ, আর্ণি, হেমে)।

উপঘাত।—প্রেক, সূচী, আলপিন, চোঁচ প্রভৃতির উপর পদ-মর্দ্দিত হওয়াতে উপঘাত (লিড) ; ইন্দুরের কামড়ের উপঘাত হনু-স্তম্ভের প্রতিষেধক

এই ঔষধে প্রায় সম্যকরূপে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিন্ন ও বিদীর্ণ অঙ্গের যোড়া লাগে (ক্যালেণ্ডু

হস্তাঙ্গুলী, পদাঙ্গুলী, নখ-তল, করতল, পদতল, প্রভৃতি যে সকল স্থলে জ্ঞান-জনক স্নায়ুর (sentient nerve) আধিক্য সেই সকল স্থানের উপঘাত, বেদনার অসহ্যতা দ্বারা তীব্রভাবে স্নায়ুর আক্রান্ততা বুঝা যায় ; হস্ত-পদাদির বিধান-তন্তুর উপঘাত।

সন্ত্রণ বা শস্ত্রোপচারের পরবর্ত্তী স্নায়বীয় অবসাদন ; ভয়াদির সংঘটন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বদাই স্নায়ুর রূপান্তর জন্মে এবং সময়ে সময়ে উহার গতি ও পচনশীল অবরুদ্ধ হয় (ব্যান্ডেজ) ছোট অঙ্গুলীর অগ্রভাগের দুষ্টতা ও পিষ্টতা অভিঘাত জনিত অপকার হইতে উৎপন্ন ধনুষ্টঙ্কার (ফাইসস্টিগমার সহিত তুলনা করুন)

শিরোঘূর্ণন —মস্তক যেন সহসা লম্বা হইয়া পড়িয়াছে এপ্রকার অনুভব, রাত্রিতে মূত্র-বেগ সহকারে শিরোঘূর্ণন

শিরঃপীড়া ; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের উপর পতিত হওয়াতে যেন শূন্যে উচ্চে তুলিতেছে এরূপ অনুভব ; রোগিণী পাছে উচ্চ হইতে পড়িয়া যায় এজন্য বড়ই উৎকণ্ঠা

পৃষ্ঠবংশ —পতনের পরে, বহুবর্ষের বহু দিনের কোন আঘাত মাত্র সঞ্চালনে রোগীর চিৎকার করা, স্পর্শে পৃষ্ঠবংশের অতিশয় অনুভূতি।

গুঞ্জন (bunions) ও কড়ায় স্নায়ুর আক্রান্ততাসূচক নিদারুণ বেদনা।

মস্তকে আঘাত বা সংঘর্ষ বশতঃ টঙ্কার

সম্বন্ধ।—(১) আর্ণ, ক্যালেণ্ড, রুটা ও ষ্ট্যাফের সহিত তুলনা হয় (২) সন্ত্রণে পূর্ব্বে যে সকল স্থলে পর্য্যায়ক্রমে একন ও আর্ণ ব্যবহৃত হইত, এক্ষণ সেই সকল স্থলে হাইপারিকম প্রয়োগে আরোগ্য জন্মে

হিপার সংলফর।

(Hepar Sulphur)

নিশ্চেষ্ট লসিকা-প্রধান-ধাতু ; এবং পাতলা চুল ও পাতলা মুখাকৃতি, কার্য্যে ধীরতা, এবং পেশীর কোমলতা ও শৈথিল্যতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিপার উপযোগী।

সলফারের ন্যায় সোরা-দোষ, ■ গণ্ডমালা-দোষেও হিপার উপযোগী

সলফারের লক্ষণে চর্ম্ম-রোগে শুষ্ক, কণ্ডূয়ন থাকে কিন্তু স্পর্শে অনুভূতি

থাকে না, বরং চুলকাইতে ও ঘর্ষণ করিলে উপশম জন্মে, কিন্তু হিপার সলফারেই লক্ষণে চর্ম্মের অসুস্থতা, ও পূয-নিঃসরণ থাকে, এমন কি ঈষৎ উপঘাতেও পূযোৎপন্ন হয় (গ্রাফ, মার্ক); স্পর্শে অত্যন্ত অনুভূতি জন্মে, ত্বকের রুগ্নস্থানে বস্ত্রের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারা যায় না (ল্যাক।—অল্প স্পর্শে অনুভূতি, কিন্তু শক্ত চাপ সহ্য হয়, সিক); বেদনায় অনেক সময় মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

যে সকল রোগে পূযোৎপত্তি অনিবার্য্য, এবং পারদের অপব্যবহারে যে সকল স্থলে শরীরের অপকার জন্মিয়াছে, সেই সকল স্থলে হিপার ব্যবহৃত হয়।

রোগীর ক্ষণরাগিতা, যৎসামান্য বিষয়ে ক্রোধের উদ্রেক; অবসাদ-বায়ুগ্রস্ত ভাব, অসঙ্গত উৎকণ্ঠা; শারীরিক ও মানসিক অতিরিক্ত অনুভূতি; যৎসামান্য কারণে বিরক্তি দ্রুত, ব্যস্ত সমস্ত কথা এবং তাড়াতাড়ি জলপান।

শীতল বায়ুতে অত্যন্ত অনুভূতি, পাশের ঘরের দরজা খুলিলেও বায়ুর স্পর্শ অনুভব করিতে পারা যায় বলিয়া অনুমান গ্রীষ্মের সময়ও বদন পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত রাখিবার আবশ্যকতা (সোরি), অনাবৃত থাকা সহ্য করিতে পারা যায় না। (বরং—বস্ত্রাবৃত থাকা সহ্য করিতে পারা যায় না, ক্যাম্ফ, সিকে), অত্যন্ত সামান্য বিমুক্ত বায়ু ভোগে শর্দ্দি লাগে (টিউব)

মূত্র।—মূত্রের প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা; ধীরে ধীরে মূত্র-নিঃসরণ, শক্তি-শূন্যতা, সরলভাবে পতন; মূত্র পরিত্যক্ত হইবার পূর্ব্বে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা, মূত্র-ক্রিয়া পরিসমাপ্ত করিতে পারা যায় না, বোধ হয় যেন খানিকটা মূত্র সর্ব্বদাই অবশিষ্ট থাকে (এলুম, সিপি)।

কাস।—শরীরের কোন অংশ অনাবৃত হইলে কাস (রুমেক্স) শ্বাস-রোধকর ও গল-রোধকর ক্রুপজনিত কাস; পশ্চিম দিকের শুষ্ক ভূ-বায়ু ভোগ বশতঃ কাস (একন)।

ক্রুপ। শুষ্ক শীতল বাতাস লাগাইবার পর ক্রুপ (একন); গম্ভীর, কর্কশ কুকুরের ডাকের ন্যায় কাস, তৎসহ স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ;

শীতল বায়ু ও শীতল পানীয় দ্রব্যে এবং দুই প্রহর রাত্রের পূর্বে কিংবা প্রাতঃকালের দিকে উহার বৃদ্ধি।

গলার মধ্যে চোঁচ, মাছের কাঁটা অথবা গোঁজ থাকার ন্যায় বেদনা (আর্জ-না, নাই-এসি); পারিপার্শ্বিক সম্ভাবনা বিশিষ্ট ভানুপূর্ণ পদার্থ; শীতকালের শীতলতা সহ উহার পুরাতন বিবৃদ্ধি (ব্যারা, ল্যাক, ষ্ট্যাম, সোরিন)।

ক্ষত, দদ্রু, উহার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপচীয়মান (pimples) বা পচনশীল পীড়কা (pustules) সম্মিলিত হইয়া জাগারণ।

নিম্ন ওষ্ঠের মধ্যস্থানের বিদারণ (এম-কা, হ্যাট।—ওষ্ঠের বহিঃপার্শ্বে বিদারণ, কণ্ডু)

অতিসার।—অম্লগন্ধ বিশিষ্ট বালক-বালিকাদিগের অতিসার (ক্যাল্ক, ম্যাগ্-কা—শিশু ও মলের অম্লগন্ধ, রিউম)। কর্দ্দমের বর্ণ মল (ক্যাল্ক, পড)।

অক্ষিগোলক।—স্পর্শে বেদনা, উহা যেন মস্তকের মধ্যে আকৃষ্ট হইবে এরূপ বেদনা (ওলিন, প্যারিস)।

ঘর্ম।—শান্তি ব্যতীত দিবারাত্রি প্রভূত ঘর্ম; ঘর্মের অম্ল ও দুর্গন্ধ; প্রত্যেক শারীরিক বা মানসিক শ্রমে ঘর্ম-নিঃসরণ (সোরি, সেপি)।

উপচয়।—ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে (ক্যালি-কা, আইওড); শীতল বায়ুতে অনাবৃত হইলে; শীতল দ্রব্য পান বা আহারে; রোগাক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিলে; পারদের অপব্যবহারে; বৃদ্ধি।

উপশম।—সাধারণতঃ উষ্ণতায় (আর্স); উষ্ণরূপে গাত্র, বিশেষতঃ মস্তক বস্ত্রাবৃত করিলে (সোরি, সিলি); সেঁতসেঁতে আর্দ্র কালে (কষ্ট, নক্স, হ্যাট-সলের বিপরীত); হ্রাস।

সম্বন্ধ।—(১) কোমলাংশের উপঘাতে হিপার ক্যালেণ্ডুলার অনুপূরক। (২) হিপার, পারদ ও অন্যান্য ধাতু, আইওডিন, আইওডাইড অব পটাশ, ও কড্‌লিভার অয়েলের কুফলের দোষ নিবারণ করে। এতদ্দ্বারা ঋতুতাপের পরিবর্তন ও শীতল বায়ুর অসহ্যতার কতকটা হ্রাস হয়। (৩) সোরাদোষজনিত চর্মরোগে সলফারের সহিত হিপারের তুলনা হয়।

হেমেমেলিস।

(Hamamelis)

নাসিকা, ফুসফুস ত্বক, গর্ভাশয়, মূত্রাশয় প্রভৃতি শরীরের যে কোন স্থান হইতে শৈরিক রক্ত স্রাবে এই ঔষধ উপযোগী।

শৈরিক রক্ত-সঞ্চয়।—ত্বক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অপ্রবল রক্ত-সঞ্চয়; শিরা-প্রদাহ, শিরা স্ফীতি; শিরা-স্ফীতি সংযুক্ত ক্ষত, উহাতে হুল-বেধ ও কণ্টকবেধবৎ বেদনা; অর্শ

শিরা-স্ফীতি বিশিষ্ট রোগীর সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলে, বিশেষতঃ উষ্ণ, আর্দ্রবায়ুতে সহজে সর্দ্দি লাগে।

হেমেমেলিস শৈরিক শিরামণ্ডলীর (Venous Capillary System) একোনাইট স্বরূপ।

আক্রান্ত স্থলের থেঁতবৎ স্পর্শ-দ্বেষ (আর্ণ); সন্ধির ও পেশীর বাত

সদ্যব্রণ (wound) ছিন্ন, বিদারিত, ও দুষ্ট ব্রণ; পতনজনিত উপঘাত; এতদ্দ্বারা রক্ত-স্রাব অবরোধিত, এবং বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ প্রশমিত হয় (আর্ণ)

আভিঘাতিক উপঘাতের পুরাতন কুফল (কোনা)।

আভিঘাতিক শুক্লমণ্ডল প্রদাহ (conjunctivitis); চক্ষু-কক্ষে নীলবর্ণ চিহ্ন অথবা রস-সঞ্চয়, উগ্র কাস বশতঃ উহার উৎপত্তি; তীব্র স্পর্শ-দ্বেষ (আর্ণ, ক্যালেণ্ড, লিড)।

নাসিকার রক্তস্রাব।—অপ্রবল অনেক সময় স্থায়ী অসংযত (ক্রোট) রক্তপাত; প্রভূত রক্তস্রবে শিরোবেদনার শান্তি (মেলি); স্বয়ম্ভূত, আভিঘাতিক, অনুকল্প (Vicarious) ও বাল্যকালের রক্তস্রাব

রক্তস্রাব।—প্রভূত, মলিন, গাঢ়, অন্ত্রের ক্ষত হইতে উৎপন্ন (ক্রোট); জরায়ু হইতে নির্গত প্রবল বা অপ্রবল; এবং পতন বা প্রচণ্ডভাবে অশ্বারোহণ জনিত রক্তস্রাব, রজের অনুকল্পে আস্থানিক রক্তস্রাব; মানসিক উৎকণ্ঠার অভাব

রক্ত-কাস, রক্ত বা গয়ারের স্বাদবিশিষ্ট গয়ার উদ্গমনকর কাস; প্রায়শঃ বা কাস ব্যতীত রক্তপাত; সময়ে সময়ে অনেক মাসাবধি বা বৎসরাবধি উহার অবস্থিতি।

প্রভূত স্রাব নিঃসরণ রক্তস্রাবের সহিত উহার সাদৃশ্য এবং রক্তস্রাবের ন্যায় উহাতেও ক্রমে ক্রমে শরীরের ক্ষয়-প্রাপ্তি।

অর্শ।—অধিক রক্তপাত; তৎসহ জ্বালা, স্পর্শ-দ্বেষ পূর্ণতা ও গৌরব; বোধ হয় যেন পিঠ ভাঙ্গিয়া যাইবে, মল-বেগ, বলির ঈষৎ নীলবর্ণ; মলদ্বার টাটায় ও হাজিয়া যাওয়ার মত বোধ হয়।

ঋতু।—মলিন, প্রভূত প্রবাহ; উদরের স্পর্শ-দ্বেষ; ডিম্বাশয়ে আঘাত প্রাপ্তির অথবা পতনের পর উৎপত্তি; ঋতুকালে সকল যাতনার আতিশয্য (এপি, পলস)।

গর্ভাশয় হইতে প্রবল বা অপ্রবল রক্তস্রাব, কর্কশ বায়ুর অধারে হঠাৎ ঝাঁকি লাগিয়া উহার উৎপত্তি, পৃষ্ঠে কুস্থানবৎ বেদনা।

অর্শ হইতে রক্তস্রাবের পর পতিত রক্তের অনুপাতাপেক্ষা অবসন্নতার আতিশয্য (হ্যামামেলিস)

রক্ত-স্রাবের মন্দফল (সিঙ্ক)

সম্বন্ধ।—(১) রক্ত-স্রাবে ও রক্ত-স্রাব-প্রবণ ধাতুতে ফিরমের সহিত অনুপূরক সম্বন্ধ। (২) আভিঘাতিক রক্ত স্রাবে এবং চক্ষুর অভ্যন্তরের রক্ত-স্রাব পরিশোষণার্থে আর্ণি ও ক্যালেণ্ডুলার সহিত সমগুণ সম্বন্ধ

হেলিবোরস নাইজার।

(Helleborus Niger)

দুর্ব্বল, সুকুমার, সোরা-দোষ দুষ্ট বালক-বালিকা; মস্তিষ্কের উপদ্রবের প্রবণতা (বেন, ক্যাল্ক, টিউব); তৎসহ মস্তিষ্ক-সঞ্চয়

বিষাদ। টাইফয়েড্ [illegible] পরে; বালিকাদিগের বয়ঃপ্রাপ্তির পরে, অথবা

রজঃ-প্রকাশের পরে পুনরায় ঋতুর প্রত্যাবৃত্তি না হইলে ; বিষন্নতা, আশাশূন্যতা, ও নীরবতা।

কোপনতা, সহজে ক্রোধের উদ্রেক। সান্ত্বনায় বৃদ্ধি (ইগে, ন্যাট, সিপি, সিলি) বিরক্ত হইতে অনিচ্ছা (জেল, ন্যাট)।

সংজ্ঞাশূন্যতা ; বিমূঢ়তা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আস্তে আস্তে উত্তরদান ; অরুণ জড়ত্বের প্রতিকৃতি (পুরাতনের, ব্যারা-কা)।

দন্তোদ্ভেদ-কালে মস্তিষ্ক-লক্ষণ (বেল, পড), রস-সঞ্চয়ের আশঙ্কা (এপিস, টিউব)।

মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ।—তরুণ, মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয়, গুটিকাজনিত, রস-ক্ষরণ সংযুক্ত মিনিঞ্জাইটিস ; অল্লাধিক পূর্ণ-পক্ষাঘাত, মস্তিষ্ক-রোগজনিত বিশেষ চিৎকার ধ্বনি।

চিন্তা শূন্য একতান শূন্যদৃষ্টি ; চক্ষুর বিস্তৃত বিকাশ, আলোকে জ্ঞানশূন্যতা ; চক্ষুতারা প্রসারিত অথবা পর্য্যায়ক্রমে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত। প্রগাঢ় নিদ্রা, নিদ্রায় চীৎকার করা ও চমকিত হইয়া উঠা।

হাইড্রোকেফেলাস, স্কার্লেটিনার পরে অথবা গুটিকাজন্য উহার ক্রত-বিকাশ (এপিস, সলফ, টিউব) ; একবাহু ও জঙ্ঘার অনিচ্ছায় সঞ্চালন

মস্তক বা মস্তক-পশ্চাৎ ব্যতীত শরীরে অত্যন্ত শীতলতা সংযুক্ত টঙ্কার, মস্তক ও মস্তক-পশ্চাৎ উত্তপ্তও থাকিতে পারে (আর্ণ)

অতিশয় আগ্রহপূর্ব্বক শীতল জল গলাধঃকরণ, (জলের) গ্লাস দংশন, কিন্তু জ্ঞানশূন্য অবস্থায় অবস্থিতি।

মুখের চর্ব্বণবৎ সঞ্চালন, মুখের কোণের ঘা ও বিদারণ, মলিন, ধুলমাখান-বৎ, শুষ্ক নাসা-রন্ধ্র।

সর্ব্বদা ওষ্ঠ ও বস্ত্র খুঁটন, অথবা নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করণ (সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায়, এরম)।

বালিশে মস্তক প্রবিষ্ট করণ ; একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে মস্তক অবলুণ্ঠন ; হস্তদ্বারা মস্তকে আঘাত করণ।

অতিসার।—তরুণ হাইড্রোকেফেলাস, দন্তোদ্ভেদ, ও গর্ভকালে অতিসার।

জলবৎ মল ; পরিষ্কার, ছুশ্ছেদ্য বর্ণশূন্য আম তন্ত্র, জেলীবৎ আম ; বেঙ্গের ডিমের মত ; অনিচ্ছায় নির্গত ; মল

মূত্র।—লোহিত, কৃষ্ণবর্ণ, স্বল্প, কফি-চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ ; মস্তিষ্কের উপদ্রবে ও শোথে মূত্রবিলোপ ; সাগুদানা মূত্র।

শোথ —মস্তিষ্ক, বক্ষঃস্থল, ও উদরের শোথ ; স্কার্লেটিনা, সবিরাম জ্বরের পরবর্তী শোথ ; তৎসহ জ্বর, দুর্ব্বলতা ও মূত্র-বিলোপ ; উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া উৎপত্তি (এপিস, জিঙ্ক)।

সম্বন্ধ।— মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর রোগে এপিস, এপোসা, আর্স, বেল, ব্রাই, ডিজি, ল্যাক সলফ টিউব ও জিঙ্কের সহিত হেলিবোরের তুলনা হয়

হেলোনিয়াস।

(Helonias)

দৌর্ব্বল্য বশতঃ কন্দ, আলস্য ও ভোগ-বিলাসে দুর্ব্বলীভূতা ; মানসিক বা শারীরিক কঠিন পরিশ্রমে জীর্ণা ; স্ত্রীলোকের পক্ষে উপযোগী ; অতিশ্রমজ পেশীর জ্বালা ও বেদনা ; এত শ্রান্তি যে নিদ্রা যাইতে পারা যায়না।

যখন কার্য্যে নিবিষ্ট থাকা যায়, পীড়ার বিষয় ভাবা যায়না তখন সর্ব্বদাই ভাল থাকা যায় (ক্যাল্ক-ফস, অক-এসি)।

অস্থিরতা, অবিরত নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে হয়।

কোপনতা, দোষ-গ্রাহিতা ; যৎসামান্য প্রতিবাদ সহ্য করিতে অথবা ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে পারা যায়না (এনাক)।

গভীর বিষাদ ; প্রগাঢ় মানসিক অবসাদ।

বহুমূত্র।—প্রথম অবস্থা ; প্রভূত, পরিষ্কার, সশর্কর মূত্র ; ওষ্ঠের শুষ্কতা, উহা একত্র আটকিয়া থাকে ; অতিশয় পিপাসা ; অস্থিরতা ; শীর্ণতা ; কোপনতা ; ও বিষণ্ণতা।

সাণ্ডলালমূত্র (albuminuria) তরুণ বা পুরাতন ; গর্ভাবস্থায়, অতিশয় দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা ও তন্দ্রালুতা সংযুক্ত ; এলবুমিন্যুরিয়া। সাধারণতঃ রোগীর অতিশয় শ্রান্তি বোধ হয়, অথচ রোগী তাহার কারণ জানে না।

ঋতু —রক্তস্রাব বশতঃ দুর্ব্বলীভূত নারীদিগের জরায়ুর ক্ষীণতাজনিত নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, অতি প্রভূত রজ-স্রাব ; ঋতুদ্বয়ের ব্যবহিত সময়ে শরীরের যে পরিমাণ রক্ত জন্মে তদপেক্ষা অধিক রক্তের অপচয় ; স্তন-দ্বয়ের স্ফীততা, স্তন-বৃন্তের ব্যথিততা ও স্পর্শ দ্বেষ (কোনা, ল্যাক-ক্যান) । ঋতু-রক্তের অপ্রাবল্য, মলিন সংযত, ও দুর্গন্ধ প্রবাহ।

বস্তি-গহ্বরে (pelvis), স্পর্শ-দ্বেষ ও গৌরব অনুভব (লাপ্পা) । জরায়ুর বিদ্যমানতা উপলব্ধি ; রোগিণী নড়িলে চড়িলে জরায়ুও নড়ে-চড়ে বলিয়া অনুভূত হয়, উহাতে অতিশয় স্পর্শ-দ্বেষ (লাইসি)।

গর্ভ-পাত ও গর্ভ স্রাবের মন্দ ফল।

সম্বন্ধ ।—(১) এলিট্রিস, ফির লিলি, ফস এসির সহিত হেলোনের তুলনা হয়। (২) কলা, দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ, অসম্যক পরিপোষণজনিত দুর্ব্বলতায় হেলন এলিট্রিসের অনুরূপ

রোগানুক্রমে

সংক্ষিপ্ত

ঔষধ প্রদর্শিকা।

অগ্নিদাহ (বার্ণস)—ক্যান্থ রস, ক্রিয়ো বা আর্টিকা।

অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য (ডিসপেপ্সিয়া) ওষাণ-একন, ইপিক, নক্স-ভ, ব্রাই।

পুরাতন—কা-বাইক্র, কার্বো-ভে, নক্স-ভ, আর্স।

বালকদিগের—ক্যাম, পলস, নক্স, সলফ, এন্টি-ক্রু।

বৃদ্ধদিগের—এন্টি-ক্রু, কা-বাইক্র, কার্বো, নক্স, আর্স।

সর্দ্দিজনিত—একন, আর্স, মার্ক, ব্রাই।

চর্ব্বি বা ঘৃত-পক্ক আহার জনিত—পলস, এন্টি-ক্রু।

ক্রোধজনিত—ক্যাম।

শোকাদিজনিত—ইগে, চায়, নক্স, পলস।

অণ্ডকোষবৃদ্ধি (হাইড্রোসিল) পলস, ক্লিম, স্পঞ্জ, আর্স, অর, একম

অতিসার (ডায়েরিয়া) অপাচ্য আহারজনিত এন্ট-ক্রু, পলস, ইপিক

সর্দ্দিজনিত একন, ডল্ক, মার্ক, ক্যাম্ফ

ক্রিমিজনিত—সিন, আর্স, মার্ক।

উদরবেদনাসহ—কলোস ভিরেট।

রাত্রিকালীন—পলস, চায়, রস।

প্রাতঃকালীন—এপিস, সলফর, এসিড ফস।

গ্রীষ্মকালীন চায়, ভিরেট, ক্যাম, আর্স, আইরিস

বালকদিগের—ক্যাম, মার্ক, রিউম, ইপিক, ডল্ক, আর্স, আইরিস।

বৃদ্ধদিগের—ফস, আর্স, চায়, এন্টক্রু।

অন্ত্র-প্রদাহ (এন্টিরাইটিস)—একন, বেল, কলোস মার্ক-ক, আর্স, ব্রাই।

অপস্মার (এপিলেপ্সি)—বেল, কুপ্র, হাইয়স, ষ্ট্রাম, ভিরেট-ভি, ইগ্নে; আর্স, জিঙ্ক, ক্যাল্ক; কা-ব্রোম।

অবদরণ (এক্সকোরিয়েশন) ক্যাম, ক্যাল্ক, লাইক, সলফ।

অবসাদ-বায়ু (হাইপোকণ্ড্রিয়্যাসিস)—অর, আর্জ্জ-মে, ইগ্নে, নক্স, লাইক, এনেক।

অভিষ্যন্দ (অপথ্যালমিয়া) সর্দ্দিজনিত—একন, মার্ক, ইউফ্রে, বেল, পলস।

পুরাতন—ক্রিম ক্যাল্ক, সলফ, মার্ক, হিপার, আর্স

রোমান্তীর পর—পলস, সলফ

বসন্তের পর—মার্ক, সলফ।

গণ্ডমালাজনিত—ক্যাল্ক, আইয়োড, গ্রাফ, হিপ, সলফ, মার্ক-ক, আর্স

উপদংশজনিত—মার্ক-ক, নাইট-এসি, থুজা, অর।

শিশুদিগের—আর্জ্জ-নাইট, ক্যাল্ক, সলফ, মার্ক।

অঙ্কুংষিকা (পোলাইপো) গুহ্যদ্বারের—নাইট-এসি, সলফ

জননেন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধদেশের—একন, সলফ, সিপি, লাইক, কোনিন; বাহ্যিক ধাবন (লোশন)

অণ্ডকোষের—গোটো, মার্ক-ক, নাইট-এসি, রস, একন।

অর্শ (হেমরয়েড্স) সলফ, হেম কোলিন, পলোজ, নক্স ইস্কিউ

অশ্মরি (লিথিয়াসিস)—লাইক, নক্স, ক্যাল্ক, ক্যান।

অস্থিঃ-ক্ষত (কেরিজ)—সিল, ফস-এসি, সলফ, ক্যাল্ক

বক্রতা—ক্যাল্ক, সিল, সলফ।

বিবর্দ্ধন—অর মার্ক-আইয়োড

বেদনা—মার্ক, অর, মেজ, আর্স, মার্ক-আইয়োড, ইউপ-পর।

অস্থি-বিকৃতি (রিকেটস)—সিলি, ক্যাল্ক, সলফ।

অস্ফুটভাষণ (ষ্ট্যামারিং)—বেল, হাইয়স, ষ্ট্রাম।

আক্ষেপ (স্প্যাজম) বেল, ক্যাম, ভিরেট-ভি জেলস; ওপি।

গুল্মবায়ুজনিত—ক্যাম্ফ, মস্ক ইগ্নে, হাইয়স।

আক্ষেপ ও খল্লী (স্প্যাজম ও ক্র্যাম্পস)—ক্যাম্ফ নক্স, কলোসি, ভিরেট, কক, জেলস।

আণ্ডলালিকমূত্র(এলবুমিনুরিয়া)—আর্স, ফস, মার্ক-ক, টেরেব, ক্যান্থ।

আতপঘাত (সানষ্ট্রোক)—ক্যাম্ফ, বেল, গ্লন, জেলস, ভিরেট-ভি।

আধ্মান (ফ্লেটুলেন্স,)—নক্স কার্বো; লাইক চায়না।

আমবাত (রিউমেটিজম):—বক্ষের—রোড, সিমিসি কা-হাইড।

হৃৎপিণ্ডের—স্পাঞ্জি সিমিসি কষ্ট, ব্রাই, ডিজি।

সন্ধির—কটা, ব্রাই, রস, সিমিসি কষ্ট, কা-হাইড।

গ্রীবার—ব্রাই, রেড

পুরাতন—রস আর্ণ, সলফ, রোড, সিমিসি, কা-হাইড।

আমবাত-জ্বর—(রমেটিক ফিভর) একন, ব্রাই, বেল, সিমিসি।

আঁব (টিউমার)—কটা, আর্ণ, আইয়োড, সিলি, ক্যাল্ক।

ইন্দ্রলুপ্ত (এলোপিশিয়া): পূর্ব্বরোগজনিত—ফস-এসি, ইয়ে ক্যাল্ক সিল, চায় ক্যাল্ক

পারদজনিত—কার্বো হিপার।

শিরঃপীড়াসংযুক্ত ফ্লোর-এসি, নাইট-এসি, ফস, সিপি সলফ ক্যাল্ক

উদরী (এসাইটিস)—এপোসাই, আস, এপিস, ডিজি, চায়, লাইক।

উদগার (ইরক্টেশন)—ব্রাই, নক্স, পলস সংফ-এসি, লাইক, কার্বো, আস।

উপক্ষত (এপথি)—বোর; মার্ক, আস, সলফ।

উপদংশ (সিফিলিস)—মার্ক, নাইট এসি, থুজা, আর্জ-নাইট, অরম

উপদংশ ক্ষত মার্ক, নাইট-এসি, কা হাইড, ফাইটো

ওষ্ঠ-বিদারণ—গ্রাফ, মার্ক, আর্ণ, ক্যালেণ্ড ২০ম।

কচ্ছু (স্কেবিস)—গন্ধকের মলম; কার্বো, কষ্ট, মার্ক, সিপি, রস, হিপার।

কটিবন্ধবৎ দদ্রু (জোনা)—রস, রস-বল্ব, একন, সলফ, লাইক

কটিবাত (লম্বেগো)—এণ্ট-টা; আর্ণ; রস; সিমিসি।

কদর (কর্ণ)—ক্যাল্ক, সলফ; আর্ণ বা ভিরেট ভি।

কন্দ (প্রলাপসস ইউটিরাই)—ষ্টান, সিকে, বেল, সিপি, নক্স, হেলোন।

কর্কট (ক্যান্সার)—আস, হাইড্রাস, কেনা, ফাইটো

কর্ণমূল-প্রদাহ (প্যারোটাইটিস)—মার্ক-আইয়োড, মার্ক-সল, মার্ক-কর, বেল, পলস

কর্ণ-বেদনা—বেল, পলস, মার্ক, ক্যাম, একন, ভিরেট ভি

স্রাব—হিপার, ক্যাল্ক, পলস, কার্বল-এসি, মার্ক, কষ্ট।

ক্ষত—মিউর-এসি, পলস, কষ্ট।

প্রদাহ—একন, বেল, পলস, মার্ক সল।

নাক—একন, টিন-মং, পলস, মস্ক, নক্স, সলফ

কালিমা (একিমোসিস)—হেম, আর্ণ, রস, মিউর-এসি।

কাস—সর্দিজনিত—একন, বেল, ব্রাই, কষ্ট

পুরাতন—কা-বাইক্র, সলফ, ব্রাই

স্বরযন্ত্রজনিত—স্পঞ্জ, হিপার, কুপ্রে।

হুপিংকফ—ইপিক, ড্রস, কোরাল, নাইট-এসি; ভিরেট-ভি, জেলস বা বেল।

শুষ্ক বায়ুজনিত—কোরাল, হাইয়স, ইগ্নে।

কুষ্ঠ (লেপ্রোসি)—আর্স, মর্ক, সলফ, আইয়োড।

কৃমি সূত্রাকার—সিনা, টিউক, ইগ্নে, আর্ট-ইউ, স্যাণ্ট, চায়না

দীর্ঘ ও গোলাকার—মার্ক, স্পিজি, সলফ, একন

ফিতার ন্যায়—ফিল-মাস, টিন সলফ।

কৃমি জ্বর একন, সিন, সিল

কোষ্ঠবদ্ধতা—নক্স; ব্রাই বা ওপি; লাইক; সলফ, কোলিন বা ইস্কিউ; প্লম্ব

খল্লী (ক্র্যাম্প্‌স)—প্রথমে-ভিরেট, নক্স, আর্ণ; বেল; কুপ্র, জেলস।

পাকাশয়ে—নথ ডাইয়োস, কষ্ট।

খুসকী (ড্যানড্রফ)—আর্স, গ্রাফ, থাইক, সলফ, রস

গর্ভস্রাব (এবরশন)—সিকে, কল, ক্রোক, ইপিক, সিড্রণ, আর্ণ, বেল

আশঙ্কিত—পলস, ক্যাম, বেল স্যাব, আর্ণ, সিকে।

প্রতিষেধক—সিকে, ক্যাক্ষ সিমিসি, চায় সিড্রণ

গর্ভাবস্থায় বিবমিষা—ইপিক, ক্রিয়োজ, নক্স, পলস, আর্থিরিস

গলগণ্ড (গয়টার)—স্পঞ্জ, মার্ক-অ-ইয়ে ও আইয়োড, ব্রোম।

গলাবেদনা (সোর থ্রোট)—একন, বেল, মার্ক; ফাইটো।

গাত্রকণ্ডুয়ন আর্জ-নাইট, সলফ, আর্স, মেজ; ভিরেট-ভি।

গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া)—ইগ্নে, প্লাটি, এসা, ভেলার, কষ্ট, জেলস, পলস, হাইয়স।

গুহ্যদ্বারঃ—কণ্ডূয়ন—সলফ, নাইট-এসি; সিন, ইগ্নে বা মার্ক; আর্স একন

ভ্রংশ—ইগ্নে, নক্স, পডফ, মার্ক।

গূঞ্জন (রিউনিয়ন)—ভিরেট-ভি, আর্ণ বা রুটা।

গৃধ্রসী (সায়েটিকা)—কলোস, রাস, আর্স, নক্স, ক্যাম।

গ্রন্থি-বিবর্দ্ধন মার্ক-আয়োড, ব্যারাইট-কা, বেল হিপার, আইয়োড, সিল, কাল্ক-ফস, ফাইটো।

গ্রীবাস্তম্ভ (ষ্টিফ নেক)—একন ও বেল; সিমিসি, ব্রাই।

ঘৃষ্টব্রণ (কণ্টিউজন)—আর্ণ।

ঘ্রাণাভাব—পলস, মার্ক, জেলস একন, ক্যাল্ক, স্যাঙ্গ, প্লম।

চক্ষুঃ—ক্ষত—মার্ক, ক্রিম, নাইট-এসি, ইউফ্রে, বেল, মার্ক-ক।

তির্য্যকদৃষ্টি—বেল, হাইয়স, জেলস, ষ্ট্রাম

দৌর্ব্বল্য—সলফ, ফস, আইয়োড, বেল।

সত্তরণ—আর্ণ ও একন; বেল, হেম।

চক্ষুর কালিমা—অর্ণ; হেম

জম্বুক (নিভঃস) থুজা, ক্রিয়ো

ঝিল্লিক প্রদাহ (ডিপথিরিয়া) বেল, ফাইটো, ক্যা-পার্মেঙ্গ, মার্ক-আই-য়োড, আর্স, মিউর-এসি

তন্দ্রা (কোমা) ওপি, একন, বেল; লাইক।

তাণ্ডব (কোরিয়া) কুপ, এগার, ভিরেট-ভি, বেল, ইগ্নে, সিমিসি, আর্স।

তালু-মূল-প্রদাহ (টন্সিলাইটিস্)—বেল, ব্যারাইট, মার্ক-আইয়োড, ক্যা-পার্মেঙ্গ।

তিমির (য়্যামোরোসিস)—বেল ইউফ্রে, মার্ক-কর জিঙ্ক, হাইয়োস, জেলস, নক্স, চায়।

তিল (মোল) কার্ব্বো সলফ, ক্যা লেও।

তির্য্যক দৃষ্টি (ষ্ট্রাবিসমাস)—বেল, হাইয়স, জেলস বা ষ্ট্রাম; সিনা; স্পিজি ফস।

দদ্রুঃ—(হার্পিজ) শুষ্ক—মার্ক, আইয়োড আর্স পেট্রো।

রক্তস্রাবী—একন, রাস, আর্স, ফাইটো গ্রাফ, ক্যাল্ক, সলফ

দদ্রুঃ—মস্তকের—সিপি।

চর্ম্মের—টেলু'র, রাস, সিপি, সলফ

দন্ত-পুপ্পুট (১ম বয়েস)—একন ও বেল; মার্ক, সিপি, হিপার; ফস।

দন্তশূলঃ—(টুথেক)—একন ও বেল; পলস।

ক্ষয়জ—ক্রিয়ো, মার্ক, ষ্ট্যাফ, ফাইটো,

স্নায়বীয়—কফ, ক্যাম, ইগ, জেলস

বালকদিগের—ক্যাম, ক্রিয়ো।

গর্ভাবস্থায়—বেল নক্স ক্যাম, কফ।

দন্তোদ্ভেদ-বিলম্ব—ক্যাল্ক, ক্যাম, একন, ক্রিয়ো, ভিরেট-ভি, মার্ক।

দংশন ও হুল-বেধ—লিডম এপিস, রস, ক্যাম্ফ।

দাহিকা (কার্বাঙ্কল)—বেল ও সলফ এপিস ; আর্স ; একন ; সিল

দুর্ব্বলতা (ডিবিলিটি)—চায়না, ফিরম ফস ফস-এসি ; ইগে, মস্ক, আইয়োড, নক্স

ধ্বজভঙ্গ (ইম্পোটেন্স)—ফস এগ-নস-কা কস্ক সিপ্ত ব্যারাই মুফ, চায়না ফস-এসিড।

নাড়ীব্রণ (ফিষ্টুলা)—সিলি ফ্লোর-এসি ক্যাল্ক, কাইড্রাস

নাসিকা:—রক্তস্রাব—একন, ব্রাই ; ইপিক, হেমে ; পলস ; চায়না, আর্ণ।

ক্ষত—আর্স, সলফ, গ্রাফ, অরম, কষ্ট ;-আইয়োড।

নিদ্রাহীনতা—কফি, বেল হাইয়স জেলস ভিরেট-ভি, গ্লন, ইগে

নিদ্রালুতা—ওপি, বেল, একন ; নাইক।

নিরুদ্ধপ্রকাশ (ষ্ট্রিকচার)—একন, নক্স, ক্যাম্ফ, ক্যান।

নিশ্বাস-দুর্গন্ধ—মার্ক, কার্ব, সিপিজি, অর একন, পলস।

নীলপাণ্ডু (সায়েনোসিস)—ডিজি, আর্স কুপ, ভিরেট।

পক্ষাঘাত (প্যারালিসিস)—ব্যারাই-কা, নক্স, আর্জ্জ-নাইট, প্লম, রস রস জেলস, একন

পাকাশয় (ষ্টম্যাক) অম্লম—পলস, নক্স, ব্রাই, লাইক, কার্ব্বো, ক্যাল্ক।

প্রদাহ—একন, আর্স, বেল, মস

ক্ষত—আর্স হাইড্রাস, কালি বাইক্রম।

পানিবসন্ত (ভেরিসেলা)—রস, সলফ, এন্ট-টা।

পাণ্ডু (জণ্ডিস)—একন, ব্রাই, মার্ক চেল, আর্স ; ফস ; চায়, নক্স।

পানাত্যয় (ডিলিরিয়ম ট্রেমেন্স) ষ্ট্রাম, ওপি, বেল, হাইয়স, নক্স

পামা (এক্জিমা)—আর্স, ক্যাল্ক, মার্ক, রস ; ক্রোটন-টিগ, সলফ।

পারদ-দোষ—নাইট-এসি, হিপার, কার্ব্বো।

পিচ্ছিতব্রণ (কন্টিউজড উণ্ড)—আর্ণ ; হেম ; কোনা ; রুটা।

পিত্তশিলা (গল-ষ্টোন)—একন, মার্ক, পডফ, নক্স, চায়না

পৃষ্ঠবংশের উপদাহ (স্পাইন্যাল ইরিটেশন—চায়না, ইগে, নক্স, জেলস।

পৃষ্ঠ-বেদনা —পরিশ্রমজনিত— আর্ণ, রস, ব্রাই, জেলস

রজোকৃচ্ছ্রজনিত——বেল, পলস, সিকে, কক, থ্লাট

পৃষ্ঠবংশের উপদাহ জনিত—চয়-ইগে, মস্ক, জেলস।

প্রতিশ্যায় (ক্যাটার) : মস্তকের একন, আর্স, মার্ক, নক্স, ইউফে ; কা-বাইক্র, কা-হাইড, সলফ।

বক্ষঃস্থলের—ব্রাই, ও একন বা ফস।

প্রমেহ (গনোরিয়া)—ক্যান, জেলস, মার্ক, একন, ক্যান্থ, থুজা, কোপ।

প্রসব-বেদনা (লেবর)—ক্যাম, পলস, কফি, জেলস

ক্র্যাম্প—পলস, সিমিসি, কক, নক্স বেল

প্রসবান্তিক বেদনা (আফটার-পেইন্স)—সিকে, কফি, পলস, আর্ণ, ক্যাম, ক্রোক

ফুসফুস-প্রদাহ (নিউমোনিয়া)—একন ও ফস, ব্রাই, চেল, এন্ট টা।

ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহ (প্লুরাই-টিস)—একন ও ব্রাই ; ফস, আই-য়োড, আর্স।

বধিরতা (ডেফ নেস) : সর্দিজনিত—একন, মার্ক, বেল, পলস ডল্ক।

রোমান্তীর পর—পলস, সল্ফর বেল।

বসন্তের পর—মার্ক, সলফ, বেল

স্নায়বীয় রোগের পর—ফস, ক্যাল্ক ফস, চায়না, পেট্রোল

বন্ধ্যাত্ব (ষ্টারিলিটি)—ফস, প্লাটিনা, বোরাক্স, ক্যান, সিপি, বোরাক্স

বমন (ভমি টিং) : অপাচ্য আহার জনিত—পলস, এণ্ট ক্রু, ইপিকাক আইরিস।

পুরাতন—ক্রিয়ো, আর্স, হাইড্রাস

রক্ত—ইপিক, হেম, নাইট্‌-এসিড চায়না।

বসন্ত (ভেরিওলা)—এণ্ট-টা, মার্ক, বেল, ব্রাই, সলফ

বহুপাদ (পলিপাস)—মার্ক-আই, য়োড, [illegible] বাইক্র, টিউক, ক্যাক

বহুব্যাপকপ্রতিশ্যায় (ইনফ্লু-য়েঞ্জা) ক্যাম্ফ ; একন ; আর্স ; কা-বাইক্র।

বাতকণ্টক (প্লেগ) রস, আর্ণ, বা রুটা।

বাতরক্ত, গ্রন্থিবাত (গাউট)—একন ও বেল, কলচ, বা ব্রাই ; রোড, সিমিসি, পলস, [illegible] লাইক, আর্ণ।

বায়ুনলী-ভুজপ্রদাহ (ব্রংকাইটিস) তরুণ—একন, এণ্ট-টার্ট, ব্রাই, ইপিক, ফস, কা-খাইডে।

বালকদিগের—ফস, এণ্ট-টা, লোব

বৃদ্ধদিগের—কার্বো, এণ্ট-টা, সিনেগা, কুইন।

পুরাতন কা-খাইড, হিপার, ফস, কার্বো, আর্স, কা খাইড

বিচরণ-বিলম্ব—ক্যাল্ক, ফস, সলফ।

বিদগ্ধ-দৃষ্টি (ক্যাটারাক্ট)—কোনা ফস, ক্যান, ক্যাল্ক, সিল, সলফ, ক্যাল্ক বেল।

বিষমিয়া (নসিয়া)—ইপিক, ক্রিয়োজ, এণ্ট-ক্রু, লোব, টাবে, পল্স, সলফ।

বিমর্ষতা (মিলানকোলি)—ইগে, অরম, চায়না, নক্স, প্লাট, মার্ক বা পডফ

বিষমজ্বর (ইণ্টার-মিটেণ্ট) ফিবার —চায় বা কুইন; আর্স; ভিরেট-এ, ফস-এসিড; নক্স বা ইপিক; সল্ফ-কুইন ইগে।

বিষাদ-বায়ু (মিলানকোলিয়া) —অর, ইগ, প্লাট, ফস, জিঙ্ক, সল্ফ।

বিসর্প (এরিসিপেলাস)—একন বেল, রস, ভিরেটভিডি, এপিস, ক্যান্থ আর্স।

বিসূচিকা (কলেরা) : সাংঘাতিক —ক্যাম্ফ, ভিরেট, কুপ, আর্স।

বুকজ্বালা (কার্ডিয়্যালজিয়া)— কার্বো ভে ব্রাই, নক্স; ক্যাল্ক, পল্স, ভিরেট-এ।

বৃক্ক প্রদাহ (নিফ্রাইটিস)— ক্যান্থ টেরেব, একন, বেল।..

ব্রণশোথ (য়্যাবসেস): তরুণ— বেল বা একন ও হিপার; মার্ক, আইয়োড আর্স।

পুরাতন—সিল, ক্যাল্ক, সলফ, ফস; চায়।

স্তনের—ফাইটো, ব্রাই, বেল হিপার ফস (পুরাতন); মার্ক, চায়।

মস্তিষ্কঃ—বিকাশাম (কনজেশন)— আর্ন ও একন বা বেল।

রক্তসঞ্চয়—গ্লন বেল, একন

প্রদাহ—একন, বেল, ভিরেটভিডি, ব্রাই, হাইয়োস, ওপি

মাথক (ওয়ার্টস)—থুজা, রস; সলফ।

মুখের পচাক্ষত—কা-ক্লোর, মার্ক আর্স; কার্বো, নাইট-এসি।

মুখ-প্রসেক (পাইরোসিস) ক্যাল্ক নক্স, কার্বো ব্রাই, আর্স।

মুখমণ্ডল-বেদনা (প্রোসোপ্যালজিয়া) একন,

বেল, কলোস, পিজি ; সিমিসি ; ক্যাম, ষ্টিক্টা।

মধুমেহ—(ডায়েবিটিস) ফস-এসি; আর্স, মস্ক-ভ, হেলোন।

মূত্ররেণু—(গ্রাভেল) লাইক, এন্ট-ক্রু, নক্স, ব্রাই।

মূত্রস্তম্ভ—(রিটেনশন অভ ইউরিণ) ক্যান্থ, নক্স, ওপি, একন, ক্যাম্ফ, ক্যাম।

মূত্রাশয় (ব্লাডার) শ্লেষ্মাস্রাব—এন্ট ক্রু, পলস, ফিস, ক্যান্থ, ক্যান।

প্রদাহ—ক্যান্থ, টেরেব, এপিস, একন।

পক্ষাঘাত—হ্যায়াই কার্বা, একন, নক্স, আর্স বেল।

মূত্রাশয়-প্রদাহ (সিষ্টাইটিস) ক্যান্থ, টেরেব, এপিস।

মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থির প্রদাহ (প্রষ্টেটাইটিস)—বেল, পলস ক্যা-হাইড

মূর্চ্ছা (সিনকোপ)— মস্ক, ক্যাম্ফ, ইগে, ভিরেট, আইয়োড, চায়না, কফি।

মৃৎপাণ্ডু (এনিমিয়া) ফির, পলস, সিপ, কোনা

মেদ-রোগ (ওবিসিটি) আর্স ফির, ক্যাল্ক, সলফ।

মেদাপকর্ষ (ফ্যাটিডিজেনারেশন) ফস, আর্স, ফির।

যকৃৎকাঠিন্য—ফস, মার্ক-ক, ডিজি, আর্স

যকৃৎ বিবর্দ্ধন—মার্ক-আইয়োড।

প্রদাহ—একন, ব্রাই, মার্কক।

নিষ্ক্রিয়তা মার্ক, পডফ।

রজঃস্রাব (মেনষ্ট্রুয়েশন) প্রথম বিলম্ব—পলস, ফির, সিপি, সলফ, ফস, সিকে, সাইক্লে

অনিয়মিত—সিপি, পলস, সলফ, সিনিসিও।

যন্ত্রণাযুক্ত—সিমিসি, কক ক্রোক, বেল, ক্যাম, পলস, প্লাটি, হেম, ইগ, জেলস, সিকে, ভিরেট।

অধিক পরিমাণ—সিকে, ক্রোক ; স্যাব ; একন, ক্যাল্ক, ইপিক ; চায়।

স্বল্প—সিপি, ফির, পলস কোনা সলফ, হিলোন

অবরুদ্ধ—একন, পলস, বেল ; কোনা ; সিপি, প্লাট, গ্রাফ।

নিয়মিত কালের পূর্ব্বে—ক্যাল্ক স্যাব, ইগ ; ক্রিয়ো ; সিকে, নক্স-ভ।

নিয়মিত কালের অধিক পরে—পলস, ফস, ফির, সিপি।

আকস্মিক (ভাইকেরিয়স)—হেম, ব্রাই, পলস ফস সিনিসি।

নিবৃত্তি (সেসেশন)—চায় বা

ফিরম; সলফ, সন, ল্যাক বা স্যাব; সিমিসি জেলস।

রক্ত-সঞ্চয় (কঞ্জেশন):

মস্তিষ্কের—একন, বেল গ্লন-ওয়িন, জেলস

যকৃতের—মার্ক, বেল, ... ব্রাই চায়, আর্স, আইয়োড একন।

ফুসফুসের—একন, এস. ভিরেট-ভি এণ্ট-টা, ব্রাই।

রক্ত-স্বল্পতা (এনিমিয়া) ফিরম, চায়, ফস-এসি, আর্স সিল, হেলোন।

রক্তাতিসার (ডিসেণ্ট্রি) মার্ক, ইপিক, আর্স, এলোজ হেম

রোমাঞ্চী (মিজেল্‌স) একন ও পলস, জেলস, ব্রাই, বেল, কা বাইক্র; সলফ।

লালমেহ (গ্লীট)—সিমেবা, ক্যাম্ফ, ক্যান, পলস নক্স সলফ, ম্যাটিকো

লিঙ্গরক্ত (কর্ডি)—একন, জেলস বেল, ক্যাম্ফ, ক্লোরাল।

লিঙ্গোত্থান (ইরেকশন)-ক্যাল্ক ফস-এসি, ফুফার; একন বেল, জেলস।

শয্যা-ক্ষত (বেড্‌ সোর) গ্লিসারিণ-ক্রিম বা ক্যালেণ্ড লোশন্।

শারীর-ক্ষয় (মারাসমাস): আই-য়োড, ক্যাল্ক, সলফ, ফস, আর্স, পলস।

কৃমিজন্য—সিন, মার্ক, স্যাণ্টো

শরীরব্রণ (অ্যাবসেস—হিপার, সিলি বা কা-বাইক্রোম, বেল, ল্যাকে; আর্স, মার্ক; কষ্ট।

শিরা-প্রসারণ (ভেরিকসিস)—হেম, পলস ফ্লোর-এসি

শিথিলিত গলমধ্য (রিল্যাক্সড থ্রোট)—কা-বাইক্র, হিপার, ব্যারাইট, ফাইটো, ফস

শিরোঘূর্ণন (ভার্টিগো)—একন, বেল, নক্স, কক, ব্রাই, পলস, জেলস।

শীতপিত্ত (আর্টিকেরিয়া—এপিস, রস, পলস; ক্লোরাল।

শীতাদ (স্কার্ভি)—মার্ক, নাইট-এসি, কার্বো-ভে, আর্স।

শুক্রমেহ (স্পার্মেটোরিয়া)—ফস চায়, ফিরম, ফস-এসি, আর্জ-মে, জেলস।

শূল (কলিক)—কলোসি, নক্স, প্লম্ব; আইরিস, কোলিন।

সীসশূল—ওপি, একন, সলফ-এসি।

রজোশূল—কক, প্লাট, নক্স, সিকে, ইগ্নে

শোথ (ড্রপসি): আর্স এপিস, ডিজি, ব্রাই, চায়, এপোসাই

উদরের—এপোসাইন আর্স, এপিস ডিজি, চায়না

মস্তিষ্কের—হেল, বেল, এপিস, ভিরেট-ভি বা জেল্‌স

বক্ষঃস্থলের—ডিজি, আর্স হাট, হেল।

শাখায়—চায়, ফির, এপিস, আর্স।

অণ্ডকোষের—আইয়োড, রোড, গ্রাফ, অরম,।

শ্লৈষ্মিকপাণ্ডু, হরিৎপাণ্ডু (ক্লোরোসিস)—ফির, পলস ফির-আইয়োড, সিপি, ক্যাল্ক।

শ্বাস (য্যাজমা) আস, একন লোব, ইপিক, ইউক্রো, কুপ

বালকদিগের—এন্ট-টার্ট, স্যাম্বু, ইপিক, আর্স, কুপ

শ্বেত প্রদর (লিউকোরিয়া)—সিপি, কক, পলস, ক্যাল্ক, সিলি; ক্রিয়োজ বোরা।

সন্নিপাত-জ্বর (টাইফয়েড ফিভার) ব্যাপ্ট, আর্স মিউর এসি, রস)।

সবমন শিরঃপীড়া (সিক্‌হেডেক)—আইরিস, ইপিক, পলস, নক্স সিপি।

সংন্যাস (এপোপ্লেক্সি) একন, ওপি, বেল, গ্লন, নক্স)

সামান্য জ্বর (সিম্পল ফিভার)—একন, ভিরেট-ভি।

সূতিকাজ্বর (পিউয়ার্পারাল ফিভার)—একন, বেল ব্রাই ষ্ট্রাম

স্তন্য স্বল্প বা রুদ্ধ—পলস, এগ্‌নস্‌ একন; বেল।

অতিরিক্ত—ক্যাল্ক ফস, আইয়োড; চায়না

স্তন্য-জ্বর (মিল্ক-ফিভার)—ব্রাই একন, ক্যাম, ভিরেট ভি, বেল।

স্নায়ু-শূল (নিউরালজিয়া) মুখমণ্ডলে—একন আর্স বেল, কলোস ক্যাম জেলস

মস্তকে—গ্লন, বেল, নক্স [illegible], সিমি।

পৃষ্ঠে—নক্স অক্স-এসি, সিমিসি, ভিরেট।

উরুতে—কলোস আর্স, নক্স ক্যান

পার্শ্বে—রোড আর্স, সিমিসি।

স্ফোটক (বয়েল,—বেদ) সলফ, আইওড বা হিপার

স্বরঘ্ন (ক্রুপ)—একন, স্পঞ্জ, হিপার, আর্ণ এপিস।

স্বরভঙ্গ (হোর্সনেস):—একন, কষ্ট; ব্যারাইট-কা, ফস, মার্ক ইয়োব। বেল; কা-হাইড আর্ণ।

পুরাতন—। ক্যা-বাইক্রাম হিপার-ফস কার্ব্বো, নাইট্র মার্ক।

স্বর-বিরামজ্বর রেসিটেন্ট-ফিবার, ষ্টেভ্রাম; আর্স, ভিরেট, চায়না, ইপিকা, রস।

স্বাদ-বৈলক্ষণ্য পলস, মার্ক, ব্রম।

হনুস্তম্ভ (লকজ) একন, বেল, আর্ণ, নক্স, জেলস

হিম-স্ফোট (চিলব্লেন) পেট্রোল, পলস হেম বা রস; ফস, ক্যালেণ্ড ক্রিয়োজ।

হুপশব্দক কাশ (হুপিংকাফ) ইপিকা ড্রস কোরাল কুপ ভিরেট; [illegible] ভিরেট, ভি বা বেল।

হৃৎকম্প (প্যালপিটেশন) মস্ক; একন, স্পিজি বেল ক্যাক্ট, ফস পলস, আর্স।

হৃদ্রোগ (হার্টডিজিজ) ক্যাক্টি ডিজি, লাক্স, একন, স্পিজি, আর্স, ফস।

হৃৎশূল (এঞ্জাইনা পেক্টোরিস) আর্স, ডিজি ট্যাব, ভিরেট-এ, ক্যাক্টি, ল্যাক, ভিরেট-ভি ফ্রিক।

ক্ষয়, যক্ষ্মা (থাইসিস) ফস, আর্স ফস-এসি, ফেরম আইয়োড, ড্রস, ক্যাল্ক-আইয়োড কালিক; একন, বা ব্রাই।

অশেষ—আইয়োড, ক্যাল্ক, সিপ, সলফ, মার্ক আইওড আর্স।

ক্ষুধা: অভাব, চায়না, নক্স, পলস, রস, আর্স ফিরম।

অতিরিক্ত বা বিকৃত ক্যাল্ক সিনা, নক্স, সিনা ভিরেট।

ক্ষৌরকণ্ড (সাইকোসিস) এণ্টি-টা, সিনেবা, আর্জ।

সম্পূর্ণ।